

2024 年四川省宜宾市护士执业资格考试《实践能力》模拟试题及答案解析

毕业院校：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 常规 17-KS 测定常用的方法是

- A、层析法
- B、微柱法
- C、比浊法
- D、EIA
- E、Zimmermann 比色法

答案：

E

答案解析：常规 17-KS 测定采用的方法是 Zimmermann 比色法

2. 患者，女性，45 岁。既往有风湿性心脏病病史 10 年余。夜间睡眠中突起口角歪斜，口齿不清，左上肢无力 2 天入院。考虑医疗诊断为

- A、脑出血
- B、脑血栓形成

C、脑栓塞

D、蛛网膜下腔出血

E、TIA

答案：

C

3. 进行第二次消毒时，消毒的顺序是

A、自下而上，外→内

B、自上而下，内→外→内

C、自下而上，内→外→内

D、自上而下，外→内→外

E、自下而上，外→内→外

答案：

B

4. 患者，男，55 岁。持续性高热（40～41℃），中毒面容，全身不适，乏力，咽痛，咳嗽。体格检查：脉搏缓慢，皮肤玫瑰疹，肝脾大，伴有腹胀、腹痛。3 天未排便，腹部触诊较硬实且紧张。实验室检查：周围血象、白细胞计数低下，骨髓象中有伤寒细胞。为减轻腹痛、腹胀，护士遵医嘱给予灌肠。关于灌肠筒内液面距离肛门高度及液体量的叙述，正确的是

A、液面不得高于肛门 60cm ，液体量不得超过 800ml

B、液面不得高于肛门 30cm ，液体量不得超过 500ml

C、液面不得高于肛门 20cm ，液体量不得超过 400ml

D、液面不得高于肛门 50cm ，液体量不得超过 700ml

E、液面不得高于肛门 40cm ，液体量不得超过 600ml

答案：

B

5. 患者，男，66 岁。诊断为慢性支气管炎，医师建议其出院后在家行手压式雾化器雾化治疗。关于手压式雾化器使用方法的叙述，错误的是

A、使用后协助患者清洁口腔，取舒适卧位

B、喷雾器使用后应置于阴凉处保存

C、使用前检查雾化器各部件是否完好，有无松动脱落等异常情况

D、每次 1～2 喷，再次使用间隔时间不少于 6～8 小时

E、药液随着深吸气的动作经口腔吸入，尽可能延长屏气时间，然后呼气

答案：

D

6. (71~72 题共用题干) 患者, 男, 28 岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛, 不能忍受, 并伴有恶心、呕吐, 急送至医院, 诊断为急性胰腺炎。给予禁食、胃肠减压、肠外营养支持治疗。2 周后病情稳定, 改为要素饮食, 鼻饲提供营养。关于要素饮食的叙述, 正确的是

- A、从高浓度、大剂量开始
- B、溶液温度应保持在 35℃
- C、鼻饲过程中出现轻度恶心应立即停用
- D、若停用应逐渐减量
- E、长期使用时无须补充维生素

答案:

D

7. 对危重患者的护理, 下列措施正确的是

- A、保持病房安静, 减少家属探视
- B、保持口腔清洁, 每天口腔护理两次
- C、为保护患者自尊, 意识丧失者不应使用保护具
- D、发现患者心搏骤停时, 首先通知医生
- E、保持平卧, 尽量减少翻动次数

答案:

B

8. (79 ~81 题共用题干)

患者，男，40 岁。因摔伤头部致昏迷 1 小时急诊入院。体格检查：心率 76 次 / 分，血压 138 / 80mmHg ，呼吸 20 次 / 分。诊断为脑挫裂，左侧急性硬膜下血肿，右侧硬膜外血肿，颅骨骨折。入院后在全身麻醉下行颞-枕开颅颅内血肿清除术。术后第 1 天患者呈深昏迷状态，眼睑不能闭合，气管插管内可见较多分泌物。遵医嘱给予吸痰。下列关于吸痰操作中的注意事项，正确的是

A、调节负压，不可超过40kPa ，以免造成黏膜损伤

B、严格执行无菌操作

C、吸痰时间不少于 15 秒

D、吸痰前给予生理盐水 5ml 注入气管插管内

E、吸痰玻璃接管每次吸痰后进行更换

答案：

B

9. 患者，男，18 岁。尿蛋白定性检查（++

++），尿蛋白定量 3.5g / 24h ，镜下血尿。眼

睑及双下肢轻度水肿，以肾炎收治入院。该饮食的试验期为

A、1 周

B、2 天

C、2 周

D、1 天

E、3 天

答案：

E

10. 患儿，女，2 岁。肺炎，T39.1℃、P98 次分，R 30 次 / 分。咳嗽，痰不易咳出，颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高，其主要依据是

A、皮肤发热，触之有热感

B、体温高于正常范围

C、呼吸、心跳均加快

D、痰液不能排出

E、不能出汗

答案：

B

11. 患者，男，65 岁。尿失禁。为了防止逆行感染，正确的措施是

A、每天更换一次导尿管

- B、每周检查一次尿常规
- C、集尿袋应高于耻骨联合
- D、每两天更换一次集尿袋
- E、每两天消毒一次尿道口

答案：

B

12. 最佳健康模式特别强调

- A、促进健康与治疗疾病的治疗活动
- B、心理健康与生理健康的保健活动
- C、促进健康与预防疾病的保健活动
- D、预防疾病与治疗疾病的治疗活动
- E、维护健康与治疗疾病的治疗活动

答案：

C

13. 应为该患者安置的体位是

- A、去枕仰卧位，头偏向一侧
- B、中凹卧位

C、左侧卧位

D、右侧卧位

E、半坐卧位

答案：

A

14. 患者，男，40 岁。因咳嗽、咯血、胸痛、呼吸困难入院，诊断为肺结核。关于隔离措施的叙述，错误的是

A、可与另一位肺结核患者住同一间病室

B、通向外面的窗户关闭，通向过道的窗户打开，有利于通风

C、医护人员进入病房需要戴口罩

D、患者口、鼻分泌物需经消毒后弃去

E、病室内紫外线照射消毒，每天1 次

答案：

B

15. 关于社区卫生服务的原则，错误的是

A、坚持为人民服务的宗旨

B、以经济效益为首位

- C、坚持量力而行
- D、以社区人群需求为导向
- E、坚持执行结构调整政策

答案：

B

16．对急诊科护士的组织和技术管理不包括

- A、标准化
- B、最优化
- C、制度化
- D、程序化
- E、规律化

答案：

E

17．病毒性脑炎 CSF 检验的特点是

- A、外观多透明
- B、蛋白明显增高
- C、氯化物含量增高

D、有凝块

E、葡萄糖含量增高

答案：

A

答案解析：病毒性脑炎 CSF 外观清晰或微浑,蛋白质增高,细胞数增多,氯化物与葡萄糖正常

18. 下类疾病与试验关联组合错误的是

A、伤寒可做凝集试验

B、梅毒可做沉淀试验

C、风湿热可做中和试验

D、乙型肝炎可做间接血细胞凝集试验

E、流感嗜血杆菌感染可做乳胶凝集试验

答案：

D

答案解析：乙型肝炎通常用 ELISA 法检测乙型肝炎的抗原和抗体

19. 肾病综合征患者常出现的管型是

A、透明管型

B、颗粒管型

C、红细胞管型

D、宽大管型

E、脂肪管型

答案：

E

答案解析：肾病综合征患者表现为大量蛋白尿、高血脂,所以出现的管型多为脂肪管型

20. PNH 简易重要的筛查试验是

A、红细胞渗透脆性试验

B、酸化血清溶血试验

C、Rous 试验

D、蔗糖溶血试验

E、高铁血红蛋白还原试验

答案：

D

答案解析：蔗糖溶血试验是 PNH 简易重要的筛查试验

21. 盐析法沉淀蛋白的原理是

A、与蛋白结合形成不溶性盐

B、降低蛋白质的电常数

C、调节蛋白质溶液的等电点

D、使蛋白质溶液呈电中性

E、破坏水化膜

答案:

E

答案解析： 本题考查盐析法沉淀蛋白的原理,蛋白质在水溶液中的溶解度是由蛋白质周围亲水基团与水形成水化膜的程度,以及蛋白质分子带有电荷的情况决定的 当用中性盐加入蛋白质溶液,中性盐对水分子的亲和力大于蛋白质,于是蛋白质分子周围的水化膜层减弱乃至消失 同时,中性盐加入蛋白质溶液后,由于离子强度发生改变,蛋白质表面电荷大量被中和,更加导致蛋白溶解度降低,使蛋白质分子之间聚集而沉淀

22. 若检查入院后查血 CEA42ng/ml, 最可能的诊断是

A、肝硬化

B、胆梗阻

C、前列腺炎

D、结肠癌

E、胆囊炎

F、结肠癌

答案:

D

答案解析: 最可能诊断为结肠癌 诊断依据:①排便习惯改变,便次增加 ②暗红色血便,便潜血(十) ③右下腹肿块 ④伴消瘦、乏力 ⑤血 CEA 高于正常值

23. DIC 晚期可见

A、D-D 正常

B、FDP 正常

C、3P 试验阴性

D、TT 正常

E、t-PA 活性正常

答案:

C

答案解析: 3P 试验要有纤维蛋白单体存在才能阳性,而 DIC 晚期纤维蛋白单体已被降解了,所以为阴性

24. 乳腺癌重要的相关抗原是

A、CA125

B、hCG

C、CA15-3

D、CA19-9

E、NSE

答案：

A

25. PLT、MPV 均增高,可见于

A、艾滋病

B、骨髓瘤

C、败血症

D、白血病化疗后

E、反应性血小板增多症

答案：

E

答案解析：PLT、MPV 均增高,可见于反应性血小板增多症其他几个选项骨髓有抑制,PLT、MPV 不高

26. 根据以上资料,该患者可初步诊断为

- A、原发性血小板减少性紫癜
- B、血小板无力症
- C、遗传性出血性毛细血管扩张症
- D、过敏性紫癜
- E、血友病

答案:

E

答案解析: 该患者自幼有鼻出血病史,运动后大关节腔出血,考虑为出血性疾病 患者 BPC 和 BT 均正常,考虑其出血不是由血小板和血管因素引起;TT 正常可排除纤维蛋白原的异常,

27. 皮屑标本的真菌显微镜检查,标本需要用何种物质处理

- A、甲醛
- B、氢氧化钾
- C、甘油
- D、明矾
- E、氯化银

答案:

B

答案解析：皮屑、头屑标本需经 10% 氢氧化钾处理,消化其中的角质蛋白,才在镜下观察到标本中真菌的菌丝和孢子

28. 瑞氏染色下,细胞核圆形居中,染色质呈车轮状,核仁消失,胞质呈嗜多色性,该特征符合

A、原始红细胞

B、早幼红细胞

C、中幼红细胞

D、晚幼红细胞

E、网织红细胞

答案：

C

答案解析：在本题的 5 个选项中,只有中幼红细胞的形态符合题意

29. 做尿蛋白定量检查,采集尿标本的正确方法是

A、留取晨起第一次尿

B、留取中段尿

C、留取 24 小时尿

D、随时可留尿

E、留取睡前最后一次尿

答案：

C

30. 单人行人工呼吸与胸外心脏按压的比例是

A、1:5

B、5:1

C、2:30

D、15:2

E、1:15

答案：

C

31. 患儿，男，3岁。上呼吸道感染，咳嗽，咳痰。护士为其病室调节的适宜温度是

A、24~26℃, 65%~70%

B、22~24℃, 55%~65%

C、18~22℃, 50%~60%

D、18~22℃, 40%~50%

E、18~22 ℃, 50%~55%

答案:

C

32. 患儿，男，2 岁。因发热、抽搐 1 次来院就诊，诊断为高热惊厥。护士遵医嘱给予水合氯醛保留灌肠，其浓度为

A、0.5%~1%

B、10%

C、5%

D、2%

E、15%

答案:

B

33. 不属于免疫血清制备过程的是

A、选择免疫动物

B、免疫接种

C、使用杂交瘤技术

D、动物采血

E、抗血清的纯化和鉴定

答案:

C

34. 通常不引起尿液 pH 升高的是

A、进食较多的蔬菜

B、尿液被细菌污染

C、尿内含大量血液

D、服用小苏打或碳酸钾

E、进食过多的动物性肉类

答案:

E

答案解析：尿液 pH 易受食物影响:如进食含蛋白质高的食物过多或饥饿状态等,尿 pH 降低

35. 痰标本在细菌分离培养前,一般加入何种物质使痰均质化

A、胰酶

B、酸

C、碱

D、甘油

E、生理盐水

答案：

A

答案解析：痰标本的细菌分离培养前,一般用无菌生理盐水将痰洗、1 争,再加入陳酶溶液使痰均质化

36. 下列哪项试验可用于确诊葡萄糖 6-磷酸脱氢酶缺乏症

A、高铁血红蛋白还原试验

B、硝基四氮唑蓝试验

C、G-6-PD 荧光斑点法

D、G-6-PD 活性检测

E、变性珠蛋白小体试验

答案：

D

答案解析：葡萄糖 6 一磷酸脱氢酶缺乏症的确诊实验是 G-6-PD 活性检测

37. 尿液化学分析一检测不宜超过

A、0.5h

B、1.5h

C、1h

D、2.0h

E、6.0h

答案：

D

答案解析：尿液化学分析仪检测不宜超过 2h

38. 下列免疫学测定方法中敏感性最高的是

A、沉淀反应

B、凝集反应

C、补体结合试验

D、ELISA 测定

E、放射免疫测定

答案：

E

答案解析：RIA 检出限量达 ng 甚至 pg 水平, ELISA 一与 RIA 检测敏感性相仿

39. 该患者的皮肤过敏反应属于

A、I型超敏反应

B、II型超敏反应

C、III型超敏反应

D、IV型超敏反应

E、迟发型超敏反应

答案：

A

答案解析：该患者的皮肤过敏反应出现得比较早,所以属于 I型超敏反应 I型超敏反应
主要由特异性 IgE抗体介导产生,所以考虑给患者做血清 IgE的检测

40. 有关直接法荧光抗体试验的叙述不正确的是

A、简单易行,特异性好

B、敏感性较间接法差

C、检测一种抗原需要制备一种荧光抗体

D、对抗原或抗体进行测验

答案：

D

答案解析：只能检测抗原,不能检测抗体

41. AML-M1 骨髓中原粒细胞占非红系细胞的比例为

A、20%~30%

B、30%~80%

C、30%~90%

D、>80%

E、 $\geq 90\%$

答案：

E

答案解析：AML-M1 的诊断标准:原粒细胞(Ⅰ型+Ⅱ型)占骨髓非红系细胞的90%以上

42. 南丁格尔创建世界上第一所护士学校的时间是

A、1840 年

B、1854 年

C、1860 年

D、1888 年

E、1890 年

答案：

C

43. 患者入院后，护士为其讲解疾病发生的诱因及饮食要求。体现了满足患者的

A、生理性需要

B、社会性需要

C、情感性需要

D、精神性需要

E、知识性需要

答案：

E

44. （82～83 题共用题干）

患者，男，52 岁。高血压合并脑出血。现突然进入深度昏迷，出现高热、小便失禁等，准备给予留置尿管。

患者尿失禁可能属于

A、真性尿失禁

B、假性尿失禁

C、压力性尿失禁

D、急迫性尿失禁

E、功能性尿失禁

答案：

B

45. 发生溶血反应时，护士首要的处理措施是

A、安抚患者情绪

B、送余血到化验室进行检验

C、给予双侧腰部封闭

D、观察患者生命体征及尿量

E、立即停止输血，保留余

答案：

E

46. 患者，男性，19 岁。因胸痛就医，病例资料中最能明确气胸的信息是

A、胸痛发生时在与同学打篮球

B、有轻度呼吸困难

C、听诊患侧呼吸音减弱

D、胸片显示有气胸线

E、叩诊患侧呈鼓音

答案：

D

47. 患者，女，16 岁。因急性阑尾炎住院治疗，临近中考，因担心住院影响复习和考试，忧心忡忡，不能安心休养，不利于身体康复。目前影响该患者角色适应的主要因素是

A、角色行为紊乱

B、角色行为消退

C、角色行为冲突

D、角色行为强化

E、角色行为缺如

答案：

C

48. 不属于医院内感染的是

A、新生儿经胎盘获得的感染

B、护理“非典”患者时护士获得的感染

C、新生儿脐带发炎

D、患者住院 10 天后出现上呼吸道感染

E、住院患者导尿后发生泌尿系感染

答案:

A

49. 患者，男，72 岁。因胃癌晚期不能进食，需经静脉供给营养以维持生命，采用颈外静脉穿刺法输液。其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线的

A、上 1 / 3 处

B、中 1 / 3 处

C、下 1 / 3 处

D、上 2 / 5 处

E、下 2 / 5 处

答案:

A

50. 关于使用紫外线灯管消毒法的叙述，不正确的是

A、用于室内空气消毒时，距离小于 2cm ，时间 30 ～60 分钟

B、可用乙醇棉球擦拭，以保持灯管清洁

C、照射时患者须戴防护镜、穿防护衣

D、消毒时间从紫外线灯亮开始计时

E、定时监测灭菌效果

答案：

D

51. 乙型脑炎的传播途径是

A、接触传播

B、空气传播

C、注射传播

D、饮食传播

E、生物媒介传播

答案：

E

52. 护理程序的理论框架是

A、沟通理论

B、应激理论

C、适应理论

D、一般系统论

E、基本需要层次论

答案:

D

53. 取粪便培养标本时，无菌长棉签插入肛门的长度是

A、6~7cm

B、7~10cm

C、10~15cm

D、15~20cm

E、20~25cm

答案:

A

54. 为女患者行导尿术，消毒尿道口及小阴唇的顺序为

A、自上而下，外→内→外

B、自上而下，内→外→内

C、自下而上，外→内→外

D、自下而上，内→外→内

E、尿道口外螺旋式消毒 2 次

答案:

B

55. 患者，男，50 岁。有吸烟史，咳嗽 2 个月。咯血或痰中带血 2 周。X 线胸片示左肺上叶有 1.5cmx2.0cm 病灶。患者入院后入睡困难，易醒。引起该患者睡眠不佳的主要原因是

A、环境改变

B、焦虑情绪

C、内分泌变化

D、睡眠周期节律破坏

E、病房不能吸烟

答案：

A

56. 影响舒适的心理方面因素是

A、角色行为冲突

B、面对各种压力

C、陌生病房环境

D、严重噪音干扰

E、身体活动受限

答案：

B

57. 此时为了不增加患者的痛苦，应

A、尽量缩短交谈时间

B、提供宣泄情感的机会

C、运用非语言沟通技巧

D、使用幽默技巧

E、严格按既定的提纲进行谈话

答案：

A

58. 患儿，男，1岁。因肺部感染，需肌内注射青霉素治疗，最佳注射部位是

A、臀大肌

B、臀中肌

C、上臂三角肌

D、前臂掌侧下缘

E、上臂三角肌下缘

答案：

B

59. 患者睡前或清晨起床前，将透明胶带贴于肛门周围处是检查

A、蛲虫

B、阿米巴原虫

C、细菌性痢疾

D、弓形虫

E、疟疾

答案：

A

60. 膀胱内有尿则会不自主地流出，使膀胱处于空虚状态，属于

A、真性尿失禁

B、假性尿失禁

C、压力性尿失禁

D、反射性尿失禁

E、急迫性尿失禁

答案：

A

61. 患者男，49 岁。胆石症患者，对其进行非手术治疗期间，发现绞痛频繁发作，逐渐加重，黄疸更显著，血压下降，脉搏细速而弱，腹肌紧张。此时护士应该

- A、进一步观察其病情变化
- B、解痉止痛
- C、纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
- D、及时报告医生做好术前准备
- E、给予抗生素预防感染

答案：

D

62. 关于慢性再生障碍性贫血的论述,正确的是

- A、网织红细胞都 $<1\%$
- B、EPO 减低
- C、粒细胞绝对值 $<0.5 \times 10^9/L$
- D、HbF 减低
- E、骨髓可呈灶性增生

答案：

E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585204113024011224>