2024年福建省顺昌县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库含答案（满分必刷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

A：布地奈德

B：孟鲁司特

C：沙美特罗

D：多索茶碱

答案：D

2.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释

B：静脉用药剂量为口服的1／2时即可达到同样疗效

C：肠道外用药宜静脉给药，不主张肌内注射

D：应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

答案：A

3.主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A：利卡多因

B：普萘洛尔

C：奎尼丁

D: 维拉帕米

答案：C

4.下列不属于雌激素作用部位的是

A: 子宫

B: 肾脏

C: 输卵管

D: 阴道

答案：B

5.（2021年真题）一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 梭状芽孢杆菌

B: 粪肠球菌

C: 双歧杆菌

D: 嗜酸乳杆菌

答案：A

6.（2015年真题）属于润滑性泻药的是（）。

A: 甘油（开塞露）

B: 酚酞

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇4000

答案：A

7.需停5周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A: 吡拉西坦

B: 吗氯贝胺
C: 氟西汀
D: 文拉法辛
答案：C

8.可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是
A: 西司他丁
B: 亚胺培南
C: 厄他培南
D: 美罗培南
答案：C

9.长春新碱
A: 直接破坏 DNA 结构和功能
B: 干扰 RNA 转录
C: 影响蛋白质合成和功能
D: 干扰核酸生物合成
答案：C

10.（2015 年真题）患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（）。
A: 水肿
B: 光过敏
C: 干咳
D: 低血糖
答案：C

11.一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 嗜酸乳杆菌

B: 双歧杆菌

C: 梭状芽孢杆菌

D: 粪肠球菌

答案：C

12.为光学异构体的氟喹诺酮类药物是()

A: 呋喃妥因

B: 左氧氟沙星

C: 氯霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：B

13.下述药物中不属于消毒防腐药的是

A: 硼酸

B: 戊二醛

C: 氨茶碱

D: 过氧乙酸

答案：C

14.（2016年真题）抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 奥司他韦

B: 利巴韦林

C: 伊曲康唑

D: 拉米夫定

答案：D

15.外用无效，口服治疗体癣，毛发癣的药物是

A：灰黄霉素

B：咪康唑

C：克霉唑

D：制霉菌素

答案：A

16.（2021年真题）可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做HLA-B*5801基因筛查的抗痛风药物是（）

A：秋水仙碱

B：非布司他

C：别嘌醇

D：苯溴马隆

答案：C

17.影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A：紫杉醇

B：他莫昔芬

C：长春碱

D：羟喜树碱

答案：C

18.对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

A：老年患者及肾功能不全者慎用

B：只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能

C：溶解后尽快使用，尽量避免同低pH的注射液配伍

D: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏

答案：B

19.可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 替硝唑+苯巴比妥

B: 替硝唑+华法林

C: 甲硝唑+乙醇

D: 奥硝唑+乙醇

答案：A

20.禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

A: 氟喹诺酮类

B: 头孢菌素类

C: 大环内酯类

D: 氨基糖苷类

答案：A

21.可选择性抑制MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

A: 苯海索

B: 左旋多巴

C: 恩他卡朋

D: 司来吉兰

答案：D

22.铜绿假单胞菌性结膜炎常用()

A: 夫西地酸滴眼剂

B: 1%泼尼松滴眼液

C: 金霉素眼膏

D: 多黏菌素 B 滴眼液

答案：D

23.（2015 年真题）可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β2 受体激动剂是（）。

A: 沙美特罗

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 多索茶碱

答案：A

24.入睡困难患者首选哪种催眠药物

A: 氯硝西泮

B: 劳拉西泮

C: 艾司唑仑

D: 谷维素

答案：C

25.下述不属于质子泵抑制剂的是

A: 法莫替丁

B: 泮托拉唑

C: 雷贝拉唑

D: 奥美拉唑

答案：A

26.按作用时间分类，属于超长效的胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 普通胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

27.根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A: 中午 12 时左右

B: 晚餐前

C: 上午 8 时左右

D: 下午 4 时左右

答案：C

28.下列关于 5α 还原酶抑制剂的描述，错误的是

A: 是有性生活要求的患者治疗 BPH 的一线用药的

B: 可以缩小前列腺体积

C: 对膀胱颈和平滑肌没有作用

D: 与 α1 受体阻断剂相比，更易引起性功能障碍

答案：A

29.主要经胆汁排泄的是

A: 阿莫西林

B: 庆大霉素

C: 头孢噻肟

D: 头孢哌酮

答案：D

30.与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

A: 氟胞嘧啶

B: 阿糖胞苷

C: 卡泊芬净

D: 两性霉素

答案：C

31.下述关于甘油的描述，错误的是()

A: 用于便秘的治疗

B: 属于润滑性泻药

C: 孕妇慎用

D: 属于渗透性泻药

答案：D

32.（2019年真题）患者，女，63岁，因心绞痛急诊就医，诊断为ST段抬高心肌梗死，血压175/95mmHg，心率110次/分，该患者适宜使用的药物是（）

A: 氨氯地平

B: 贝那普利

C: 美托洛尔

D: 硝普钠

答案：C

33.可以改善心肌缺血的是

A: 葡萄糖

B: 果糖

C: 维生素

D: 脂肪乳

答案：B

34.患者，女，46岁。以"口角歪斜3天"之主诉入院。3天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

B: 骨质疏松

C: 佝偻病

D: 骨发育不全

答案：A

35.（2021年真题）对角鲨烯环氧酶有非竞争性和可逆性抑制作用，属于丙烯胺类的抗真菌药物（）

A: 米卡芬净

B: 克霉唑

C: 环吡酮胺

D: 特比萘芬

答案：D

36.羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌内注射次数

A: 4次

B: 2次

C: 1次

D: 3次

答案：C

37.（2020年真题）服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 头孢呋辛

B: 克林霉素

C: 磺胺甲噁唑

D: 左氧氟沙星

答案：C

38.可用于1岁以下婴幼儿急、慢性腹泻,具有固定和清除多种病原体和毒素药物是()

A: 蒙脱石

B: 番泻叶

C: 地芬诺酯

D: 洛哌丁胺

答案：A

39.长期使用可使血钾水平升高的药品是

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 吲达帕胺

答案：A

40.可与吸入性糖皮质激素合用的长效M胆碱受体阻断剂是

A: 沙美特罗

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 多索茶碱

答案：B

41.某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

A：右旋糖酐
B：阿托品
C：酚妥拉明
D：糖皮质激素
答案：D

42.胰岛素增敏剂是
A：阿卡波糖
B：西格列汀
C：胰岛素皮下注射
D：吡格列酮
答案：D

43.癫痫大发作合并小发作选用
A：丙戊酸钠
B：苯巴比妥
C：乙琥胺
D：苯妥英钠
答案：A

44.与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是
A：苯巴比妥
B：利福平
C：环孢素
D：四环素
答案：C

45.在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A：2周内

B：3周内

C：1周内

D：4周内

答案：A

46.急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

A：3小时内

B：12小时内

C：24小时内

D：8小时内

答案：A

47.（2019年真题）若无禁忌，冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是（）

A：阿司匹林

B：依诺肝素

C：肝素

D：氯吡格雷

答案：A

48.皮肤念珠菌病可选用()

A：维A酸

B：林旦霜

C：阿达帕林

D：酮康唑

答案：D

49.选择性沉积在牙齿和骨骼中,不可用于8岁以下患儿的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 四环素类

C: 大环内酯类

D: 氨基糖苷类

答案：B

50.地高辛的主要适应证不包括

A: 慢性室性心律失常

B: 急性心力衰竭

C: 慢性心力衰竭

D: 室上性心动过速

答案：A

51.阿司匹林预防血栓形成的机制是

A: 抑制PABA的合成

B: 抑制GABA的合成

C: 促进PG的合成

D: 抑制TXA2的合成

答案：D

52.氯丙嗪常见的不良反应

A: 细胞缺氧、酸中毒、休克

B: 过敏反应

C: 锥体外系反应

D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：C

53.可掩盖顺铂所致的耳鸣、眩晕等症状的药物是

A：丙磺舒

B：呋塞米

C：甲氨蝶呤

D：苯海拉明

答案：D

54.糖尿病合并心血管疾病者可选用()

A：格列喹酮

B：格列吡嗪

C：胰岛素

D：格列齐特

答案：B

55.人体内缺乏维生素E时会导致()

A：夜盲症

B：脚气病

C：不孕症

D：佝偻病

答案：C

56.抗菌药物联合用药的目的不包括

A：扩大抗菌范围

B：延长作用时间

C：减少耐药性的发生

D：提高疗效

答案：B

57.患者,男,60岁诊断为房性心律失常,医生给予胺碘酮治疗。近日,因胃溃疡开始用西咪替丁,出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁,出现窦性心动过缓,原因()

A: 西咪替丁抑制CYP3A4,升高胺碘酮血浆药物浓度

B: 西咪替丁抑制CYP1A2,升高胺碘酮血浆药物浓度

C: 西咪替丁诱导CYP2C9,升高胺碘酮血浆药物浓度

D: 胺碘酮与西咪替丁竞争CYP2C19,减慢胺碘酮的代谢

答案：A

58.（2018年真题）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防MRSA感染,可选用（）

A: 青霉素G

B: 头孢唑林

C: 万古霉素

D: 氨曲南

答案：C

59.易通过血脑屏障的抗真菌药物是

A: 咪康唑

B: 酮康唑

C: 克霉唑

D: 氟康唑

答案：D

60.双香豆素与阿司匹林合用可

A: 与其竞争结合血浆蛋白

B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C: 产生协同作用

D: 竞争性对抗

答案：C

61.下列药物可首选用于治疗小细胞肺癌的是()

A: 奥沙利铂

B: 替尼泊苷

C: 长春新碱

D: 依托泊苷

答案：D

62.膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他脒联合使用，以免发生

A: 低钾血症

B: 高钾血症

C: 低钙血症

D: 高钙血症

答案：C

63.H1受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

A: 主要代表药有法莫替丁

B: 可用于治疗变态反应性失眠

C: 可用于治疗妊娠呕吐

D: 主要用于治疗变态反应性疾病

答案：A

64.治疗期间避免献血的药物

A: 维A酸

B: 异维A酸

C: 阿达帕林

D: 壬二酸

答案：B

65.过量引起严重心脏毒性的药物是

A: 氨氯地平

B: 地高辛

C: 哌唑嗪

D: 卡托普利

答案：B

66.服用西地那非可导致()

A: 高血压

B: 视物模糊、复视

C: 心律失常

D: 肾功能异常

答案：B

67.下列维生素中，属于水溶性的是()。

A: 维生素 A

B: 维生素

C: 维生素

D: 维生素

答案：D

68.茶碱浓度 20μg/ml 时会出现

A: 为有效的治疗浓度

B: 心动过速、心律失常

C: 呼吸、心跳停止

D: 恶心、呕吐、失眠

答案：B

69.在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

A: 苯丙氨酸

B: 精氨酸

C: 色氨酸

D: 谷氨酸

答案：B

70.甲氧苄啶联用华法林使

A: 肾毒性增加

B: 抗凝作用增强

C: 半衰期缩短

D: 白细胞减少风险增加

答案：B

71.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

B: 复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

C: 左炔诺孕酮（1

D: 十一酸睾酮（40mg）

答案：C

72.小剂量孕激素用于

A: 再生障碍性贫血

B: 回奶

C：痛经

D：绝经期综合征

答案：C

73.属于5-HT3受体阻断剂的止吐药物是

A：甲氧氯普胺

B：甲地孕酮

C：阿瑞吡坦

D：格雷司琼

答案：D

74.通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

A：氢氯噻嗪

B：吲达帕胺

C：乙酰唑胺

D：托拉塞米

答案：C

75.防止急性深静脉血栓形成的药物是

A：达肝素钠

B：维生素K1

C：维生素B12

D：香豆素类

答案：A

76.有或曾有充血性心力衰竭病史的心室功能障碍患者禁用()

A：氟胞嘧啶

B：伊曲康唑

C：氟康唑

D：伏立康唑

答案：B

77.刺激胰岛B细胞释放胰岛素的是

A：磺酰脲类

B：A和B均无效

C：胰岛素

D：二甲双胍

答案：A

78.糖尿病合并发热、感染者可选用()

A：胰岛素

B：格列喹酮

C：格列齐特

D：格列吡嗪

答案：A

79.连续使用应间隔4h以上

A：羟甲唑啉

B：赛洛唑啉

C：酚甘油滴耳液

D：麻黄碱

答案：A

80.目前仍用作一线抗结核药的是

A：甲硝唑

B：二氯沙奈

C：链霉素

D：青蒿素

答案：C

81.金刚烷胺和美金刚合用

A：可增加抗胆碱不良反应的危险

B：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

C：增加锥体外系不良反应的风险

D：增加肾毒性

答案：B

82.影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

A：伯氨喹

B：乙胺嘧啶

C：奎宁

D：青蒿素

答案：B

83.治疗危重深部真菌感染的唯一有效药是()

A：两性霉素B

B：克林霉素

C：青霉素

D：氯霉素

答案：A

84.高效抑菌药是

A：异烟肼

B：氯霉素

C：头孢菌素

D：磺胺嘧啶

答案：D

85.（2016年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

A：血管舒张

B：血压升高

C：共济失调

D：心率减慢

答案：B

86.抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

A：谷丙胺

B：法莫替丁

C：枸橼酸铋钾

D：奥美拉唑

答案：D

87.用于疥疮和阴虱病的药物是()

A：硼酸

B：维A酸

C：林旦

D：过氧苯甲酰

答案：C

88.（2019年真题）某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/586124221055011030