

全科医学住院医师：外科找答案（题库版）

1、单选 患者，女，17岁，发热5天伴纳差2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为85%。左脚趾经切开引流处理后应给（江南博哥）予（）。

- A. 大剂量青霉素
- B. 激素
- C. 退热剂
- D. 庆大霉素
- E. 维生素

正确答案：A

2、单选 患者，男，15岁。足部刺伤2小时，已接受计划性混合疫苗注射，为预防破伤风，最重要的正确的处置是（）。

- A. 刺伤部切开不予缝合
- B. 注射TAT750U
- C. 注射TAT1500U
- D. 注射TAT3000U
- E. 注射破伤风类毒素0.5ml

正确答案：E

参考解析：凡10年内做过自动免疫者，伤后仅需注射破伤风类毒素0.5ml即可预防破伤风。

3、单选 无痛性便血，便后肛门部脱出樱桃状肿物（）。

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

正确答案：D

参考解析：蹄铁型肛瘘指肛管左右侧均有外口，宜切开外口至两侧管道相通处，再用挂线疗法。4. 便后肛门部肿物疼痛明显，一般为外痔引起。及活组织检查（punchbiopsy）确诊。

4、多选 伤口愈合的类型通常有（）。

- A. 延期愈合
- B. 一期愈合
- C. 不愈合
- D. 二期愈合
- E. 三期愈合

正确答案：B, D, E

5、单选 男性，42岁。B超发现左肾结石1cm大小，平时无明显症状，偶有腰部酸胀不适感。既往体健，无排石史。上尿路结石最常见的症状是（）。

- A. 血尿+尿痛
- B. 腰痛+血尿
- C. 腰痛+脓尿
- D. 尿频+血尿
- E. 腰痛+尿痛

正确答案：B

6、单选 女性，48岁，发现右乳内上象限肿物1周。检查：局部可及2cm大小肿物，表面皮肤凹陷，肿物质硬，表面不光滑，活动。右腋下可及1cm大淋巴结，质较硬，既往患者有肺结核病史。最可能的诊断（）。

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维瘤
- C. 乳房结核
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳腺内乳头状瘤

正确答案：A

参考解析：乳腺肿物引起表面皮肤凹陷是由于肿瘤侵犯Cooper韧带，同时右腋下可及质硬、肿大淋巴结，考虑为乳腺癌。

7、单选 女，32岁，发现右乳房肿物3个月，偶有胀痛，检查右乳内上象限可及3cm×2cm肿物，呈伞状，有结节，周围边界不清，质中等，活动可，同侧腋下未及肿大淋巴结。最可能的诊断为（）。

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 慢性囊性乳腺病
- C. 乳腺癌
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺结核

正确答案：B

参考解析：慢性囊性乳腺病临床上表现胀痛，乳腺内有结节，边界不清。

8、单选 巴德-吉利亚阻塞综合征引起（）。

- A. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前
- B. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后
- C. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦
- D. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝前
- E. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后

正确答案：E

参考解析：门脉高压症分为肝前型、肝内型和肝后型三类。在肝内型又分为窦前阻塞、肝窦和窦后阻塞两种。

9、单选 男性，42岁。B超发现左肾结石1cm大小，平时无明显症状，偶有腰部酸胀不适感。既往体健，无排石史。该患者还需要做的检查是（）。

- A. 尿培养
- B. 膀胱镜检查
- C. MRI
- D. KUB+IVU
- E. 尿流率检查

正确答案：D

10、单选 女，38岁，左乳外上象限可及3cm×2cm肿块，与周围皮肤有粘连，左腋窝可及1cm大淋巴结、活动，未触及远处淋巴结，临床活检为左乳癌。TNM分期应为（）。

- A. T1N1M3
- B. T2N1M0
- C. T2N2M2
- D. BN1M0
- E. T3N2M0

正确答案：B

参考解析：肿瘤直径2~5cm为T2；同侧可及肿大淋巴结，活动，为N₁；无远处转移为M₀。因此，该病人的TNM分期为T2N1M0。

11、填空题 Charcot三联征包括（）、（）、（）。

正确答案：腹痛；黄疸；畏寒发热

12、填空题 痔在齿线以上称为（），在齿线以下称为（）。

正确答案：内痔；外痔

13、单选 患者，女，17岁，发热5天伴纳差2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为85%。初步诊断是（）。

- A. 左脚趾甲沟炎
- B. 左脚趾坏疽
- C. 左侧小腿丹毒
- D. 左小腿蜂窝织炎
- E. 感染性休克

正确答案：A

14、多选 清创时伤口的处理原则是（）。

- A. 去除异物，切除失去生机的组织
- B. 尽量保留头、面、手部皮肤组织
- C. 较大的游离骨片，清创后放回原处
- D. 受伤的肌腱、神经尽量恢复
- E. 体腔部位的伤口原则上一期缝合

正确答案：A, B, C, D, E

15、填空题 脾破裂有三种形式，即（）、（）和（）。

正确答案：真性脾破裂；中央型脾破裂；迟发性（包膜下）脾破裂

16、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。此病的预防主要是（）。

- A. 开始一周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B. 加强保肝
- C. 加强导管护理、无菌操作
- D. 纠正水和电解质紊乱，预防酸中毒发生
- E. 保护肾功能

正确答案：A

17、单选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。患者就诊后，首先应行什么检查（）。

- A. 腹部平片
- B. IVU 检查
- C. 尿常规检查
- D. 尿细菌培养
- E. 尿沉渣查抗酸杆菌

正确答案：C

18、填空题 肛裂三联征是指（）、（）、（）。

正确答案：肛裂；肛乳头肥大；前哨痔

19、填空题 阑尾切除后的主要并发症有（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案：阑尾系膜出血；切口感染；粘连性肠梗阻；阑尾株炎；粪瘘

20、单选 患者男性，78岁，1天前因右腹股沟疝嵌顿手法回纳后，即感腹痛。现因腹痛加剧、腹胀、气促、呕吐而来就诊。查体：神志淡漠，四肢厥冷。脉细速 140 次/分，血压 60/40mmHg，腹胀，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以脐右最为明显，诊断肠坏死穿孔、弥漫性腹膜炎、中毒性休克。最常见的腹外疝是（）。

- A. 脐疝
- B. 股疝
- C. 切口疝
- D. 腹股沟斜疝
- E. 腹股沟直疝

正确答案：D

21、单选 男，25岁。因高位小肠瘘 1 天入院，入院后经颈内静脉插管滴入肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛和反跳痛。观察 8 小时如果仍然有高热，应采取的措施是（）。

- A. 肠外营养液中增加胰岛素
- B. 雾化吸入
- C. 胸腔穿刺抽气
- D. 拔除中心静脉导管
- E. 咽拭子细菌培养

正确答案：D

22、单选 男性，45岁。左腰部胀痛、少尿伴恶心呕吐7天入院。既往有排石史。查体：右肾区压、叩痛（+）。血清肌酐1050 μ mol/L，血钾5.9mmol/L，尿常规红细胞充满/HP，白细胞2~3/HP。B超检查：发现左肾为孤立肾，伴肾盂积水及左输尿管上段扩张。尿路X线平片：肠道积气重，左输尿管中段可疑结石。检查发现左输尿管中段结石，大小0.8cm根据患者目前情况，治疗首先应采取（）。

- A. 输尿管切开取石
- B. 经皮肾穿刺造瘘引流尿液
- C. 输尿管逆行插管引流尿液
- D. 血液透析
- E. 体外冲击波碎石

正确答案：D

23、单选 男，33岁。2周前开始出现牙痛，牙龈肿胀，20小时前突然出现左颈部肿胀、剧痛，伴高热。查体：左颈部肿胀，张力大，压痛，无结节。处理原则是（）。

- A. 长期抗生素治疗
- B. 穿刺引流
- C. 不可行气管切开
- D. 早期切开引流
- E. 避免手术治疗

正确答案：D

24、多选 影响伤口愈合的局部因素有（）。

- A. 伤口内有血肿
- B. 伤口内有异物和坏死组织
- C. 术中广泛剥离，术后缝合过密
- D. 伤口包扎过紧
- E. 局部感染

正确答案：A, B, C, D, E

25、单选 气性坏疽最关键的治疗措施是（）。

- A. 大剂量青霉素
- B. 高压氧疗法
- C. 输血、输液

- D. 紧急手术处理
- E. 补充足够的营养

正确答案：D

参考解析：气性坏疽是一种特异性的厌氧菌感染，缺氧环境利于其繁殖，加重感染，故手术切开，使缺氧环境变为有氧环境，从而抑制厌氧细菌的繁殖，控制感染。

26、单选 男性，35岁。间歇性右下腹绞痛3天，尿常规：红细胞充满/HP，白细胞2~3/HP，腹部X线平片：可见右输尿管下段走行区高密度阴影0.6cm，IVU检查：可见右输尿管下段结石，其上段输尿管轻度扩张，右肾轻度积水。治疗可采取（）。

- A. 膀胱切开取石术
- B. 套石术
- C. 药物排石
- D. 大量饮水等待自然排出
- E. 体外冲击波碎石

正确答案：D

27、单选 患者男性，78岁，1天前因右腹股沟疝嵌顿手法回纳后，即感腹痛。现因腹痛加剧、腹胀、气促、呕吐而来就诊。查体：神志淡漠，四肢厥冷。脉细速140次/分，血压60/40mmHg，腹胀，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以脐右最为明显，诊断肠坏死穿孔、弥漫性腹膜炎、中毒性休克。儿童患腹股沟疝，首选的术式（）。

- A. 单纯疝囊高位结扎术
- B. 佛格逊法
- C. 麦克凡法
- D. 巴西尼法
- E. 疝形成术

正确答案：A

28、单选 乳腺癌患者其乳腺包块大小约5cm×5cm，病理诊断为：浸润性导管癌，查淋巴结见转移癌（8/20），肺部X线检查发现转移灶。此病变为哪一期（）。

- A. 0期
- B. I期
- C. II期
- D. III期
- E. IV期

正确答案：E

29、填空题 腹部损伤可分为（）和（）两类。

正确答案：闭合性损伤；开放性损伤

30、单选 判断血管闭塞的程度应做（）。

- A. 肢位位置试验（Buerger 试验）
- B. 硫酸镁静脉滴注试验
- C. 交感神经阻滞试验
- D. 下肢动脉搏动试验
- E. 动脉造影

正确答案：E

参考解析：施行腰交感神经阻滞试验，如阻滞后期皮肤测温升高超过 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ ，提示痉挛因素占主要。

31、多选 伤口放置引流物的适应证包括（）。

- A. 脓肿或积液部位切开后
- B. 感染较重、止血不彻底的创面
- C. 肝切除术后
- D. 脾切除术后
- E. 胆道术后

正确答案：A, B, C, E

32、单选 男性，35 岁。间歇性右下腹绞痛 3 天，尿常规：红细胞充满/HP，白细胞 $2\sim 3/\text{HP}$ ，腹部 X 线平片：可见右输尿管下段走行区高密度阴影

0.6cm，IVU 检查：可见右输尿管下段结石，其上段输尿管轻度扩张，右肾轻度积水。根据患者情况，应给予的治疗是（）。

- A. 大量饮水，促使结石排出
- B. 体外冲击波碎石
- C. 立即手术取石
- D. 输尿管导管套石
- E. 用药物解除绞痛症状

正确答案：E

33、填空题 引起机械性肠梗阻的原因有（）、（）、（）。

正确答案：肠腔堵塞；肠管受压；肠壁病变

34、单选 男性，46 岁。右肾区疼痛，间歇性肾绞痛 1 个月。尿检：红细胞

$10\sim 15$ 个/HP，B 超检查：左肾积水轻一中度，IVU 检查：左输尿管上段有一 1.0cm 的结石，结石以上输尿管扩张 1.2cm，双侧肾盂肾盏显影好。最佳的治疗方案是（）。

- A. 输尿管切开取石
- B. 输尿管套石术
- C. 左肾造瘘术
- D. 体外冲击波碎石
- E. 中西药物排石

正确答案：D

35、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。此病的发病机制是由于（）。

- A. 内源性胰岛素分泌不足
- B. 等渗性脱水
- C. 输液导管细菌滋生
- D. 肝功能损害
- E. 肾功能损害

正确答案：A

36、单选 不能引起特异性感染的是（）。

- A. 破伤风杆菌
- B. 结核杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 真菌
- E. 梭状芽孢杆菌

正确答案：C

参考解析：特异性感染指破伤风杆菌、梭状芽孢杆菌、真菌、结核杆菌等感染。

37、单选 代谢性碱中毒时不应补给氯化钾的情况是（）。

- A. 尿量钾含量减少
- B. 尿量低于 30ml/h
- C. 尿量超过 60ml/h
- D. 尿呈酸性
- E. 尿呈碱性

正确答案：B

参考解析：代谢性碱中毒时几乎都伴发低钾血症，但补钾应在尿量超过 40ml/h 后进行。

38、填空题 腹内器官组织损伤可能有（）、（）和（）三种病变。

正确答案：有腔器官破裂；实质器官破裂；血管破裂

39、单选 女，17岁。颈部被刀割伤。查体：颈部横切口，可闻及呼吸声，呼吸困难，皮下可触及捻发音。对此患者重要的急诊处理是（）。

- A. 止血
- B. 缝合伤口，引流
- C. 吻合神经
- D. 局部填塞
- E. 清理呼吸道，保持呼吸道通畅

正确答案：E

40、多选 老年男性，65岁，既往有胆囊结石病史，因上腹痛4小时由家属送诊，查体：意识淡漠，血压90/50mmHg，右上腹部肌紧张。此时最恰当的治疗措施是（）

- A. 紧急完善术前准备，急诊手术
- B. 积极补液，抗休克治疗
- C. 同时行床旁B超检查
- D. 紧急化验血常规、肝功、胰酶
- E. 行腹部CT检查
- F. 行腹部平片检查

正确答案：A, B, C, D

41、多选 手术中常用的止血方法有（）。

- A. 压迫止血
- B. 钳夹止血
- C. 结扎止血
- D. 填塞止血
- E. 电凝止血

正确答案：A, B, C, D, E

42、填空题 发生绞窄性肠梗阻的原因为（）、（）、（）等。

正确答案：肠系膜血管受压；血栓形成；栓塞

43、填空题 脾脏的基本功能包括（）、（）、（）、（）。

正确答案：凝血；免疫；造血；储血

44、填空题 先天性巨结肠的病理基础是病变肠壁（）缺如的肠道发育畸形所致。

正确答案：神经丛内神经节细胞

45、填空题 甲状腺癌的病理类型有（）、（）、（）、（）。

正确答案：乳头状腺癌；滤泡状腺癌；髓样癌；未分化癌

46、单选 对下肢静脉曲张较有效且常用的术式是（）。

- A. 高位结扎术或瓣膜环缩术
- B. 高位结扎加静脉剥脱术
- C. 筋膜下交通支结扎术
- D. 局部注射硬化剂
- E. 非手术治疗

正确答案：B

47、单选 肛周脓肿（）。

- A. 不凝的血性液体
- B. 黄绿色透明液体，无臭味
- C. 稀脓性液体，略带臭味
- D. 淡黄色透明液体

E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体

正确答案：C

48、单选 男，42岁。右颈前气管三角区可及多发肿大淋巴结，质硬，较固定，最常见的病因（）。

- A. 急性扁桃体炎
- B. 乳腺癌
- C. 肺结核
- D. 甲状腺癌
- E. 肺癌

正确答案：D

49、单选 患者，男，70岁，体重60kg，全胃切除术后5天，大量肠液自腹腔引流管引出，左上腹疼痛。查体：左上腹轻压痛，无肌紧张。该病人热量每天基本需要量是（）。

- A. 800kcal
- B. 1200kcal
- C. 1500kcal
- D. 2000kcal
- E. 2500kcal

正确答案：C

50、单选 外科感染的局部治疗方法中错误的是（）。

- A. 散瘀消肿
- B. 患部适当活动，促进循环
- C. 伴有严重中毒症状时切开减压
- D. 必要时切除发炎脏器
- E. 加强营养支持

正确答案：B

参考解析：外科感染的局部治疗：①患部制动与休息，有利于炎症局限化和消肿，减轻疼痛。②外用药以改善局部血液循环，散瘀消肿、加速感染局限化，促进肉芽生长。③物理疗法有改善局部血液循环，增加抵抗力，促进炎症的吸收、局限化作用。④手术治疗包括脓肿的切开引流，伴有严重中毒症状的感染部位的切开减压，以及发炎脏器的切除。

51、填空题 Whipple 三联征是（）、（）、（）。

正确答案：阵发性低血糖；发作时血糖低于 2.8mmol/L ；口服或静脉给葡萄糖后缓解

52、单选 长期肠外营养支持者，应选择穿刺血管是（）。

- A. 颈内静脉
- B. 大隐静脉

C. 颈外静脉

D. 足背静脉

E. 头静脉

正确答案：A

参考解析：不超过 2 周的肠外营养，可通过周围静脉补给；长期的肠外营养应采用中心静脉插管补充，24 小时连续滴注。导管可经颈内静脉或锁骨下静脉放置到上腔静脉。

53、单选 下肢深静脉血栓阻塞（）。

A. Trendelenberg 试验（+）

B. Perthes 试验（+）

C. Pratt 试验（+）

D. Buerger 试验（+）

E. Trendelenberg 试验（-）

正确答案：B

54、单选 低位肛瘘宜采用（）。

A. 肛瘘切开术

B. 肛瘘挂线疗法

C. 肛瘘外口扩大术

D. 药物保留灌肠治疗

E. 肛瘘部分切开+肛瘘挂线术

正确答案：A

55、多选 腹外疝嵌顿的原因包括（）。

A. 腹内压力突然升高

B. 疝环小

C. 粪便嵌顿

D. 腹壁肌肉紧张收缩内环

E. 疝内容物粘连

正确答案：A, B, C

参考解析：疝嵌顿的机制有二。一是弹性嵌顿：腹内压力突然升高，疝内容物被迫冲击经过狭小坚韧的疝门，强行将其扩大而进入疝囊，随着腹腔压力又恢复正常，疝颈弹性收缩，卡住内容物，使其无法回纳；二是粪便嵌顿。

56、单选 男性，32 岁。右肾绞痛后尿闭 1 天。腹部平片可见双侧输尿管中段各有结石一枚，约 1cm 大小，左肾内还有鹿角形结石。急诊处理应先采用（）。

A. 服中药排石

B. 中西医结合解痉排石

C. 膀胱镜下输尿管插管引流尿液

D. 应用利尿药物

E. 立即手术输尿管切开取石

正确答案：C

57、单选 男性，46岁。右肾区疼痛，间歇性肾绞痛1个月。尿检：红细胞10~15个/HP，B超检查：左肾积水轻一中度，IVU检查：左输尿管上段有一1.0cm的结石，结石以上输尿管扩张1.2cm，双侧肾盂肾盏显影好。配合的治疗方法中，不正确的是（）。

- A. 应用解痉药
- B. 利尿药双氢克尿噻
- C. 多饮水每天排尿2000ml以上
- D. 每天服用止痛药
- E. 应用排石中药

正确答案：D

58、填空题 结直肠癌的病理类型分为（）、（）、（）。

正确答案：腺癌；黏液腺癌；未分化癌

59、填空题 齿线以上的神经为（）所支配，齿线以下为（）所支配。

正确答案：植物神经；脊神经

60、单选 脓液量多，淡红色，稀薄的是（）。

- A. 大肠杆菌
- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：D

61、单选 男，27岁。反复尿频，尿急，尿痛伴终末肉眼血尿2年，大量使用抗生素治疗效果欠佳，且逐渐加重，尿常规检查：白细胞++，红细胞+++。现排尿超过30次/日。诊断考虑下列哪种疾病（）。

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 慢性前列腺炎
- C. 膀胱结石
- D. 肾结核
- E. 膀胱肿瘤

正确答案：D

62、单选 患者，女性，42岁。半年前因突发呕新鲜血1800ml，住院治疗。并确诊为门脉高压症，保守治疗好转后出院。本次因大量呕血再次住院，经三腔二囊管压迫止血等综合治疗6天，出血停止24小时后，拔除三腔二囊管，又发大出血。出血停止后，拔除三腔二囊管，又发大出血的最可能原因是（）。

- A. 拔管时胃体黏膜撕裂
- B. 急性胃黏膜病变
- C. 并发胆道出血

D. 十二指肠溃疡出血

E. 应激性溃疡

正确答案：A

63、单选 脓液稠厚，有恶臭或粪臭（）。

A. 金黄色葡萄球菌

B. 溶血性链球菌

C. 大肠杆菌

D. 绿脓杆菌

E. 变形杆菌

正确答案：E

参考解析：绿脓杆菌是一种广泛存在于自然界的条件致病菌，耐药性强。当大面积烧伤后机体全身及烧伤局部抵抗力下降，易致绿脓杆菌在烧伤创面繁殖感染。

64、单选 脓液稠厚、黄色、不臭（）。

A. 金黄色葡萄球菌

B. 溶血性链球菌

C. 大肠杆菌

D. 绿脓杆菌

E. 变形杆菌

正确答案：A

参考解析：绿脓杆菌是一种广泛存在于自然界的条件致病菌，耐药性强。当大面积烧伤后机体全身及烧伤局部抵抗力下降，易致绿脓杆菌在烧伤创面繁殖感染。

65、单选 下列不应预防性应用抗生素的手术是（）。

A. 甲状腺癌根治手术

B. 腹外疝修补术

C. 门静脉高压症，分流术

D. 结肠癌根治术

E. 主动脉瘤切除血管移植术

正确答案：B

参考解析：疝修补术是无菌手术，且创面小，时间短，故可不用预防应用抗生素。而可能污染的手术及根治术等则需要术前预防性应用抗生素。

66、单选 男性病人，75岁，突发左下肢冷、痛、麻木8小时。有心房纤维颤动史。体检：左小腿中下1/3以下皮温明显降低，足部发绀，患肢无肿胀。双侧股动脉搏动可扪及，左侧腘动脉、足背动脉、胫后动脉搏动均消失，右腘动脉、足背和胫后动脉搏动好。应该进行何种处理方式（）。

A. 肌筋膜间隔切开术

B. 截肢术

- C. 导管溶栓术
- D. 静脉取栓术
- E. 动脉取栓术

正确答案：E

67、单选 男，23岁。被人刺伤颈部。查体：可见颈部伤口和血肿，同时有明显的呼吸困难，伤口有泡沫样液体流出，可能的诊断是（）。

- A. 气管损伤
- B. 臂丛神经损伤
- C. 副神经损伤
- D. 食管损伤
- E. 颈部交感神经损伤

正确答案：A

68、单选 女，36岁，发现左乳肿物3个月，近期增大明显。检查左乳外上象限可及3cm×3cm肿块，质硬，活动差，左腋下未及肿大淋巴结。行乳腺细针穿刺活检为坏死组织。进一步处理为（）。

- A. 密切观察一段时间
- B. 换用粗针再穿刺活检
- C. 切取部分肿块组织做活检
- D. 完整切除肿物及其周围组织活检
- E. 以上都不正确

正确答案：D

参考解析：根据肿块的质地，怀疑为乳癌，细胞穿刺可能为肿瘤中央坏死组织，应切除做冷冻活检。

69、单选 女，62岁，偶然发现右乳外上象限1cm×2cm×2cm肿块，质较硬，无压痛，与皮肤粘连，右腋下未及肿大淋巴结。最可能诊断（）。

- A. 乳腺囊性增生症
- B. 乳腺内乳头状瘤
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺纤维瘤
- E. 乳腺结核

正确答案：C

参考解析：老年女性，发现乳腺质硬肿块，最大可能即为乳腺癌。

70、填空题 性乳腺炎手术治疗要求切口应（）乳房后脓肿可（）。

正确答案：沿乳管方向呈放射状；沿乳房下缘作弧形切口

71、多选 直肠癌确诊过程中的3“P”检查包括（）。

- A. 直肠指诊
- B. 直肠镜检查
- C. 结肠镜检查

D. 钡灌肠造影

E. 活组织检查

正确答案：A, B, E

参考解析：直肠癌确诊顺序包括直肠指诊初诊（pal-pation）、直肠镜检查（proctoscopy）

72、填空题 乳腺检查时，手指掌面应平放于乳房上扪触，不得（）。

正确答案：用手指抓捏

73、多选 肛裂的治疗包括（）。

A. 局部止血

B. 彻底引流创面

C. 软化大便

D. 消除肛门括约肌痉挛

E. 以上都是

正确答案：B, C, D

参考解析：肛裂治疗首先应软化大便，彻底引流创面，解除括约肌痉挛，中断恶性循环，促使溃疡创面愈合。

74、填空题 单纯性甲状腺肿的病因可分为三类（）、（）、（）。

正确答案：甲状腺素原料缺乏；甲状腺素需要量增高；甲状腺合成和分泌障碍

75、填空题 乳房肿瘤常见的有（）、（）和（）。

正确答案：乳房纤维腺瘤；乳管内乳头状瘤；乳癌

76、单选 细胞外液占成人体重的（）。

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

E. 40%

正确答案：A

参考解析：细胞内液：男性约占 40%，女性约 35%；细胞外液：男性女性均占体重 20%。

77、单选 血栓闭塞性脉管炎（）。

A. Trendelenberg 试验（+）

B. Perthes 试验（+）

C. Pratt 试验（+）

D. Buerger 试验（+）

E. Trendelenberg 试验（-）

正确答案：D

78、单选 患者，男，34岁，4天前施工时右下肢被石板砸伤，X线摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温38.5℃，脉搏128次/分，血压146/92mmHg，右小腿肿胀明显，大量浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。出现本病的可能原因为（）。

- A. 清创不彻底
- B. 病人有复合创伤
- C. 未注射TAT
- D. 病人低蛋白血症
- E. 切口包扎过紧

正确答案：E

79、单选 肝炎后肝硬化引起（）。

- A. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前
- B. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后
- C. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦
- D. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝前
- E. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后

正确答案：C

参考解析：门脉高压症分为肝前型、肝内型和肝后型三类。在肝内型又分为窦前阻塞、肝窦和窦后阻塞两种。

80、单选 维持机体体液平衡的主要器官是（）。

- A. 肺
- B. 缓冲系统
- C. 肾
- D. 皮肤
- E. 肝

正确答案：C

参考解析：机体主要通过肾脏来调节体液平衡，而肾脏又受神经-内分泌的影响，通过肾素-醛固酮系统维持血容量。酸碱平衡主要通过缓冲系统、肺的呼吸和肾的调节来维持。

81、单选 便后肛门部肿物，疼痛明显者为（）。

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

正确答案：B

参考解析：蹄铁型肛瘘指肛管左右侧均有外口，宜切开外口至两侧管道相通

处，再用挂线疗法。4. 便后肛门部肿物疼痛明显，一般为外痔引起。及活组织检查（punchbiopsy）确诊。

82、单选 低钾血症少见于（）。

- A. 长期进食不足
- B. 持续胃肠减压
- C. 碱中毒
- D. 急性肾衰竭
- E. 大量输入葡萄糖和胰岛素

正确答案：D

参考解析：低钾血症病因包括长期进食不足；应用速尿和利尿酸等利尿；补液患者长期接受不含钾盐的液体；静脉营养液中钾盐补充不足；呕吐、持续胃肠减压、禁食、肠痿、结肠绒毛状腺瘤和尿管乙状结肠吻合术等。

83、单选 男性，58岁。尿频，进行性排尿困难伴夜尿增多3年，尿流中断半年。下腹X线平片及B超检查：可见膀胱区2枚大小分别为3.5cm×2.5cm×2.5cm和2.5cm×2.0cm×2.0cm结石，上尿路未见异常改变。采取治疗后，为预防结石复发，下列措施中不恰当的是（）。

- A. 定期X线或B超检查
- B. 大量饮水，使每天尿量>2000ml
- C. 定期膀胱镜检查
- D. 依结石成分调节饮食
- E. 限制钠盐摄入

正确答案：C

84、填空题 肝外胆管结石的手术原则是：（）、（）和（）。

正确答案：取尽结石；去除感染病灶；通畅引流

85、单选 女，32岁，主诉右乳胀痛，与月经周期有关，检查乳房有多个结节状肿块，边界不清，可推动，诊断首先考虑（）。

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C

参考解析：几种常见的乳房肿块的鉴别：

①纤维腺瘤 20~25岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

②乳房囊性增生 20~40岁多见，病程缓慢，周期性疼痛，多数成串，边界不清，活动度良好，无转移，无脓肿。

③乳管内乳头状瘤 40~50岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586133045240010132>