

全科医学专业知识练习题库（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、医院获得性肺炎最常见的致病菌是

- A、革兰阴性杆菌
- B、肺炎链球菌
- C、支原体
- D、真菌
- E、金黄色葡萄球菌

正确答案：A

答案解析：肺炎链球菌、支原体衣原体是社区获得性肺炎常见病原体。金黄色葡萄球菌、真菌亦是医院获得性肺炎的病原体，但最常见的致病菌是革兰阴性杆菌。

2、成年男性患者，体重 70kg。因液化气瓶爆炸，导致严重烧伤，烧伤的部位有头面、颈部、双上肢、双下肢和部分躯干前面。其中 I 度烧伤 10%，II 度烧伤 40%，III 度烧伤 5%。伤后 3 小时送来医院，来院前未行任何处理和治疗。初步检查时发现：体温 36.5℃，心率 130 次/min，血压 90/65mmHg 患者疼痛呻吟、烦躁不安、口渴，停留尿管引出深黄色尿液 100ml。血常规：WBC $15 \times 10^9/L$ ，Hb120g/L。急诊应立即采取的措施中，不正确的是

- A、给予镇静止痛剂
- B、使用抗生素和破伤风抗毒素
- C、立即开放静脉通道进行补液，纠正休克
- D、立即就地在现场实施人工呼吸
- E、立即进行血型、血常规、电解质等检查

正确答案：D

3、肱骨髁上骨折常并发

- A、缺血性骨坏死
- B、周围神经损伤
- C、膀胱尿道损伤
- D、压疮
- E、缺血性肌挛缩

正确答案：E

4、原发性肝癌炎症型的临床表现为

- A、有肝硬化表现，肝功能改变符合肝硬化

- B、有或无肝硬化表现，有持续性发热及谷丙转氨酶增高
- C、无肝硬化的表现，肝功能试验基本正常
- D、颈静脉充盈，肝大，肝颈静脉回流征阳性
- E、迅速肿大的压痛性肿块，突然出现腹膜刺激征

正确答案：B

5、溃疡性结肠炎的大便最具特征的是

- A、便秘
- B、大便变细
- C、黏液脓血便
- D、黄色稀糊样便
- E、水样便

正确答案：C

6、患者，男性，20岁。因乏力、食欲下降、厌油、恶心1周，尿黄4天就诊。查体：血压120/75mmHg，皮肤及巩膜黄染，无蜘蛛痣，无明显肝掌，浅表淋巴结无肿大，腹平软，肝肋下1cm，轻度触痛，肝区叩击痛阳性，移动性浊音(-)。列项目中暂不予考虑的检查是

- A、甲肝抗体
- B、乙肝两对半
- C、肝功能检查
- D、电子胃镜
- E、腹部B超

正确答案：D

答案解析：患者有乏力、食欲下降、厌油、恶心，尿黄消化道疾病症状，肝大，考虑肝疾病；年轻男性，无蜘蛛痣，无明显肝掌，腹平软，移动性浊音(-)，暂无肝硬化失代偿期表现，暂不考虑电子胃镜检查。

7、双人抢救者进行儿童和婴儿心肺复苏可以使用的胸部按压/通气比率为

- A、' 3:2
- B、' 5:2
- C、' 10:2
- D、' 30:2
- E、' 15:2

正确答案：E

8、以下选项不是导致急性肺源性呼吸困难中的吸气性呼吸困难的常见原

因的是

- A、喉咙异物
- B、喉头水肿
- C、慢性支气管炎
- D、白喉
- E、急性咽后壁脓肿

正确答案：C

答案解析：急性肺源性呼吸困难中的吸气性呼吸困难，常因呼吸道狭窄所致，常见于喉咙异物、喉头水肿、白喉、急性咽后壁脓肿和喉癌。

9、病理性心脏搏动增强所导致的心悸正确的是

- A、左心室肥大
- B、右心房肥大
- C、房性期前收缩
- D、左心房肥大
- E、心房颤动

正确答案：A

答案解析：病理性心脏搏动增强见于各种器质性心脏病，如高血压性心脏病所导致的左心室肥大。

10、活动后胸痛，休息缓解可见于

- A、心脏神经症
- B、气胸
- C、心绞痛
- D、心肌梗死
- E、肺梗死

正确答案：C

11、自发性气胸的诱因，常见于

- A、剧咳
- B、用力屏气
- C、剧烈运动
- D、提取重物
- E、以上都是

正确答案：E

答案解析：自发性气胸的诱因，临床上常见于剧咳、用力屏气、剧烈运动、提取重物。

12、发热最常见的原因是

- A、感染性疾病
- B、内分泌代谢障碍
- C、结缔组织和变态反应性疾病
- D、中毒
- E、无菌坏死组织的吸收

正确答案：A

13、男性，24 岁。体检时发现尿常规异常，尿蛋白（+++），尿红细胞 10~15个/HP，既往慢性乙肝病史 2 年。最恰当的治疗方案是

- A、激素口服联合环磷酰胺治疗
- B、抗病毒治疗后加用半量激素
- C、直接加用环磷酰胺
- D、足量激素口服
- E、大剂量激素冲击

正确答案：B

14、临床分型为原发性肝癌炎症型的临床表现是

- A、有肝硬化表现，伴肝功异常、腹水、黄疸
- B、有肝硬化表现，伴持续高热和转氨酶升高
- C、癌结节米粒大，遍及全肝
- D、由胆管上皮发展而来的肝癌
- E、无肝硬化表现，肝功基本正常

正确答案：B

15、应用尿激酶超早期溶栓治疗是指脑梗死后

- A、2 小时内溶栓
- B、3 小时内溶栓
- C、4 小时内溶栓
- D、6 小时内溶栓
- E、8 小时内溶栓

正确答案：D

答案解析：脑梗死后 6 小时内脑组织病理学改变不明显，6 小时后脑组织苍白、肿胀、神经细胞呈明显缺血改变，24 小时后大量神经细胞坏死。此外，在脑血流再通时存在再灌注时间窗，此时间窗为脑缺血后 6 小时内，超过此时间血流再通会导致脑损伤加重。

16、下列与类风湿关节炎活动无关的是

- A、晨僵
- B、类风湿结节
- C、关节畸形
- D、C 反应蛋白增高
- E、血沉增快

正确答案：C

答案解析：关节畸形多见于较晚期患者，与类风湿关节炎的活动无关，而其余各项均与类风湿关节炎的活动相关。

17、患者男，60 岁。慢性肺心病患者，近 10 余天来受凉后出现病情加重，神志欠清，发绀、躁动、痰不易咳出。双肺呼吸音低，可闻及干湿啰音。白细胞计数及分类增高。根据上述血气分析结果，治疗应首选

- A、综合治疗+加强镇咳祛痰
- B、综合治疗+精氨酸静脉滴注
- C、提高吸氧浓度
- D、加用地西泮镇静
- E、地塞米松静脉滴注

正确答案：B

答案解析：因该患者首要的矛盾是碱中毒，因此治疗首先要抢救碱中毒，否则缺氧难以纠正。

18、沙丁胺醇主要不良反应

- A、听力损害
- B、肌肉震颤
- C、高尿酸血症
- D、末梢神经炎
- E、球后视神经炎

正确答案：B

19、成年男性患者，体重 60kg。因化学药品仓库内失火被烧伤，失火现场浓硫酸罐破裂引起喷溅，火势烟雾严重，烧伤的部位有头部、颜面、颈部、双上肢、前后躯干和会阴部。创面污秽，烧伤深度以深Ⅱ度为主，并有散在Ⅲ度烧伤(面积小于 5%)，患者曾在库房内大声呼救，伤后 6 小时送来医院，来院前未行任何处理和治疗。初步检查时发现：体温 36.8℃，心率 130 次/min，血压 100/75mmHg，患者烦躁不安，口渴，呼吸急促，声音嘶哑，鼻毛烧焦，咽后壁有小水疱，痰中有黑色炭粒。血常规：WBC 21×10^9

- A、轻度烧伤
- B、中度烧伤
- C、重度烧伤
- D、严重烧伤
- E、特重度烧伤

正确答案：E

答案解析：烧伤总面积超过 50%，且合并吸入性损伤和烧伤休克，为特重度烧伤。

20、患者，女性，30 岁。背部肿块、红、肿、疼痛 3 天，寒战，发热 39℃。查体：背部肿物 3cmX5cm，触之有波动感。根据临床表现，该患者有脓血症征象，其主要特点是

- A、肝、肾功能损害
- B、白细胞计数 $30 \times 10^9/L$
- C、转移性脓肿
- D、休克出现早
- E、寒战后，高热呈稽留热

正确答案：C

21、对急性白血病的 FAB 分类，下列描述不正确的是

- A、可分为急性淋巴细胞白血病和急性非淋巴细胞白血病
- B、可分为 B 和 T 淋巴细胞白血病
- C、急性非淋巴细胞白血病可分为 M0~M7
- D、急性淋巴细胞白血病可分为 L1~L3
- E、M5 为急性单核细胞白血病

正确答案：B

22、颅内压增高典型的临床表现，被称为颅内压增高“三大主征”的是

- A、嗜睡，昏迷，呼吸不规律
- B、头晕，昏迷，去脑强直
- C、头痛，嗜睡，视神经盘水肿
- D、头痛，呕吐，视神经盘水肿
- E、头晕，呕吐，去脑强直

正确答案：D

23、患者，男性，37 岁。右上叶肺癌切除术后 24 小时，肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状不包括

- A、骨关节痛

- B、重症肌无力
- C、男性乳腺增大
- D、Gushing 综合征
- E、颈交感神经综合征

正确答案：E

答案解析：颈交感神经麻痹综合征是由于交感神经中枢至眼部的通路上受到任何压迫和破坏，引起瞳孔缩小、眼球内陷、上睑下垂及患侧面部无汗的综合征。据受损部位可分为中枢性障碍、节前障碍及节后障碍的损害。

24、溃疡性结肠炎内镜下的主要表现为

- A、纵行或匍行性溃疡
- B、脓性分泌物
- C、黏膜连续性、弥漫性充血、水肿和多发性小溃疡
- D、血管模糊
- E、黏膜细颗粒状

正确答案：C

25、以下选项不是原发性肝癌发病常见因素的是

- A、乙型病毒肝炎
- B、淤血性肝硬化
- C、酒精
- D、黄曲霉素
- E、华支睾吸虫感染

正确答案：C

答案解析：可导致原发性肝癌发病的主要因素有：病毒性肝炎、肝硬化、黄曲霉素、华支睾吸虫感染。

26、临床表现为咯血伴呛咳的疾病是

- A、大叶性肺炎
- B、支气管肺癌
- C、肺脓肿
- D、湿性支气管扩张
- E、化脓性肺炎

正确答案：B

答案解析：咯血伴呛咳的疾病是支气管肺癌。

27、创伤最常见的并发症是

- A、创面瘢痕形成
- B、多器官功能衰竭综合征
- C、休克
- D、感染
- E、脂肪栓塞

正确答案：D

28、青年男性患者，发热，咳大量脓臭痰，临床考虑为肺脓肿，下列胸片支持该诊断的是

- A、右肺野小淡片影
- B、右下肺一球形阴影
- C、右肋膈角消失
- D、右中叶肺不张阴影
- E、右下叶背段空洞伴液平

正确答案：E

答案解析：肺脓肿 X 线检查：早期呈大片状密度增高的阴影。成脓期，可见圆形单个空洞，有液平面。溃脓期，空洞壁变厚。恢复期，可见纵隔向患侧移位，胸膜增厚。

29、男性，46 岁。因反复低血钾伴周期性瘫痪就诊。尿量增多，骨痛。尿常规正常，血 CO_2CP 18mmol/L ，尿 pH 6.5，血钾 3.5mmol/L ，血氯 108mmol/L 。用钾盐纠正低钾血症，最佳是

- A、氯化钾
- B、枸橼酸钾
- C、谷氨酸钾
- D、葡萄糖酸钾
- E、草酸钾

正确答案：B

30、患者，女，78 岁。因左股骨骨折行内固定术后 2 周，持续发热 5 天，患者面色潮红，四肢见散在性皮疹。辅助检查：血白细胞 $11 \times 10^9/\text{L}$ ，胸片阴性，心电图提示心肌炎。可能的诊断为

- A、革兰阴性菌败血症
- B、厌氧菌败血症
- C、复数菌败血症
- D、真菌性败血症
- E、革兰阳性菌败血症

正确答案：E

31、对诊断肝硬化最有意义的检查是

- A、胃镜检查见食管下段及胃底静脉曲张
- B、腹水检查
- C、白蛋白/球蛋白比值明显倒置
- D、靛青绿廓清试验
- E、肝脾 B 超检查

正确答案：A

32、胃切除术后的远期并发症是

- A、术后感染
- B、术后出血
- C、十二指肠残端破裂
- D、术后胃瘫
- E、倾倒综合征

正确答案：E

33、患者，男性，70 岁，嗜烟 55 年。因右上叶肺炎在门诊间断治疗 3 个月，咳嗽咳痰减少，自感已无发热，乏力明显，食欲减退，体重减轻约 3.5kg，近 1 周出现咯血，声嘶，愁气。查体：体温 37.4℃，右锁骨上窝及胸骨上窝可扪及数个肿大之淋巴结，绿豆至花生米大，右胸背部可闻及局限性干啰音。经胸部 CT 及纤支镜取材活检检查诊断为右上肺鳞癌，中央型。患者在住院过程中又出现了面部水肿，右颈部及右上臂肿胀，右颈静脉及右胸壁静脉怒张，是由于

- A、肿瘤压迫右颈静脉
- B、肿瘤压迫右锁骨下静脉
- C、肿瘤压迫右锁骨下动脉
- D、肿瘤压迫上腔静脉
- E、肿瘤压迫右腋静脉

正确答案：D

答案解析：肿瘤只有压迫了上腔静脉，才会出现外观胸前以上的部位肿胀及静脉怒张。如压迫了动脉分支，出现的症状是局部疼痛、皮温降低、肤色苍白，所以不可能是压迫了动脉。如肿瘤压迫右颈静脉，肿瘤压迫右锁骨下静脉，肿瘤压迫右腋静脉项静脉受压，只会引起局部肿胀：及静脉怒张，不会引起如此大面积的组织肿胀及静脉怒张。

34、股疝的疝囊颈位于

- A、腔隙韧带外侧，腹股沟韧带上方
- B、腹壁下动脉外侧，腹股沟韧带上方
- C、腹壁浅动脉外侧，腹股沟韧带上方
- D、腹壁浅动脉内侧，腹股沟韧带上方
- E、腹壁下动脉内侧，腹股沟韧带上方

正确答案：A

35、患者，男性，25 岁，身高 180cm，体重 65kg，既往体健，晨起后突感右胸刀割样疼痛，伴有轻度胸闷、咳嗽，查体血压 120/70mmHg，心率 74 次/min，无发热，无咯血，无反酸胃灼热，无恶心呕吐，发病前 1 天前曾打篮球比赛。建议该患者近期最好不要乘坐的交通工具是

- A、公交车
- B、火车
- C、轮船
- D、飞机
- E、出租车

正确答案：D

答案解析：气胸患者禁止乘坐飞机，因为在高空上可加重病情，引致严重后果；如果肺完全复张后 1 周可乘坐飞机。英国胸科学会建议如气胸患者未接受外科手术治疗，气胸发生后一年、内不要乘坐飞机，因为有复发的危险。

36、患者，男，56 岁。Graves 病史 6 年，不规则治疗，近一个月来心悸明显。查体：无突眼征，甲状腺Ⅱ度弥漫性肿大，心率 116 次/min，律不齐。门诊以甲亢性心脏病收入院。该患者禁忌的检查是

- A、超声心动图
- B、甲状腺 B 超
- C、甲状腺摄 ^{131}I 率
- D、TRH 兴奋试验
- E、T3 抑制试验

正确答案：E

答案解析：T3 抑制试验有诱发心律失常、心绞痛、甲状腺危象的可能性，甲亢心脏病患者禁做该项检查。

37、头皮裂伤时，在未使用抗生素的情况下，清创缝合时间不得超过

- A、20 小时
- B、24 小时

C、12 小时

D、16 小时

E、8 小时

正确答案：B

38、以下有关 HIV 感染临床期描述错误的是

A、出现神经系统症状

B、因免疫缺陷出现各种机会性感染

C、淋巴结不肿大

D、因免疫缺陷而继发肿瘤

E、免疫缺陷并发其他疾病

正确答案：C

39、前列腺中度增大，质中，光滑，中央沟平坦，可能的诊断是

A、前列腺增生

B、前列腺结核

C、前列腺结石

D、前列腺癌

E、慢性前列腺炎

正确答案：A

40、关于电击伤的介绍，不正确的是

A、出现痛性肌肉收缩，惊恐，面色苍白

B、出现头痛，头晕，心悸

C、出现心律失常，心脏骤停

D、出现呼吸极微弱呈“假死状态”，呼吸停止

E、电击伤部位有出血表现

正确答案：E

答案解析：电击伤后电流能量可转化为热量，可使局部组织温度升高，引起灼伤。且常伴有小营养血管闭塞，引起组织缺血。

41、急性单纯性胃炎的临床表现为

A、常伴出血

B、临床上多以感染或细菌毒素所致

C、胃黏膜腺体有萎缩伴局灶增生

D、胃黏膜腺体完整，炎症仅累及胃黏膜上皮表层

E、钡餐检查可见龛影

正确答案：B

42、患者，女性，38 岁。反复腹胀、腹泻、腹痛 1 年，加重 2 周来诊。近几年经常有口腔溃疡，关节痛。查体见面部蝶形红斑，手指指端红色痛性结节，浅表淋巴结轻度增大，心肺无异常，腹部查体轻度压痛，无固定压痛点，无包块，双下肢无水肿。与该患血栓形成相关的自身抗体是

- A、抗心磷脂抗体
- B、抗 SSA 抗体
- C、抗 U1-RNP 抗体
- D、抗 Sm 抗体
- E、抗 dsDNA 抗体

正确答案：A

43、患者，女性，40 岁。甲状腺肿物 5 年，伴声音嘶哑 3 个月，不能平卧，既往有气管炎病史 3 年，收入院治疗。病理细胞学已确诊为未分化癌，最合适的治疗为

- A、患侧甲状腺及峡部全切术加健侧甲状腺大部分切除术
- B、患侧甲状腺及峡部全切术加放射治疗
- C、全部甲状腺切除
- D、放射性碘治疗
- E、外放射治疗

正确答案：E

44、患者，男性，20 岁。因疲乏，厌食，厌油，尿黄 1 周而入院。初病时有低热，近 2~3 日感觉右上腹部隐痛。入院体检：皮肤、巩膜黄染，肝肋下 1cm。血清 ALT1120U/L，总胆红素 $105\mu\text{mol/L}$ ，HBsAg(+)，HBeAg(-)，抗 HBe(+)，抗 HBc-IgM(-)，抗 HBc-IgG(+)，抗 HAV-IgM(+)，抗 HAV-IgG(-)。最可能的诊断是

- A、急性乙型病毒性肝炎
- B、急性甲型病毒性肝炎和慢性乙肝
- C、慢性无症状 HBV 携带者
- D、慢性轻度乙型病毒性肝炎
- E、慢性重度乙型病毒性肝炎

正确答案：B

45、下列检查中不可用于霍乱诊断的是

- A、大便涂片革兰染色
- B、大便碱性蛋白胨水培养

- C、大便悬滴法检查
- D、霍乱血清凝集试验找特异性抗体
- E、血培养找霍乱弧菌

正确答案：E

答案解析：霍乱是经消化道传播的传染病。霍乱弧菌进入小肠，黏附于肠黏膜表面繁殖，不进入血液。

46、患者，男性，45 岁。左趾跖关节急性关节炎多次复发已一年，急性发作 1 天。患者目前急性发作最好用

- A、氢氯噻嗪
- B、秋水仙碱
- C、丙磺舒
- D、别嘌醇
- E、静脉输液

正确答案：B

答案解析：痛风急性关节炎期应迅速终止发作，首选秋水仙碱、非甾体抗炎药，亦可采用小剂量糖皮质激素治疗。

47、患者，男性，25 岁，近 3 个月经常排便后滴鲜血，量不多。肛门指检无异常发现，肛肠镜截石位见 3、7 点各有一突出肛管内暗红色圆形软结节，诊断为

- A、慢性痢疾
- B、内痔
- C、肛裂
- D、直肠息肉
- E、肛管癌

正确答案：B

48、患者，女性，38 岁。反复腹胀、腹泻、腹痛 1 年，加重 2 周来诊。近几年经常有口腔溃疡，关节痛。查体见面部蝶形红斑，手指指端红色痛性结节，浅表淋巴结轻度增大，心肺无异常，腹部查体轻度压痛，无固定压痛点，无包块，双下肢无水肿。实验室检查抗核抗体 1:1000 阳性，抗 dsDNA 阳性，补体低，肠镜可见结肠黏膜充血、糜烂。该患者的胃肠道表现是

- A、炎症性肠病
- B、白塞病的胃肠道病变
- C、系统性红斑狼疮的胃肠道病变

D、混合性结缔组织病

E、血管炎

正确答案：C

答案解析：该患抗核抗体 11000 阳性，抗 ds-DNA 阳性，补体低，符合 SLE，故该患胃肠道病变为 SLE 继发。

49、45 岁，女性。一年来上腹胀痛，无规律性，并有厌食，体重减轻约 10kg，近 2 天呕黯红色胃内容物，最可能的诊断是

A、消化性溃疡

B、胃癌

C、胆石症

D、急性胃黏膜病变

E、食管静脉曲张破裂

正确答案：B

答案解析：胃癌患者可有上腹部不适或疼痛，无规律性，食欲减退或消瘦乏力。中晚期则恶心、呕吐、呕血、黑便等，可同时伴有腹部肿块等体征。

50、患者，男性，60 岁。因提取重物时，出现右侧胸痛而到社区医疗中心就诊，诊断为右侧自发性气胸，右肺压缩 70%，需要转诊上级医院处理。在转诊前应注意的以下几项，错误的是

A、胸刺排气

B、动态观察，不需特殊处理

C、闭式引流排气

D、吸氧

E、卧床休息

正确答案：B

答案解析：患者为老年，诊断为右侧自发性气胸，肺压缩 70%，应及时转诊上级医院处理，而不应不做特殊处理。

51、常存在于口腔、胃肠道和外生殖道，脓液有恶臭味，普通细菌培养为阴性，涂片可找到革兰阴性杆菌的是

A、拟杆菌

B、链球菌

C、大肠埃希菌

D、变形杆菌

E、铜绿假单胞菌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586134024003011011>