

第一章测试

1. 对于急性疼痛对机体的影响，错误的描述是（ ）。
A:可导致交感肾上腺系统的活动加强
B:可导致患者丧失正常的行为能力
C:可导致患者情绪焦虑、亢奋
D:可激活免疫系统，使机体抵抗力上升
答案:D
2. 关于疼痛基本概念，下列哪项不正确（ ）。
A:疼痛是由于机体内外较强刺激产生的一种症状
B:疼痛是机体的主观感觉和体征
C:每个机体对疼痛的感受和反应差异不大
D:不能单纯依靠疼痛出现与否来判断机体有无伤害和疾病
答案:C
3. 每个机体对疼痛的感受和反应不同（ ）。
A:疼痛性质
B:患者的职业
C:疼痛部位
D:疼痛的伴随症状和加重或缓解因素
答案:B
4. 急性疼痛可引起的生理活动变化包括（ ）。
A:呼吸急促
B:血压降低
C:出汗减少
D:尿量减少
答案:A
5. 痛敏是指（ ）。
A:痛阈范围缩小
B:痛阈降低
C:痛阈范围扩大
D:痛阈升高
答案:B
6. 急性疼痛的评估流程和治疗流程是（ ）。
A:疼痛评分、评估→疼痛类型判断→体格检查→做出诊断及相应治疗
B:疼痛类型判定→体格检查→疼痛评分、评估→做出诊断及相应治疗
C:详问病史，体格检查→疼痛评分、评估→判断疼痛的类型→给出诊断及相应治疗
D:体格检查→疼痛类型判断→疼痛评分、评估→做出诊断及相应治疗
答案:C
7. 急性疼痛治疗最危险的并发症是（ ）。
A:瘙痒

B:呼吸抑制

C:尿潴留

D:恶心呕吐

答案:B

8. 以下选项中不属于生理性疼痛的是（ ）。

A:偏头痛

B:排卵痛

C:月经痛

D:生长痛

答案:A

9. 下面有关急性疼痛的描述错误的是（ ）。

A:急性疼痛包括手术后疼痛、分娩痛、急性带状疱疹痛等

B:急性疼痛是最近产生并持续时间较短的疼痛

C:急性疼痛通常与明确的损伤有关

D:急性疼痛通常是损伤愈合后仍然持续存在

答案:D

10. 下列选项中，属于内脏痛特点的是（ ）。

A:对切割刺激敏感

B:常伴有牵涉痛

C:急速短暂

D:定位清楚

答案:B

11. 对疼痛的理解，正确的是（ ）。

A:急性痛是一种症状，不是疾病

B:慢性痛本身就是一种疾病

C:疼痛是机体对周围环境的保护性反应方式

D:疼痛对病人、家庭和社会有影响

答案:BCD

12. 有关疼痛学的概念与范畴，正确的是（ ）。

A:是多学科相互渗透、交叉的边缘学科

B:是现代医学科学的重要组成部分

C:是一门古老的学科

D:只研究和阐述疼痛诊断与治疗

答案:AB

13. 对国际疼痛研究学会提出的疼痛的定义，应体现出以下几点
对国际疼痛研究学会提出的疼痛的定义，应体现出以下几点（ ）。

A:潜在的组织损伤

B:不愉快的躯体感觉

C:组织损伤

D:不愉快的情感经历

答案:ABCD

14. 酸痛的痛觉冲动经外周神经中的（ ）纤维传入。

A:A δ

B:C

C:A α

D:A β

答案:AB

15. 疼痛诊疗工作涉及的学科可包括（ ）。

A:药理学

B:神经内科学

C:生理学

D:解剖学

答案:ABCD

第二章测试

1. 内脏痛的传导主要是通过（ ）。

A:副交感神经

B:交感神经

C:感觉神经

D:运动神经

答案:B

2. 根据对不同伤害性刺激的敏感程度，可以将伤害性感受器分为以下几类，但不包括（ ）。

A:机械性伤害感受器

B:温度性伤害感受器

C:疼痛性伤害感受器

D:化学性伤害感受器

答案:C

3. 下列选项中不正确的是（ ）。

A:A δ 类、C类纤维传导速度慢，只适合传导痛觉

B:A δ 类纤维传导速度适中，负责传导快痛

C:神经纤维的传导速度由快到慢依次是A α 、A β 类、A δ 类、C类

D:A α 、A β 类纤维传导速度快，适合传递感觉和运动信息

答案:A

4. 躯体伤害性感受器分布最密集的部位是（ ）。

A:皮肤

B:肌肉

C:内脏

D:关节

答案:A

5. 调控伤害性信息最重要的部位是（ ）。
- A:脊髓背角Ⅳ、Ⅴ
B:脊髓背角Ⅱ、Ⅲ层
C:脊髓背角Ⅲ、Ⅳ层
D:脊髓背角Ⅰ、Ⅱ层
答案:B
6. 伤害性感受器是产生疼痛信号的外周换能装置，一般认为初级伤害性感受器是 A δ 纤维和 C 纤维（ ）
- A:对
B:错
答案:A
7. 交感神经在慢性疼痛的形成和维持过程中具有重要的作用（ ）
- A:错
B:对
答案:B
8. 脊髓前角是伤害性信息中枢传递的第一个中继站（ ）
- A:对
B:错
答案:B
9. 组织损伤后对来自损伤区的机械和热刺激发应过强称之为原发性痛觉过敏（primary hyperalgesia）（ ）
- A:对
B:错
答案:A
10. 触诱发痛是指组织损伤后对正常的无害性的刺激的反应过强（ ）
- A:错
B:对
答案:B

第三章测试

1. 心肌梗死时患者感到左肩背疼痛，此种疼痛属于（ ）。
- A:精神性疼痛
B:浅表疼
C:内脏痛
D:牵涉痛
答案:D
2. 最适合用于判断颈椎病患者神经根或脊髓受压情况的影像学检查是（ ）。
- A:颈椎 CT
B:颈椎 MRI
C:颈椎侧位片

D:颈椎正位片

答案:B

3. 对以下特殊检查论述不正确的是（ ）。

A:叩顶检查常用于颈椎病检查

B:直腿抬高加强试验用于区别病变椎间盘是 L4-5 还是 L5-S

C:直腿抬高试验阳性常见于椎间盘突出症

D:臂丛牵拉试验常用于颈椎病或颈椎间盘突出症的检查

答案:D

4. 最常用的疼痛强度评价方法是（ ）。

A:简明疼痛问卷表(brief pain questionnaire , BPQ)

B:视觉模拟量表 (visual analogue scale, VAS)

C:言评价表 (verbal rating scale, VRS)

D:数字评价表(numerical rating scale, NRS)

答案:B

5. 一般来说，正确的疼痛诊断的基本方法与步骤应该是（其中： a. 详细询问主诉和病史 b.必要的实验室检查和辅助检查 c. 重点体格检查 d .全面体格检查 e. 必要的诊断性神经阻滞）（ ）。

A:a →d → e →b → c

B:a →c →d → e → →b

C:a → c →d →b →e

D:a →b → c →d → e

答案:C

6. 对疼痛的中枢机制论述不正确的是（ ）。

A:伤害性信息在脊髓侧角神经元初步整合

B:丘脑是疼痛感觉分辨和发应冲动整合的高级中枢

C:参与疼痛整合、调控和感知作用的中枢主要是丘脑、下丘脑和脑内的部分核团和神经元

D:组织损伤后可引起脊髓背角神经元的兴奋性增强

答案:AB

7. 通过提高痛阈治疗疼痛的方法是（ ）。

A:局部麻醉药

B:NSAIDs

C:心理疗法

D:阿片类镇痛药

答案:CD

8. 属于问卷表形式的疼痛强度评价方法是（ ）。

A:short-form of McGill pain questionnaire , SF-MPQ

B:numerical rating scale, NRS

C:visual analogue scale, VAS

D:brief pain questionnaire , BPQ

答案:AD

9. 疼痛测定和评价的意义在于（ ）。
- A:定量判断治疗效果
 - B:治疗过程中监测疼痛程度的变化，及时调整治疗方案
 - C:定量评价治疗后疼痛缓解减轻的程度和变化特点
 - D:判定疼痛特征，便于选用最恰当的治疗方法和药物
- 答案:ABCD
10. 在评价疼痛时，应认识到（ ）。
- A:客观地测量和评价疼痛是相当困难的。
 - B:临床常采用强度量表和问卷表进行评估
 - C:疼痛受病人生理、病理、情绪和心理的影响
 - D:应采用两种或多种方法进行综合评价
- 答案:ABCD

第四章测试

1. 以下糖皮质激素作用时间最长的是（ ）。
- A:地塞米松
 - B:曲安奈德
 - C:泼尼松
 - D:复方倍他米松
- 答案:B
2. 下列对阿片类药物叙述错误的是（ ）。
- A:镇痛的同时可产生意识丧失
 - B:作用机制与激动阿片受体有关
 - C:又称麻醉性镇痛药
 - D:镇痛作用强大
- 答案:A
3. 以下都是非甾体抗炎药的不良反应，除外（ ）。
- A:肾毒性
 - B:血小板功能障碍
 - C:消化道溃疡
 - D:呼吸抑制
- 答案:D
4. 吗啡在临床使用中最常见的并发症是（ ）。
- A:恶心呕吐、便秘
 - B:呼吸抑制
 - C:肝功能受损
 - D:成瘾性和耐受性
- 答案:A
5. 下列哪种药最常用于癌性疼痛的治疗？（ ）。
- A:舒芬太尼(sufentanil)
 - B:芬太尼(fentanyl)

C:哌替啶(pethidine)

D:吗啡(morphine)

答案:D

6. 能选择性抑制 COX-2，治疗剂量不干扰组织中与 COX-1 相关的生理过程的是（ ）。

A:吡罗喜康

B:美洛喜康

C:塞来昔布

D:双氯芬酸钠

答案:C

7. 哪项不是罗比卡因的优点（ ）。

A:感觉运动阻滞分离程度大

B:无心脏毒性

C:对 CNS 毒性低

D:对子宫胎盘血流无明显影响

答案:B

8. 有关曲马多论述错误的是（ ）。

A:通过调节 NE 和 5-HT 的释放和吸收而增强 CNS 对疼痛的下行传导抑制作用

B:但镇痛作用时间长

C:镇痛作用较弱，镇痛效价为吗啡的 1/10

D:为阿片受体的完全激动剂，但对 μ 受体的亲和力低，为一种弱麻醉性镇痛药。

答案:D

9. 非甾类药物的不良反应包括（ ）。

A:心血管系统并发症增多

B:肝功能损害

C:消化系统的出血

D:肾功能损害

答案:ABCD

第五章测试

1. 阻滞半月神经节的部位在（ ）。

A:卵圆孔

B:圆孔

C:茎乳突

D:棘孔

答案:A

2. 星状神经节阻滞成功时，将出现下述现象中的（ ）。

A:(Horner's) 综合征

B:血管收缩

C:面部湿润冰冷

D:眼球突出

答案:A

3. 小剂量局麻药复合阿片类药物行蛛网膜下腔-硬膜外联合阻滞最常见的副作用是（ ）。

A:低血压

B:皮肤瘙痒

C:恶心、呕吐

D:呼吸抑制

答案:B

4. 有特定扳机点的疼痛性疾病是（ ）。

A:三叉神经痛

B:偏头痛

C:坐骨神经痛

D:带状疱疹后神经痛

答案:A

5. 神经刺激器在外周神经阻滞中应用，正确的是（ ）。

A:需要咪唑安定适当镇静

B:不需监测病人

C:可适用于无法说明异感的病人

D:可避免神经损伤

答案:AC

6. 关于神经阻滞疗法，错误的是（ ）。

A:有诊断性作用和治疗性作用

B:是所有疼痛性疾病的首选治疗方法

C:可消除疼痛、改善血流

D:无任何禁忌证

答案:BD

7. 神经阻滞疗法可用的药物或手段包括（ ）。

A:利多卡因

B:冷冻术

C:无水乙醇

D:射频热凝术

答案:ABCD

8. 神经阻滞穿刺定位正确的是（ ）。

A:眶下神经阻滞——鼻翼旁 0.5cm

B:颞神经阻滞——颞孔外侧 0.5cm、头侧 0.5cm 处

C:下颌神经阻滞——下颌髁状突和喙突中点

D:上颌神经阻滞——颧弓下缘中点

答案:ABCD

9. 用于疼痛治疗的神经阻滞疗法与局部麻醉不同的是（ ）。
- A:常常在局麻药液中加入糖皮质激素、B族维生素等药物
B:所用的器械完全不同
C:所用的局麻药种类完全不同
D:使用的局麻药不一定要求肌松弛，只阻滞感觉神经或交感神经
- 答案:AD

第六章测试

1. 关于直线偏振光近红外线的说法，正确的是（ ）。
- A:在 0.785cm² 的面积上输出功率可高达 2000MW
B:孕妇也可以使用
C:透射人体组织 5cm
D:波长 800 ~ 1600nm
- 答案:C
2. 在常温常态下，臭氧的半衰期为（ ）。
- A:5~10 分钟
B:30~40 分钟
C:20~30 分钟
D:1~5 分钟
- 答案:C
3. 射频毁损技术不用于（ ）。
- A:三叉神经痛
B:脊神经后支疼痛
C:肋间神经痛
D:坐骨神经痛
- 答案:D
4. 关于针刀疗法，正确的说法是（ ）。
- A:治疗前简单消毒即可
B:不会晕针
C:不会粘连
D:应避开重要神经血管
- 答案:D
5. 脊髓电刺激镇痛术的禁忌证为（ ）。
- A:椎管内存在手术后瘢痕或肿瘤占位
B:腰椎间盘突出
C:电极植入部位感染
D:脊柱裂
- 答案:ACD
6. 注射疗法是将局麻药和其它治疗药物注射到疼痛区域最明显的压痛点处的一种治疗方法。（ ）
- A:对

答案

7. 直线偏振光近红外线是一种复合波长的、具有直线偏振光特点的近红外线。
()

A:对

B:错

答案:A

8. 肩周炎应用局部阻滞疗法时，首先要寻找和确定用粗针头行局部注射，进针要深达骨膜，然后稍退针注药。()

A:错

B:对

答案:A

9. 应用物理因素治疗疾病的方法称为物理疗法。()

A:错

B:对

答案:B

10. 针刀疗法是根据生物力学观点，集针刺与手术的优点而设计的一种独特的治疗方法。()

A:对

B:错

答案:A

第七章测试

1. 最常见的头痛的类型是()。

A:外伤性头痛

B:丛集性头痛

C:颈源性头痛

D:紧张性头痛

答案:C

2. 不用于治疗偏头痛的神经阻滞是()。

A:半月神经阻滞

B:枕神经阻滞

C:星状神经节阻滞

D:眶上神经阻滞

答案:A

3. 目前认为，头痛的机制可能有如下几点()。

A:肌肉异常收缩

B:血中致痛物质如乙酰胆碱

C:血管病变

D:脑膜受刺激

答案:C

) 。

- A:β-肾上腺素能受体阻滞剂
- B:竞争性 5-羟色胺抑制剂
- C:血管收缩剂
- D:5-羟色胺受体激动剂

答案

- 5. 对偏头痛论述不正确的是 () 。
- A:必需是局限于单侧
- B:女多于男
- C:是临床上常见的原发性头痛疾病
- D:是多发性、多种症状同时存在的疾病

答案:A

- 6. 目前认为，与紧张性头痛有关的主要因素为 () 。
- A:肌肉因素
- B:精神因素
- C:感染因素
- D:血管因素

答案:A

- 7. 慢性紧张性头痛常首选 () 。
- A:吲哚美辛
- B:氟桂嗪
- C:阿米替林
- D:舒马普坦

答案:C

- 8. 以下神经中，其分支为枕大神经的是 () 。
- A:C1 后根
- B:C1 前根
- C:C2 后根
- D:C2 前根

答案:C

- 9. 诊断偏头痛的主要依据是 () 。
- A:病史、疼痛部位、性质、发作特征、持续时间和伴随症状
- B:脑电图
- C:焦虑抑郁评分和人格分析
- D:神经系统的体格检查

答案:A

- 10. 偏头痛的特点包括 () 。
- A:可以治愈
- B:常发生在一侧头部，呈搏动性痛
- C:常伴恶心及对声音、光、气味过敏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586223142242011025>