

2024 年福建省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库（各地真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

- A: 噻嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 哌嗪
- D: 甲苯咪唑

答案：D

2. 严重水肿可使用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：B

3. 甲状腺危象应选用的药物是

- A: 胰岛素
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 大剂量碘剂

答案：D

4. 止咳药

- A: 去氨加压素
- B: 胃黏膜保护剂
- C: 硝酸甘油
- D: 甘草合剂

答案：D

5. 老年（ ≥ 65 岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

- A: 金刚烷胺？
- B: 复方左旋多巴？
- C: 苯海索？
- D: 普拉克索？

答案：B

6. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

- A: 双氯芬酸
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 布洛芬

答案：B

7. 属于新型抗凝药物的是

- A: 胺碘酮
- B: 氯吡格雷
- C: 美托洛尔
- D: 达比加群酯

答案：D

8. 痉挛性便秘

A: 开塞露

B: 乳果糖

C: 羧甲基纤维素钠

D: 比沙可啶

答案: C

9. 患者，女，32 岁，妊娠 20 周。1 天前发热，体温 39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

A: 奥司他韦胶囊

B: 利巴韦林片

C: 金刚烷胺片

D: 阿昔洛韦片

答案: A

10. 属于 MA-B 抑制剂的是

A: 普拉克索

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 司来吉兰

答案: D

11. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

A: <0.8

B: 0.8~1.5

C: 2

D: >1.5

答案: B

12. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

A: 胃肠道损害

B: 肺损害

C: 肾损害

D: 肝损害

答案: D

13. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断痛风

C: 诊断恶性贫血

D: 诊断急、慢性白血病

答案: A

14. 下列药物属于容积性泻药的是

A: 多库酯

B: 乳果糖

C: 欧车前

D: 聚乙二醇

答案: C

15. 甲巯咪唑的初治剂量是一日

A: 15~60mg

B: 5~15mg

C: 25~80mg

D: 30~60mg

答案：D

16. 人的体重指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高的平方 (m²)，中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

A: 18.5~23.9

B: ≥ 28

C: ≥ 26

D: < 18.5

答案：B

17. 乙型肝炎病毒 e 抗体为

A: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标

B: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

C: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标

D: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

答案：A

18. 溃疡性结肠炎患者应限制摄入的食品是

A: 乳制品

B: 低渣食品

C: 维生素类食品

D: 流质饮食

答案：A

19. 属于容积性泻药的药物是

- A: 乳果糖
- B: 比沙可啶
- C: 硫酸镁
- D: 甘油栓

答案：C

20. 大量或长期使用抗生素可能导致

- A: 血清血红蛋白升高
- B: 血白细胞减少
- C: 粪便细胞显微镜检查检出真菌
- D: 血清总胆固醇升高

答案：C

21. 解救毒物引起严重腹泻者（）

- A: 禁止洗胃
- B: 不能催吐
- C: 不能导泻
- D: 不能用强利尿剂

答案：C

22. 成年人血清中三酰甘油含量是

- A: 2.1~3.1mmol / L
- B: 3.1~5.7mmol / L
- C: 1.03~2.07mmol / L
- D: 0.56~1.70mmol / L

答案：D

23. 属于处方正文的内容为

- A: 医疗机构名称
- B: 用法用量
- C: 临床诊断
- D: 开具日期

答案：B

24. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾小管重吸收增加
- B: 肾小管分泌减少
- C: 肾小球滤过减少
- D: 肾血流量减少

答案：D

25. 服用后可致嗜睡, 驾驶员应慎用的药物是()

- A: 氯苯那敏
- B: 阿司匹林
- C: 吲达帕胺
- D: 胰酶

答案：A

26. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

- A: 加量使用
- B: 在危及生命时方可使用
- C: 减量使用
- D: 避免应用

答案：C

27. 下列药物中，属于溶栓药物的为

- A: 华法林
- B: 利伐沙班
- C: 阿替普酶
- D: 血凝酶

答案：C

28. 可中和碘类物质中毒的洗胃液是

- A: 3%鞣酸溶液
- B: 活性炭混悬液
- C: 1: 5000 高锰酸钾
- D: 淀粉溶液

答案：D

29. 双侧肾动脉狭窄、高钾血症

- A: 普萘洛尔
- B: α 受体阻断剂
- C: 氢氯噻嗪
- D: 卡托普利

答案：D

30. 阿昔洛韦可导致

- A: 肾间质纤维化
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小管坏死
- D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：D

31. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 伊托必利
- B: 奥美拉唑
- C: 泮托拉唑
- D: 法莫替丁

答案：C

32. 经口急性汞中毒出现的典型症状是（）

- A: 腐蚀性口腔炎
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 恶心、呕吐、视物模糊
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：A

33. 杨某，女，19 岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温 39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。该患者对青霉素过敏。

- A: 青霉素 G
- B: 链霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 利福霉素

答案：C

34. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 90~120g / L
- B: 30~60g / L
- C: 60~90g / L
- D: 120~160g / L

答案：A

35. 可抑制血小板聚集和释放的是

- A: 尿激酶
- B: 华法林
- C: 肝素
- D: 噻氯匹定

答案：D

36. 严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

- A: 帕博利珠单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 曲妥珠单抗
- D: 贝伐珠单抗

答案：D

37. 下列药品中，孕妇禁用的是

- A: 环丙沙星
- B: 维生素 A
- C: 拉贝洛尔
- D: 葡萄糖酸钙

答案：A

38. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 卡托普利

C: 洛伐他汀

D: 氢氯噻嗪

答案: D

39. 红霉素易于在乳汁中出现的机制是

A: 在母体血浆中处于结合状态

B: 呈弱碱性

C: 呈弱酸性

D: 解离度大

答案: B

40. 可加重帕金森的是

A: H

B: 地西泮

C: 氯苯那敏

D: 异丙嗪

答案: D

41. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。O

A: 适量

B: 是()

C: 左眼

D: 右眼

答案: B

42. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 10 万—15 万 IU

B: 15 万—30 万 IU

C: 30 万—45 万 IU

D: 30 万~60 万 IU

答案：B

43. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 硝普钠

B: 尼莫地平

C: 甘油果糖

D: 呋塞米

答案：C

44. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

B: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施

C: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片,不用补服 4 月 24 日的药片

答案：B

45. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 空腹血糖
- B: 尿胆红素
- C: 糖化血红蛋白
- D: 餐后 2 小时血糖

答案：C

46. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药的 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；ADR 因果关系可评价为

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 待评价
- D: 可能

答案：A

47. “制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都需要参考循证医学的研究结果”表明循证医学实践能够

- A: 改变降脂治疗观念
- B: 列为医药卫生行政决策的依据
- C: 有利于诊断特殊疾患
- D: 有助于个体化给药

答案：B

48. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌证是（）

- A: 双侧肾动脉狭窄
- B: 痛风
- C: 冠心病
- D: 心力衰竭

答案：D

49. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是（）

- A: qid
- B: prn
- C: qd
- D: qn

答案：B

50. 可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

- A: 丁螺环酮
- B: 劳拉西泮
- C: 氟西汀
- D: 阿米替林

答案：D

51. 患者李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160 / 100mmHg。

- A: 心力衰竭
- B: 冠心病
- C: 心律失常
- D: 高血压

答案：D

52. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的叙述错误的是

- A: 抗抑郁药起效较快，因此使用 2 周后即可判定疗效
- B: 难治性抑郁症可尝试合用抗抑郁药和情感稳定剂或与非典型抗精神病药合用
- C: 抗抑郁药尽量单一用药，不主张联用两种以上的抗抑郁药
- D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SS-RIs)可引起戒断反应

答案：A

53. 肾或膀胱结石

- A: 磷酸盐结晶
- B: 草酸盐结晶
- C: 酪氨酸和亮氨酸结晶
- D: 尿酸盐结晶

答案：B

54. 核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂 ()

- A: FIs
- B: NRTIs
- C: PIs
- D: NNRTIs

答案：B

55. 一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化

- A: 湿度
- B: 日光
- C: 空气

D: 温度

答案：C

56. 感冒初，出现卡他症状，如鼻粘膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

B: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

C: 含非甾体抗炎药制剂

D: 含氢溴酸右美沙芬制剂

答案：A

57. 患者女 56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是（）

A: 维拉帕米

B: 氯沙坦

C: 美托洛尔

D: 螺内酯

答案：C

58. 关于现代药学的发展，以药品供应为中心阶段的特征是

A: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

B: 以促进合理用药为主

C: 以药品工业化生产为中心

D: 以新药研制为中心

答案：A

59. （2016 年真题）治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2～3 次的药物是（）。

A: 地塞米松粘贴片

- B: 西地碘含片
- C: 冰硼咽喉散
- D: 甲硝唑口腔粘贴片

答案: C

60. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期大于 24h 的药物通常选择()

- A: 每个半衰期给药 1 次
- B: 2~3 个半衰期给药 1 次
- C: 静脉滴注给药
- D: 每日给药 1 次

答案: D

61. 医师用药咨询的内容是

- A: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案: B

62. 使血液黏度增加、血容量增多,引起高血压的药物是

- A: 伪麻黄碱
- B: 咖啡因
- C: 重组人促红细胞生成素
- D: 糖皮质激素

答案: C

63. 相互作用使不良反应减少的联合用药是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 普萘洛尔联用美西律
- B: 苄丝肼联用左旋多巴
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 阿托品联用氯磷定

答案：C

64. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

- A: 直接肾毒性
- B: 肾间质纤维化
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 肾小管阻塞

答案：D

65. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 平喘药
- B: 降糖药
- C: 抗痛风药
- D: 氨基糖苷类抗菌药

答案：B

66. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

- A: 艾司唑仑
- B: 米氮平
- C: 唑吡坦
- D: 阿戈美拉汀

答案：C

67. 提高药效、减少人体吸收的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 利尿药
- B: 氨基糖苷类
- C: 阿苯达唑
- D: 抗忧郁药

答案：C

68. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: C 级
- B: B 级
- C: D 级
- D: A 级

答案：B

69. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皸裂型足癣的处方药是

- A: 尿素
- B: 特比萘芬
- C: 苯甲酸
- D: 依沙吡啶

答案：B

70. 用于评估癌痛患者疼痛程度的是()

- A: Cochrane 证据分级
- B: CTP 评分标准
- C: APACHE 评分系统
- D: 数字评分法

答案：D

71. 属于 5α 还原酶抑制剂的是 ()

- A: 氟他胺
- B: 普适泰
- C: 雌三醇
- D: 度他雄胺

答案: D

72. 以下所列“WHO 公布的有关艾滋病传播途径”中，不正确的是

- A: 吸毒
- B: 性行为
- C: 母婴传播
- D: 蚊虫叮咬

答案: D

73. 和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 利福平
- C: 多潘立酮
- D: 丙磺舒

答案: A

74. 静脉滴注给药前不宜选用氯化钠注射液溶解或稀释，以免出现浑浊的药品是

- A: 瑞替普酶
- B: 依托泊苷
- C: 阿昔洛韦

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: D

75. 血尿酸检查超过正常值可

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断黄疸

C: 诊断痛风

D: 诊断贫血

答案: C

76. 能再激活乙型肝炎，禁用于活动性乙肝患者的靶向药是

A: 帕博利珠单抗

B: 曲妥珠单抗

C: 利妥昔单抗

D: 贝伐珠单抗

答案: C

77. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

A: 氨溴索片

B: 左氧氟沙星片

C: 阿司匹林泡腾片

D: 维生素 C 片

答案: C

78. 用药剂量相同, 妊娠期的血药浓度低于非妊娠期, 是由于

A: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

B: 胃肠活动程度减弱, 使吸收减慢

C: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多

D: 妊娠期药物分布容积明显增加

答案: D

79. “冷处”所指温度范围是

A: 2℃～4℃

B: 2℃～10℃

C: 10℃～30℃

D: -5℃～10℃

答案: B

80. 合用维生素 B12 与陈皮，可以达到的效果是

A: 加快维生素 B12 的排泄

B: 减少维生素 B12 的氧化

C: 促进维生素 B12 的吸收

D: 抑制维生素 B12 的代谢

答案: C

81. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

A: 普通肝素

B: 华法林

C: 利伐沙班

D: 口服避孕药

答案: D

82. 属于延长动作电位时程给药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

A: 拉贝洛尔

B: 胺碘酮

C: 维拉帕米

D: 美西律

答案: B

83. (2015 年真题) 可作为根除幽门螺旋杆菌感染一线治疗方案的是 ()。

A: 埃索美拉唑 20mgqd+阿莫西林 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gqd

B: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

C: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gtid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

D: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid

答案: C

84. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97%为水分，而在 3%的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

A: 硫酸镁

B: 氯化钾

C: 氯化钠

D: 氯化铵

答案: D

85. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

D: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

答案：C

86. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机氟中毒的特效解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 维生素 K

C: 氯解磷定

D: 烯丙吗啡

答案：A

87. 患者到药店购买鱼肝油, 药师应给予()

A: 维生素

B: 维生素 A

C: 鱼油

D: 维生素 AD

答案：D

88. (2018 年真题) 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是 ()

A: RBC

B: APTT

C: INR

D: ALT

答案：B

89. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 胸痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/586224021055011030>