

## 临床助理医师考前模拟测试试题

1、不稳定型与稳定型心绞痛的药物治疗中，最明显的不同在于前者强调

- A. 吸氧
- B. 卧床休息
- C. 镇静. 止痛
- D. 抗凝抗栓治疗
- E. 硝酸酯类药物

**【答案】D**

2、具有广谱抗心律失常作用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 维拉帕米
- C. 普萘洛尔
- D. 胺碘酮
- E. 苯妥英钠

**【答案】D**

3、风湿性二尖瓣狭窄患者典型的体征为

- A. 心腰部凹陷
- B. 梨型心
- C. 心尖部可触及收缩期震颤

D. 心尖部 3 / 6 级收缩期杂音

E. 水冲脉

**【答案】 B**

4、有关糖尿病的治疗正确的是

A. 任何病人使用胰岛素都能收到良好的降糖效果

B. 2 型糖尿病病人一经发现应立即使用口服降糖药

C. 饮食治疗强调控制主食量是最重要的

D. 饮食治疗强调控制全天总热量摄入

E. 二甲双胍只能用于 2 型糖尿病病人

**【答案】 D**

5、确诊狂犬病毒感染的最好方法是

A. 观察被狂犬咬伤后是否发病

B. 伤口分泌物直接涂片光镜下找狂犬病毒

C. 观察咬人的狗是否为狂犬

D. 将犬杀死，取其脑组织海马回切片找内基小体

E. 血清学方法检测人体内狂犬病毒抗体

**【答案】 D**

6、广场恐怖的共同特征为

A. 怕接触人

- B. 怕无力帮助
- C. 怕空荡. 怕风
- D. 怕无法迅速离开
- E. 怕被人迫害

**【答案】** D

7、不能为机体提供能量的营养素是

- A. 糖类
- B. 淀粉类
- C. 蛋白质类
- D. 维生素类
- E. 脂肪类

**【答案】** D

8、比较不同职业人群的冠心病患病率的假设检验. 应计算的统计量为

- A. t
- B.  $\chi^2$
- C. F
- D. x
- E. p

**【答案】** B

9、婴幼儿化脓性脑膜炎的表现，下列哪项不正确

- A. 可有尖声哭叫
- B. 可有凝视
- C. 可有惊厥
- D. 可有颈抵抗感
- E. 较少有硬膜下积液发生

【答案】E

10、右向左分流型先天性心脏病包括

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

【答案】D

11、下列哪些有关头孢菌素类叙述是错误的

- A. 对繁殖期的细菌有杀菌作用
- B. 具有和青霉素类似的抗菌谱及化学结构
- C. 与青霉素类有交叉过敏反应
- D. 能耐受  $\beta$ -内酰胺酶灭活

E. 均为抑制细菌蛋白质合成而发挥作用

**【答案】E**

12、患儿 5 岁，半年来全身逐渐水肿，食欲减退，有时恶心呕吐，实验室检查：尿蛋白，尿少，血浆蛋白减少为  $15\text{g/L}$ ，血胆固醇升高为  $13\text{mmol/L}$ 。此病例临床表现属于

A. 急性肾炎综合征

B. 快速进行性肾炎综合征

C. 肾病综合征

D. 慢性肾炎综合征

E. 肺出血肾炎综合征

**【答案】C**

13、下面哪一个不是成人股骨头的血供来源

A. 股圆韧带内的小凹动脉

B. 股骨干滋养动脉升支

C. 旋股外侧动脉的分支

D. 闭孔动脉

E. 旋股内侧动脉的分支

**【答案】D**

14、外科治疗门静脉高压症的主要目的是

A. 改善肝功能，防止肝功能衰竭的发生

- B. 预防肝癌的发生
- C. 防治食管胃底静脉曲张破裂所致的大出血
- D. 治疗顽固性腹水
- E. 切除功能亢进的脾，调节免疫功能

**【答案】** C

15、子宫颈糜烂病变处柱状上皮由鳞状上皮重新取代的过程称为

- A. 糜烂愈复
- B. 单纯性糜烂
- C. 不典型增生
- D. 腺体鳞状上皮化生
- E. 增生

**【答案】** A

16、以下关于尿糖的说法中正确的是

- A. 尿糖阳性肯定有血糖升高
- B. 尿糖阳性是肾小管不能将管腔液中糖全部吸收的结果
- C. 尿糖阳性肯定有糖代谢异常
- D. 根据尿糖阳性可诊断为糖尿病
- E. 尿糖阴性者可除外糖尿病

**【答案】** B

17、医乃仁术是指

- A. 道德是医学的本质特征
- B. 道德是医学活动中的一般现象
- C. 道德是医学的非本质要求
- D. 道德是医学的个别性质
- E. 道德是个别医务人员的追求

**【答案】** A

18、最常见的沙门菌感染是

- A. 肠热症
- B. 败血症
- C. 胃肠炎
- D. 无症状携带者
- E. 化脓性感染

**【答案】** B

19、以下关于尿糖的说法中正确的是

- A. 尿糖阳性肯定有血糖升高
- B. 尿糖阳性是肾小管不能将管腔液中糖全部吸收的结果
- C. 尿糖阳性肯定有糖代谢异常
- D. 根据尿糖阳性可诊断为糖尿病

E. 尿糖阴性者可除外糖尿病

**【答案】** B

20、炎症介质组胺在炎症灶内最主要的作用是

A. 白细胞趋化

B. 使血管扩张和通透性增高

C. 引起疼痛

D. 导致发热

E. 造成组织损伤

**【答案】** B

21、成年人腹股沟管长度应为

A. 2——3cm

B. 4——5cm

C. 6——7cm

D. 8——9cm

E. 10——12cm

**【答案】** B

22、女, 7个月。体重 5.5kg。母乳喂养, 量少, 未加辅食。体检: 神志清, 精神可, 稍苍白, 腹部皮下脂肪 0.5cm, 肌肉稍松弛。可能诊断是

A. 正常儿

B. I 度营养不良



C. II度营养不良

D. III度营养不良

E. 佝偻病

【答案】B

23、血管紧张素转换酶抑制药的主要不良反应有，除了

A. 首剂低血压

B. 咳嗽

C. 高血钾

D. 血管神经性水肿

E. 心律失常

【答案】E

24、男性，16岁，皮肤粘膜出血，头痛、发热，伴恶心、呕吐2周，全身淋巴结肿大，肝脾大。血红蛋白50g/L，白细胞计数 $25 \times 10^9 / L$ ，血小板 $30 \times 10^9 / L$ ，骨髓原始细胞增多，过氧化物酶染色阴性，糖原染色阳性，呈颗粒状，CSF潘氏反应阳性，白细胞 $2.0 \times 10^9 / L$ ，淋巴细胞为主。最适当的诊断是

A. 传染性单核细胞增多症

B. 急性淋巴细胞白血病合并脑膜白血病

C. 结核性脑膜炎

D. 急性淋巴细胞白血病

E. 急性粒细胞白血病

**【答案】B**

25、密切接触白喉病人的儿童应给予的免疫措施是

- A. 白喉类毒素
- B. BCG
- C. 白喉抗毒素
- D. 丙种球蛋白
- E. 胎盘球蛋白

**【答案】C**

26、国家对传染病管理实行的方针是

- A. 预防为主. 防治结合. 统一管理. 健康教育. 依靠群众
- B. 预防为主. 防治结合. 分类管理. 依靠科学. 依靠群众
- C. 预防为主. 防治结合. 划区管理. 依靠科学. 依靠教育
- D. 预防为主. 防治结合. 分片管理. 健康教育. 依靠群众
- E. 预防为主. 防治结合. 层级管理. 依靠科学. 健康教育

**【答案】B**

27、5岁女孩。主因眼睑及下肢水肿5天，咳嗽伴喘憋2天就诊。查体：BP17 / 12kPa，眼睑及双膝关节以下水肿，心率130次 / 分，律齐，心音尚有力，双肺可闻及散在中小水泡音。肝肋下3cm。最可能的诊断是

- A. 支气管肺炎
- B. 急性肾炎

- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺炎合并心力衰竭
- E. 急性肾炎合并循环充血

**【答案】E**

28、肿瘤的颜色与下列哪项因素无关

- A. 组织来源，主. 间质的多少
- B. 含血量多少
- C. 继发改变
- D. 是否含有色素
- E. 肿瘤的生长时间

**【答案】E**

29、切除子宫做病理检查. 光镜下见子宫壁深肌层内有大量异型的滋养层细胞浸润. 并有绒毛结构. 应诊断为

- A. 水泡状胎块
- B. 子宫内膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 子宫颈癌

**【答案】C**

30、患者，男性，2岁，高热，呼吸困难，双肺散在小水泡音，诊断为支气管肺炎，青霉素试敏(+)，宜用

- A. 氯霉素
- B. 四环素
- C. 头孢唑啉
- D. 磺胺嘧啶
- E. 红霉素

**【答案】E**

31、毛果芸香碱(匹鲁卡品)对眼的作用表现为

- A. 降低眼内压. 扩瞳. 调节痉挛
- B. 降低眼内压. 缩瞳. 调节麻痹
- C. 降低眼内压. 缩瞳. 调节痉挛
- D. 升高眼内压. 扩瞳. 调节痉挛
- E. 升高眼内压. 缩瞳. 调节痉挛

**【答案】C**

32、发生肝后性黄疸时，下列哪一项不发生

- A. 血中总胆红素含量升高
- B. 血中结合胆红素含量升高
- C. 尿胆红素阳性
- D. 尿胆素原含量升高

E. 粪胆素原减少

**【答案】D**

33、HSV-1 的原发感染多引起

A. 带状疱疹

B. 传染性单核细胞增多症

C. 成人生殖器疱疹

D. 幼儿丘疹

E. 半岁以上婴儿感染

**【答案】E**

34、男, 18 岁, 因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术, 术后 3 天切口见红肿硬结, 缝线拆除后未见脓性分泌物, 该病人切口愈合类型应记为

A. I/甲

B. II/甲

C. III/甲

D. III/乙

E. III/丙

**【答案】D**

35、非阵发性交界性心动过速最常见于下述哪一项情况

A. 洋地黄中毒

B. 下壁心肌梗死

- C. 心肌炎
- D. 内源性儿茶酚胺增加
- E. 正常人

**【答案】** A

36、慢性肾功能减退患者的饮食治疗应为

- A. 高热量. 高蛋白. 低盐. 低脂
- B. 高热量. 高蛋白. 低磷. 低盐
- C. 高热量. 优质低蛋白. 低磷. 酌情低盐
- D. 高热量. 禁蛋白. 低磷. 酌情低盐
- E. 高热量. 高脂. 低磷. 酌情低盐

**【答案】** C

37、男性，30岁。原有风心病史，因持续性发热，乏力，纳差来诊。经检查拟诊为亚急性感染性心内膜炎，体格检查时下列哪个体征不可能出现

- A. 环形红斑
- B. 淤点
- C. 心脏杂音无变化
- D. 心率 40 次 / 分，心电图示 III 度房室传导阻滞
- E. 脾肿大伴脾区摩擦音

**【答案】** A

38、进入肺泡内，没有发生气体交换的这部分气体量，称为

- A. 解剖无效腔
- B. 生理无效腔
- C. 肺泡无效腔
- D. 气道无效腔
- E. 功能无效腔

**【答案】** C

39、决定创伤愈合后局部组织抗牵拉的因素是

- A. 愈合部位胶原的含量
- B. 愈合过程中肉芽组织的量
- C. 是否伴有感染
- D. 创面大小和深度
- E. 创伤愈合的过程

**【答案】** A

40、低钾性碱中毒常出现于

- A. 尿毒症
- B. 胃肠减压
- C. 术后少尿
- D. 挤压创伤
- E. 输血过量

**【答案】** B

41、肠胃反射可

- A. 促进胃的排空，抑制胃酸分泌
- B. 促进胃的排空，促进胃酸分泌
- C. 抑制胃的排空，抑制胃酸分泌
- D. 抑制胃的排空，促进胃酸分泌
- E. 对胃排空和胃酸分泌无影响

**【答案】** C

42、属于 II 型超敏反应的疾病是

- A. 血小板减少性紫癜
- B. 血清病
- C. SLE
- D. 过敏性鼻炎
- E. 溃疡性结肠炎

**【答案】** A

43、细胞膜受体的化学本质是

- A. 蛋白质
- B. 蛋白多糖
- C. 碳水化合物



D. 小分子肽

E. 脂类复合物

**【答案】** A

44、脑膜中动脉穿过的孔裂是

A. 圆孔

B. 卵圆孔

C. 棘孔

D. 枕骨大孔

E. 破裂孔

**【答案】** C

45、硫脲类抗甲状腺不良反应不包括

A. 过敏反应

B. 粒细胞缺乏

C. 甲状腺功能减退

D. 肾脏的毒性

E. 消化道反应

**【答案】** D

46、肾功能恶化的可逆因素包括

A. 血容量不足

- B. 感染
- C. 心力衰竭及心律失常
- D. 尿路梗阻
- E. 以上都是

**【答案】** E

47、有机磷酸酯类急性中毒表现为

- A. 腺体分泌减少. 胃肠平滑肌兴奋
- B. 膀胱逼尿肌松弛. 呼吸肌麻痹
- C. 支气管平滑肌松弛. 唾液腺分泌增加
- D. 神经节兴奋. 心血管作用复杂
- E. 脑内乙酰胆碱水平下降. 瞳孔扩大

**【答案】** D

48、对于肺炎链球菌致病力的描述正确的是

- A. 产生溶血素
- B. 产生内毒素
- C. 产生胞壁酸
- D. 产生血浆凝固酶
- E. 荚膜对组织的侵袭力

**【答案】** E

49、一般情况下影响冠脉血流量的主要因素是

- A. 脉压大小
- B. 平均动脉压高低
- C. 心脏搏出量多少
- D. 舒张压的高低和心舒期的长短
- E. 收缩压的高低和射血期的长短

**【答案】D**

50、构成医疗事故的主观方面,应当是

- A. 技术水平欠缺的技术过失
- B. 违反卫生法规和诊疗护理法规, 常规的责任过失
- C. 违反操作规程的故意
- D. 疏忽大意的过失
- E. 过于自信的过失

**【答案】B**

51、不能用于判断急性心肌梗死后溶栓成功的临床指标为

- A. 胸痛缓解
- B. 心电图示 ST 段下降
- C. 频发的实性早搏
- D. CK——MB 峰值前移

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/587050020010006043>