

2024 年河北省万全区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库附解析答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 利巴韦林可致畸与肿瘤
- B: 替加色罗存在心绞痛风险
- C: 地高辛用于肾功不全患者
- D: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

答案：C

2. 某患者，男，78 岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

- A: 丙酸睾酮
- B: 非那雄胺
- C: 吲达帕胺
- D: 泼尼松龙

答案：B

3. （2019 年真题）下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

- A: 氨甲苯酸与止血敏
- B: 醋酸氯己定与洗必泰

C: 桂利嗪与脑益嗪

D: 利可君与利血生

答案: A

4. 粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 白陶土便

B: 暗红果酱色

C: 柏油便, 黑色有光泽

D: 米泔水样

答案: B

5. 肺结核最常见的传播方式为 ()

A: 血液传播

B: 垂直传播

C: 消化道

D: 飞沫传播

答案: D

6. 红肿较严重而起水泡, 疼痛较剧烈, 感觉迟钝或麻木, 1~2 日后水泡吸收结痂, 2~3 周后结痂脱落的为

A: 2 度冻伤

B: 4 度冻伤

C: 1 度冻伤

D: 3 度冻伤

答案: A

7. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 恶心、呕吐
- B: 脱发
- C: 食欲下降
- D: 骨髓抑制

答案：D

8. 提示"噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服"，是针对

- A: 药品贮存
- B: 特殊装置药品
- C: 药品有效期
- D: 特殊剂型用法

答案：B

9. 下列药物中，解救硫喷妥钠中毒的特效药是

- A: 硫酸铜
- B: 硫酸镁
- C: 碳酸氢钠
- D: 丙烯吗啡

答案：C

10. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

- A: 阿米替林
- B: 氟西汀
- C: 吗氯贝胺

D: 文拉法辛

答案: D

11. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 铝碳酸镁

B: 美金刚

C: 匹伐他汀

D: 多奈哌齐

答案: B

12. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

A: E 级

B: B 级

C: D 级

D: C 级

答案: B

13. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，45 岁，因慢性乙型肝炎给予干扰素，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状逐渐好转，再次应用干扰素，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是

A: 很可能

B: 可能无关

C: 可能

D: 肯定

答案: D

14. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压
()

- A: <130 / 80mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <150 / 90mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案：A

15. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 洛伐他汀

答案：D

16. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 利福平
- B: 红霉素
- C: 异烟肼
- D: 伊曲康唑

答案：A

17. (2015 年真题) 消化不良患者宜选用 ()。

- A: 干酵母
- B: 小檗碱
- C: 乳果糖

D: 阿苯达唑

答案: A

18. 适用于哺乳期女性避孕，须每日的同一时间服用并且不能有一日间断，一旦漏服应采用额外的避孕方法的药物是

A: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射

B: 短效复方口服避孕药

C: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)

D: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)

答案: D

19. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

A: 二甲双胍

B: 非诺贝特

C: 格列齐特

D: 辛伐他汀

答案: A

20. 肾上腺皮质激素可能引起

A: 尿胆红素

B: 尿蛋白

C: 尿液隐血

D: 尿葡萄糖

答案: D

21. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温

38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 0.8g, 4 次 / 日

B: 0.8g, 3 次 / 日

C: 0.8g, 2 次 / 日

D: 0.8g, 5 次 / 日

答案: B

22. 下列药品中，不需要避潮湿贮存的是

A: 维生素 C 片剂

B: 奥美拉唑肠溶片

C: 布洛芬颗粒剂

D: 维生素 C 注射液

答案: D

23. 患者,男,60 岁,因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是()

A: 利巴韦林软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 特比萘芬乳膏

D: 10%樟脑软膏

答案: C

24. 晚发型或伴有智能减退的患者，帕金森病治疗首选药物为（）

A: 左旋多巴

B: 司来吉兰

C: 金刚烷胺

D: 苯海索

答案: A

25. 促动力药

- A: 埃索美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：B

26. 效用指标是患者主观满意程度（质量调整生命年或质量调整预期寿命），着重与分析医疗成本与患者生活质量提升的关系是指

- A: 最大效果分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最小成本分析

答案：B

27. 可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 鸡蛋白
- C: 药用炭混悬液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：B

28. 成人血小板计数正常参考区间是

- A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$
- B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- C: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- D: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案：C

29. (2021 年真题) 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 甲巯咪唑
- C: 阿托伐他汀
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：C

30. 主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是 (单纯疱疹病毒的分型)

- A: HSV-III 型
- B: HSV- I 型
- C: HSV- II 型
- D: HSV-IV 型

答案：C

31. 可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

- A: 阿米卡星
- B: 莫西沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 阿奇霉素

答案：C

32. 不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

- A: 解释的技巧
- B: 特别关注特殊人群
- C: 保护患者的隐私

D: 及时回答不拖延

答案: C

33. 以下药品中，最适宜治疗沙眼和流行性急性结膜炎的是

A: 色甘酸钠滴眼剂

B: 酞丁安滴眼剂

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 红霉素眼膏

答案: B

34. 敌百虫中毒应

A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

B: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

C: 禁止使用肟类复能剂

D: 静脉滴注烟酰胺

答案: A

35. 代谢性或呼吸性碱中毒

A: 尿蛋白检测阳性

B: 尿酸碱度降低

C: 尿酸碱度增高

D: 尿胆红素检测阳性

答案: C

36. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

A: 口服避孕药

B: 利伐沙班

C: 普通肝素

D: 华法林

答案：A

37. (2021 年真题) 下列组合中，属于联合化疗的是 ()

A: MTX 方案 (甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注)

B: CTX+美司钠 (环磷酰胺+美司钠)

C: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂 (贝伐珠单抗+奥希替尼)

D: CHOP 方案 (环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)

答案：D

38. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A: 吡嗪酰胺

B: 链霉素

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：A

39. 适应证

A: 这药能治我这种病吗

B: 中午忘吃药了怎么办

C: 这次拿的“×××”(商品名)是我以前一直服用的“格列齐特”吗

D: 这种药能报销吗

答案：A

40. (2017 年真题) 治疗肠道蛔虫病可选用 ()

A: 聚乙醇 4000

B: 莫沙必利

C: 双八面体蒙脱石散

D: 阿苯达唑

答案: D

41. 三环类抗抑郁药中毒应

A: 禁止使用肱类复能剂

B: 静脉滴注烟酰胺

C: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

D: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

答案: C

42. 所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为（
）

A: 75mg

B: 100mg

C: 300mg

D: 150mg

答案: C

43. 关于肝功能不全患者用药，叙述不正确的是

A: 避免或减少使用肝毒性大的药物

B: 口服肝毒性较大时可改为注射给药

C: 明确诊断，合理选药

D: 肝功能不全而肾功能正常的患者可选用对肝毒性小，并且从肾脏排泄的药物

答案: B

44. (2021 年真题) 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是 ()

- A: 尿激酶
- B: 依诺肝素钠
- C: 达比加群酯
- D: 氯吡格雷

答案: D

45. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 阿莫西林
- B: 左氧氟沙星
- C: 四环素
- D: 呋喃唑酮

答案: B

46. 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是 ()

- A: 腭裂
- B: 流产或发育成正常胚胎
- C: 骨骼发育异常
- D: 牙齿色素沉着

答案: B

47. 解救汞中毒的是 ()

- A: 依地酸钙钠
- B: 盐酸戊乙奎醚
- C: 单价抗毒血清

D: 二巯丙醇

答案: D

48. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R307 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 阵发性室上性心动过速

B: 心房颤动

C: 心室颤动

D: 室性期前收缩

答案: B

49. “1 天给药 1 次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

A: 半衰期小于 30 分钟的药品

B: 半衰期大于 30 小时的药品

C: 半衰期 8~24 小时的药品

D: 半衰期大于 24 小时的药品

答案: D

50. 患者女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

A: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+甲硝唑

B: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A

C: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+阿莫西林+克拉霉素

D: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素

答案：A

51. 可加重痴呆及认知功能受损的是

A: 地西泮

B: H

C: 氯苯那敏

D: 异丙嗪

答案：B

52. 影响人类寿命的因素中，医疗占

A: 0.07

B: 0.1

C: 0.08

D: 0.15

答案：C

53. 与胆酸螯合剂合用，应提前至少 2h 服用的是

A: 螺内酯

B: 他汀类与烟酸联用

C: 依曲康唑

D: 依折麦布

答案：D

54. 米索前列醇所致的主要不良反应是

A: 神经毒性

B: 皮炎

C: 性功能减退

D: 腹痛

答案: D

55. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A: 他汀类

B: 贝特类

C: 烟酸

D: ω -3 脂肪酸

答案: A

56. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 庆大霉素

B: 青霉素

C: 多黏菌素

D: 甲氨蝶呤

答案: B

57. 适宜清晨服用的是

A: 普伐他汀

B: 呋塞米

C: 格列美脲

D: 阿司匹林

答案: B

58. 止咳药

A: 硝酸甘油

B: 去氨加压素

C: 胃黏膜保护剂

D: 甘草合剂

答案: D

59. 人体健康参数: 体重指数(BMI)正常区间是

A: 18.0~23.0

B: 18.0~22.0

C: 18.5~23.0

D: 18.5~23.9

答案: D

60. 再感染

A: 患者无尿路感染症状, 但中段尿培养连续两次(同一菌株), 尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml

B: 宜选用毒性小的抗菌药物

C: 治疗后症状消失, 尿菌阴性, 但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿, 菌株与上次不同

D: 治疗后症状消失, 尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿, 菌种与上次相同

答案: C

61. 患者计划口服避孕药避孕, 可能增加避孕失败风险的药物是 ()

A: 阿卡波糖

B: 丙戊酸钠

C: 二甲双胍

D: 卡马西平

答案: D

62. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药原因

C: ADR/ADE 过程描述

D: 用药起止时间

答案：B

63. (2019 年真题) 配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

A: 奥沙利铂

B: 博来霉素

C: 环磷酰胺

D: 依托泊苷

答案：A

64. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

A: 右眼

B: 适量

C: 立即

D: 左眼

答案：D

65. 照料、监督记忆力差的老年患者用药

A: 针对患者生理及心理特点选药

B: 使患者了解药物的重要性

C: 使用分时药盒和用药记录

D: 简化治疗方案

答案: C

66. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

A: 氯吡格雷

B: 二甲双胍

C: 氨氯地平

D: 阿卡波糖

答案: A

67. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: L—T₄

B: 丙硫氧嘧啶

C: 碘化钾

D: 甲巯咪唑

答案: A

68. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上的异常而造成胎儿畸形的阶段是

A: 妊娠 13~27 周

B: 妊娠 28~32 周

C: 妊娠 1~2 周

D: 妊娠 1~12 周

答案: D

69. 容易氧化的药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 胃蛋白酶
- C: 青霉素类
- D: 牛痘菌苗

答案：A

70. 以下毒物中毒，适宜服吐根糖浆催吐的是

- A: 阿米替林
- B: 氯硝西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 磷化锌

答案：A

71. 下列五种内服药品中，应在餐前服用的药物是

- A: 氨茶碱片
- B: 呋塞米片
- C: 吡罗昔康片
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

72. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

- A: B 级
- B: X 级
- C: C 级
- D: A 级

答案：A

73. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D₂ 受体的促胃肠动力药是

- A: 昂丹司琼
- B: 莫沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：D

74. 患者，男，40 岁，因饮酒 10 个小时后突然出现右足第一跖趾关节剧痛就诊。查体：患处肿胀、发红，不能穿鞋；触压患处疼痛加重。实验室检查显示血尿酸 520 μmol/L。诊断为痛风急性发作。

- A: 泼尼松
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 塞米昔布

答案：C

75. 布噻嗪属于

- A: 抗组胺药
- B: 镇痛药
- C: 血管扩张药
- D: 利尿剂

答案：D

76. 患者接受索拉非尼治疗时，药师应重点监测的不良反应是（）

- A: 心脏毒性
- B: 肝脏毒性

C: 生殖系统毒性

D: 肺纤维化

答案: C

77. 患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

B: 门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

C: 普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

D: 低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

答案: A

78. (2018年真题)某口服避孕药复方制剂,其成分为:每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下,请回答问题。

A: 不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

B: 到21日20:00再同时服用两片药,然后在常规时间继续服药

C: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

D: 尽快补服一片,然后在常规时间继续服药

答案: D

79. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

D: $>342 \mu\text{mol/L}$

答案：A

80. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是

A: 2.4(%g/ml)

B: 2.8(%g/ml)

C: 3.0(%g/ml)

D: 2.6(%g/ml)

答案：B

81. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 琥珀酸亚铁

B: 葡萄糖酸亚铁

C: 叶酸

D: 右旋糖酐铁

答案：C

82. 青霉素钠注射液作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 750U/ml

B: 250U/ml

C: 500U/ml

D: 100U/ml

答案：C

83. 饮水可能会引起水潴留是指

A: 利胆药

B: 舌下片（丸）

C: 苦味健胃药

D: 抗利尿药

答案：D

84. 配制青霉素输液的适宜溶媒是（）

A: 复方氯化钠注射液

B: 50%葡萄糖注射液

C: 低分子右旋糖酐注射液

D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

85. 发现严重滥用药品的处方，应该

A: 拒绝调配处方，依照有关规定报告

B: 调配处方并发药

C: 依照处方调配药品

D: 拒绝调配处方

答案：A

86. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

B: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

C: 首选口服补液，必要时静脉补液

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/587103126052010024>