眼表疾病

A1 型题

1. 眼表是指

:B A.角膜上

皮

B. 上下睑缘间的整个粘膜上皮衬里

C.结膜上皮

D.泪膜

E.角膜和结膜

2 可考虑为泪膜不稳定的是:A

A..BUT<10″

B. BUT<20″

C. BUT<30″

D. BUT<10 分

E. BUT<1 分

3 泪膜的厚度一般为

:E A.1－5μm.

B.40－50μm

C. 50－70μm

D. 31－80μm

E. 7－10μm

4 Sjgren 综合征常伴有:E

A.头痛.

B.视物变形

C.虹视

D.眼前黑影飘动

E.口干和关节痛

5 可导致结膜干燥综合征的是

A A.自身免疫性因素.

B.慢性结膜炎

C.沙眼衣原体感染

D.维生素 A 缺乏

E.长期的屈光不正未经矫正

A2 型题

6. 患者,女，50 岁，主诉双眼干涩不适1 年余，查：双眼结膜无明显充血，角膜上皮完整，荧光素染色（－），BUT<5″，Shirmer testⅡ <5mm 。该患者最可能的诊断A

A.干眼症

B.慢性结膜炎

C.急性结膜炎

D.过敏性结膜炎

E.角膜炎

A3 型题

7. 患者，60 岁，女性诉双眼干涩不适 5 年，查：双眼结膜轻度充血，睑板腺开口扩张压迫眼睑可见希黄色物资溢出，角膜上皮完整，荧光素染色 （－），BUT<5″，Shirmer testⅡ <5mm 。 7.该患者最可能的诊断是 A

A.睑板腺功能异常

B.慢性结膜炎

C.急性结膜炎

D.过敏性结膜炎

E. 睑缘炎

8. 该患者常伴有的疾病是 E

A. 睑缘炎

B.急性角膜炎

C.急性结膜炎

D.过敏性结膜炎

E. 脂溢性皮炎

B1 型 题问

题 9－11

A 泪腺和副泪腺

B 结膜杯状细胞

C 睑板腺

D 结膜杯状细胞和睑板腺

E 泪腺和 Zeiss腺

9 分泌泪液脂质层的是C

10 分泌泪液水样层的是A

11 分泌泪液粘蛋白层的是B

问题 12－13

A 角膜缘干细胞
B 结膜杯状细胞
C 睑缘处粘膜杯状细胞
D 结膜穹隆部和睑缘处粘膜上皮细胞
E 角膜基质层细胞
F. 基底膜细胞
12. 角膜上皮细胞来源于 A
13. 结膜上皮细胞来源于 D

C 型题
问题 14－15
A. 眼表上皮细胞下的基质成纤维细胞
B. 眼表上皮细胞下细胞
C. 两者均有
D. 两者均无
14. 可调控眼表上皮干细胞 C
15. 可维持正常的眼表状态有关 D

X 型题
16. 下述有关泪膜的正确论点为
ADE A 泪膜表层为脂质层
B. 泪膜的粘液层是泪膜中容量最大的部分,由主泪腺和副泪腺分泌
C. 泪膜的粘液层主要功能是减少蒸发,提供润滑作用
D. 泪膜有营养角膜和抗微生物作用
E. 泪膜有屈光作用

17. 诊断干眼症的依据是
ABCDE A 干、痒、异物感等症状
B 泪液的分泌量不足
C 泪膜不稳定
D 眼表细胞的损害
E 泪液的渗透压增加

18. 泪液中的免疫球蛋白包含有
ACE A.、IgA
B 、 IgB
C 、 IgG

A 型题		
1	视觉器官包括	
	A 眼球，眼附属器	B 眼球泪器，眼外肌
	答案 C	
2	正常人眼球向前方平视时，一般突出于外侧眶缘约	
	A 11－12mm	B 12－13mm
	答案 E	
3	眼球壁分为哪三层	
	A 纤维膜，虹膜，葡萄膜	B 纤维膜，角膜，视网膜
	答案 D	
4	组织学上角膜分为 5 层，其厚度约为 35μm的为	
	A 上皮细胞层	B 前弹力层
	答案 A	
5	巩膜最薄弱处是	
	A 巩膜筛板	B 视神经周围
	答案 E	
6	前房角位于	
	A 角巩膜缘内面	B 巩膜沟内
	答案 C	
7	虹膜卷缩轮距瞳孔缘约	
	A 1mm	B 1.5mm
	答案 B	
8	睫状体位于	
	A 巩膜突与脉络膜之间	B 睫状冠与脉络膜之间
	答案 E	
9	光感受器的组织结构不包括下列哪一项	
	A 外节	B 连结纤毛
	答案 D	
10	眼眶由 7 块骨组成,部包括下面哪一项	
	A 额骨,筛骨	B 蝶骨,腭骨
	答案 C	

11	视神经孔内除视神经通过外,还有下列哪项通过	
	A 眶下静脉	B 第III脑神经
	答案 D	
12	通过眶下裂的有	
	A 第Ⅴ脑神经第一支,眶下神经	B 第Ⅴ脑神经第二支,眶下神经及眶下静脉
	答案 B	
13	眶下孔位于	
	A 眶上缘内 1/3,离眶缘约 4mm 处	B 眶下缘内 1/3,离眶缘约 4mm 处
	答案 B	
14	泪道不包括下列哪项	
	A 泪小点	B 泪小管
	答案 E	
15	下列哪条肌肉不起自于眶尖总腱环	
	A 上直肌	B 下直肌
	答案 D	
16	下列哪一条肌肉不受第III脑神经支配	
	A 提上睑肌	B 上直肌
	答案 E	
17	视网膜是由下列哪项发育而成	
	A 视杯	B 视泡
	答案 C	
18	泪膜的生理作用不包括	
	A 润滑眼球表面	B 防止角结膜干燥
	答案 E	
19	虹膜睫状体炎症可引起疼痛是由于含有	
	A 睫状神经	B 交感神经
	答案 E	
20	影响药物透过角膜的因素不包括	
	A 药物浓度	B 溶解度
	答案 E	

	B 型题	
	问题 21-25	
	A 角膜上弹力层	
	B 前弹力层	
	C 基质层D	
	后弹力层	
	E 内皮细胞层	
21	厚约 12μm,为一层均质无细胞成分的透明膜,由胶原纤维束薄板组成的是	B
22	厚约 500μm,约占角膜厚度的 90%	C
23	厚约 35μm,由 5-6 层鳞状上皮细胞组成的是	A
24	厚约 5μm,为一层六角形扁平细胞构成,细胞顶部朝向前房,基底朝向后弹力层的是	E
25	为较为坚韧的透明均质膜,成人厚约 10-12μm 的是	D
	问题 26-30	
	A 虹膜	
	B 虹膜纹理和陷窝	
	C 瞳孔	
	D 虹膜卷缩轮	
	E 虹膜根部	
26	为一圆盘状膜,将眼球前后腔隙隔成前后房并悬在房水中为	A
27	虹膜中央由 2.5-4mm 的圆孔为	C
28	距离瞳孔缘约 1.3mm 的虹膜上有一环形齿轮状隆起为	D
29	虹膜表面有辐射状凹凸不平的皱褶为	B
30	虹膜周边与睫状体连接处为	E
	问题 30-35	
	A 视锥视杆细胞层	
	B 外核层	
	C 神经节细胞层	
	D 神经纤维层	
	E 内丛状层	
31	由双极细胞,无长突细胞与神经节细胞相互接触形成突触的部位是	E
32	由光感受器的内外节组成的是	A
33	由光感受器的细胞核组成的是	B
34	由神经节细胞轴突构成的是	D
35	由神经节细胞核构成的是	C

	问题 36-40	
	A 视神经孔	
	B 眶上裂	
	C 眶下裂	
	D 眶上切迹	
	E 泪前嵴	
36	泪囊窝前缘为	E
37	位于眶外壁和眶下壁之间的是	C
38	位于眶上缘内 1/3 处的是	D
39	位于视神经孔外下方,在眶上壁和眶外壁的分界处,长约 22mm,与颅内相通的是	B
40	位于眶尖部的圆孔,直径为 4-6mm 的是	A
	问题 41-44	
	A 眼内段	
	B 眶内段	
	C 管内段	
	D 颅内段	
	E 视束段	
41	出视神经骨管后进入视交叉前脚的部医.学全在线分为	D
42	位于肌锥内,呈 S 形弯曲的部分视	B
43	经过颅骨视神经管的部分为	C
44	从视盘开始,穿过巩膜筛板的部分为	A
	问题 45-49	
	A 胚眼	
	B 视沟	
	C 视窝	
	D 视泡	
	E 视茎	
45	视泡向前生长,近脑端较窄形成的是	E
46	随着神经管的闭合,视窝加深,形成囊状突起的是	D
47	发育成单层神经外胚叶的是	C
48	胚胎上前脑两侧神经褶处,略呈弧形凹痕的是	B
49	由神经外胚叶,脑神经嵴细胞,表皮外胚叶,中胚叶发育而成的是	A
	问题 50-53	
	A 泪 膜B	
	脂质层C	
	水液层	

	D 粘蛋白层	
	E 泪质层	
50	由结膜杯状细胞分泌形成的是	D
51	由泪腺和副泪腺分泌形成的是	C
52	由睑板腺分泌形成的是	B
53	覆盖于眼球前表面的一层液体是	A
	C 型题	
	问题 54-56	
	A 0.50-0.55mm	
	B 1mm	
	C 两者均有	
	D 两者均无	
54	正常人角膜中央厚度约为	A
55	正常人角膜周边厚度约为	B
56	高度近视眼的角膜厚度约为	D
	问题 57-59	
	A 基质层	
	B 色素上皮层	
	C 两者均有	
	D 两者均无	
57	虹膜内由疏松的结缔组织和虹膜色素细胞组成的是	A
58	虹膜内两层细胞内均含有致密黑色素,并使虹膜后面颜色深黑的是	B
59	虹膜的组织学构成使	C
	问题 60-62	
	A 眼轮匝肌	
	B 提上睑肌	
	C 两者均有	
	D 两者均无	A
60	由面神经支配,司眼睑闭合功能的是	B
61	由动眼神经支配,有提起上睑,开启睑裂功能的是	C
62	正常人眼睑能自由睁开与闭合主要依靠的是	
	问题 63-65	
	A 瞳孔括约肌	
	B 瞳孔开大肌	
	C 两者均有D 两者均无	

63	受副交感神经支配司缩瞳作用的是	A
64	受交感神经支配司散瞳作用的是	B
65	受感觉神经支配的是	D
	X 型题	
66	眼科学研究的视觉器官包括	
	A 眼球壁 www.med126.com/hushi/	B 眼内容物
	答案 ABCDE	
67	眼球壁分为	
	A 纤维膜	B 筋膜
	答案 ACE	
68	组织学上角膜分为	
	A 上皮细胞层	B 前弹力层
	答案 ABCDE	
69	角巩膜缘的解剖特点	
	A 是角膜和巩膜的移行区	B 是前房角及房水引流系统的所在
	答案 ABCD	
70	睫状体部的正常结构有	
	A 睫状冠答	B 睫状突
	案 ABCDE	
71	正常人晶状体形状及大小是	
	A 形如双凸透镜	B 前面曲率半径约 10mm
	答案 ABCDE	
72	眼眶内容纳的正常组织有	
	A 眼球	B 眼外肌
	答案 ABCDE	
73	眼睑肌层包括	
	A 骨骼肌	B 眼轮匝肌
	答案 BD	
74	眼外肌的血液供应来自	
	A 眼动脉分出的上下肌支	B 泪腺动脉
	答案 ABD	

75	眼球静脉回流主要为	
	A 视网膜中央静脉	
	B 睫状体前后静脉	
	C 睫状体前静脉	
	D 眼上下静脉	
	E 涡静脉	
	答案 ACE	
76	胚眼的发育来源于	
	A 神经外胚叶	B 神经内胚叶
	答案 ACDE	
77	泪膜的生理作用是	
	A 润滑眼球表面	B 防止角结膜干燥
	答案 ABCE	
78	角膜物血管,其营养代谢主要依靠	
	A 房水	B 泪腺
	答案 ABC	
79	正常状况下玻璃体呈	
	A 凝胶状态	B 代谢缓慢,不能再生
	答案 ABCDE	
80	正常色觉者视锥细胞中含有的感光色素是	
	A 红色	B 绿色
	答案 ABC	
81	临床上眼遗传病的研究方法有	
	A 家系调查法	B 双生子法
	答案 ABCDE	
82	影响药物透过角膜的因素有	
	A 药物的浓度	B 药物溶解度
	答案 ABCDE	
83	常用眼药剂型及给药方式有	
	A 滴眼液	B 眼膏
	答案 ABCD	

A 型
题

1 结膜最常见的疾病是：

A 结膜炎　B 翼状胬肉　C 睑裂斑　D 结膜皮样脂肪瘤

答案 A

2 结膜炎最常见的症状是：

A 疼痛　B 畏光　C 异物感　D 发痒

答案 C

3 结膜炎最基本的体征是：

A 结膜充血　B 结膜水肿　C 结膜脓性分泌物　D 滤泡形成

答案 A

4 结膜炎患者结膜囊内滴入 0.1%的肾上腺素时：

A 结膜充血加重　B 结膜充血无改变　C 结膜充血消失　D 结膜水肿减轻

答案 C

5 结膜充血时:

A 呈鲜红色　B 呈暗红色　C 呈紫红色　D 颜色无明显改变

答案 A

6 结膜炎患者结膜充血是因为：

A 结膜富含血管　B 结膜上的新生血管增多　C 结膜血管扩张　D 结膜血液循环受阻

答案 C

7 结膜炎患者结膜水肿是由于：

A 泪液进入结膜下　B 结膜血管渗出液进入结膜下　C 结膜血管漏出液进入结膜下　D 结膜下组织本身富含水

答案 C

8 细菌性结膜炎患者结膜的分泌物：

A 浆液性、粘液性和脓性　B 浆液性或水样　C 浆液性、粘液性和粘稠丝　D 浆液性、粘稠丝状和脓状

答案 A

9 病毒性结膜炎患者结膜的分泌物：

A 浆液性、粘液性和脓性　B 浆液性或水样　C 浆液性、粘液性和粘稠丝　D 浆液性、粘稠丝状和脓状

答案 B

10 过敏性结膜炎患者结膜的分泌物：

A 浆液性、粘液性和脓性　B 浆液性或水样　C 浆液性、粘液性和粘稠丝　D 浆液性、粘稠丝状和脓状

答案 E

11 干眼病患者结膜的分泌物：

A 浆液性、粘液性和脓性答案 E　B 浆液性或水样　C 浆液性、粘液性和粘稠丝　D 浆液性、粘稠丝状和脓状

12 乳头增生：

A 是结膜炎的特异性特征　B 主要见于睑结膜　C 主要见于球结膜　D 主要见于穹窿部结膜

答案 B

13 乳头增生主要是由于：

A 结膜上皮过度增生或多形核白细胞浸润　B 淋巴细胞增殖　C 结膜上皮过度增生和淋巴细胞增殖　D 多形核白细胞浸润和淋细胞增殖

答案 A

14 滤泡形成主要是由于：

A 结膜上皮过度增生或多形核白细胞浸润　B 淋巴细胞增殖　C 结膜上皮过度增生和淋巴细胞增殖　D 多形核白细胞浸润和淋细胞增殖

答案 B

15 耳前淋巴结肿大和压痛最常见于：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 B

16 结膜细胞学检查时嗜中性粒细胞增多见于：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 A

17 结膜细胞学检查时单核细胞增多，尤其是淋巴细胞为主时应考虑：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 B

18 结膜细胞学检查时可见等量的嗜中性粒细胞和淋巴细胞增多时应考虑：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 D

19 结膜细胞学检查时可见大量嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多时应考虑：

细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 C

20 结膜细胞学检查时可见大量的嗜酸性粒细胞结节增多时应考虑：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 E

21 测定血清中抗体的效价，有助于诊断：

A 细菌性结膜炎　B 病毒性结膜炎　C 过敏性结膜炎　D 沙眼

答案 B

22 超急性细菌结膜炎的病因是：

A 淋球菌和脑膜炎球菌　B 绿脓杆菌　C 金黄色葡萄球菌　D 肺炎双球菌

答案 A

23 超急性细菌结膜炎最常见的病因是：

A 淋球菌　B 绿脓杆菌和脑膜炎球菌　C 金黄色葡萄球菌　D 肺炎双球菌

答案 A

24 奈瑟脑膜炎球菌性结膜炎的最常见感染途径是：

A 产道感染　B 生殖器－眼接触　C 生殖器－手－眼接触　D 血源性播散

答案 D

25 奈瑟脑膜炎球菌性结膜炎：

A 儿童比成人多见　B 成人比儿童多见　C 男性比女性多见　D 女性比男性多见

答案 A

26 淋球菌性结膜炎的潜伏期为：

A 数小时　B24 小时内　C 2～3 天　D 3～4 天

答案 C

27 脑膜炎球菌性结膜炎的潜伏期为：

A 数小时　B24 小时内　C 2～3 天　D 3～4 天

答案 B

28 超急性细菌结膜炎的治疗应首选：

A 青霉素滴眼液局部治疗　B 青霉素全身治疗　C 利福平滴眼液局部治疗　D 四环素全身治疗

答案 E

29 有“脓漏眼”之称的是：

A 成人淋球菌性结膜炎　B 新生儿淋球菌性结膜炎　C 成人脑膜炎球菌性结膜炎　D 新生儿脑膜炎球菌性结炎

答案 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/588054076015006073