

2024 年河北省行唐县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库及参考答案 (典型题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 蓖麻油
- D: 普芦卡必利

答案：B

2. 弥散性血管内凝血症的晚期可选用

- A: 尿激酶
- B: 氨甲环酸
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

答案：B

3. 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 不宜用于皮肤皱褶部位
- B: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- C: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- D: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

答案：B

4. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 氯喹
- B: 青蒿素
- C: 哌嗪
- D: 噻嘧啶

答案：C

5. 颅内压增高和颅脑损伤、支气管哮喘、肺源性心脏病代偿失调患者禁用()。

- A: 芬太尼
- B: 吗啡
- C: 曲马多
- D: 哌替啶

答案：B

6. (2016 年真题) 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

- A: 托烷司琼
- B: 维生素 B6
- C: 阿瑞吡坦
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

7. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

- A: 利可君
- B: 利伐沙班
- C: 糖皮质激素

D: 腺嘌呤

答案：B

8. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A: 克罗米通

B: 克拉霉素

C: 特比萘芬

D: 异维 A 酸

答案：D

9. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反应是

A: 过敏反应

B: 胃肠道反应

C: 周围神经炎

D: 肝损伤

答案：C

10. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

A: 促进吸收

B: 抗菌谱不相似

C: 促进分布

D: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢

答案：D

11. 作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 克拉维酸

B: 阿莫西林

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案: C

12. 下列药物中属于缩瞳药的是

A: 毛果芸香碱

B: 噻吗洛尔

C: 阿托品

D: 拉坦前列素

答案: A

13. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

A: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

B: 维生素 D

C: 铁剂

D: 钙剂

答案: D

14. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

A: 尼莫地平

B: 氟氯地平

C: 维拉帕米

D: 硝苯地平

答案: C

15. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

A: 沙美特罗

- B: 多索茶碱
- C: 沙丁胺醇
- D: 布地奈德

答案：A

16. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是

- A: 青霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氯霉素
- D: 红霉素

答案：B

17. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 精神病患者
- B: 月经期妇女
- C: 妊娠期妇女
- D: 中、老年人

答案：C

18. 与链激酶、尿激酶联用溶栓治疗，可增加疗效，且不显著增加严重出血发生率的是

- A: 低分子肝素
- B: 阿司匹林
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：B

19. 作用机制为直接改变破骨细胞的形态学，从而抑制其功能，首先阻止破骨细胞的前体细胞黏附于骨组织，进而对破骨细胞的数量和活性产生直接的影响，该药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 骨化三醇
- C: 降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

20. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()
。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 依诺肝素

答案：D

21. 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是

- A: 先用氯化钠注射液溶解,再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- B: 氯化钠注射液稀释
- C: 5%葡萄糖注射液稀释
- D: 先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：B

22. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 1 周

B: 4 周

C: 2 周

D: 3 周

答案：C

23. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

A: 格列本脲

B: 格列吡嗪

C: 甲苯磺丁脲

D: 胰岛素

答案：A

24. 下述药物中不属于助消化药的是

A: 乳酸菌素

B: 乳酶生

C: 兰索拉唑

D: 胰酶

答案：C

25. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

C: 洋地黄毒苷

D: 地高辛

答案：C

26. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是 ()。

- A: 多索茶碱
- B: 噻托溴铵
- C: 孟鲁司特
- D: 沙美特罗

答案: B

27. 小剂量就有抗焦虑作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 吗啡
- C: 苯妥英钠
- D: 地西泮

答案: D

28. 四环素联用红霉素使

- A: 调整抗凝血药的剂量
- B: 增加麦角中毒的风险
- C: 口服吸收减少
- D: 肝毒性增加

答案: D

29. (2015 年真题) 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖者首选的降糖药是 ()。

- A: 格列美脲
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 普萘洛尔

答案：B

30. (2016 年真题) 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是

- A: 虹膜睫状体炎患者
- B: 青光眼患者
- C: 睫状肌麻痹患者
- D: 眼底检查者

答案：B

31. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC) 28×10

- A: 青霉素
- B: 磷霉素
- C: 四环素类
- D: 头孢菌素

答案：C

32. 可单独用于原发性高血压的药物是

- A: 甘露醇
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

33. 对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

- A: 阿托品

B: 氯化钾、葡萄糖注射液

C: 利尿剂

D: 苯妥英钠

答案：A

34. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是 ()

A: 卡泊芬净

B: 氟胞嘧啶

C: 氟康唑

D: 特比萘芬

答案：D

35. 阻断 H₂ 受体的药物是

A: 雷尼替丁

B: 阿托品

C: 氢氧化铝

D: 奥美拉唑

答案：A

36. 长期服用避孕药产生的不良反应不包括

A: 胃肠道反应

B: 月经失调

C: 心律失常

D: 类早孕反应

答案：C

37. 利血平与布洛芬合用

- A: 降压效应减弱
- B: 口干、便秘、发热
- C: 首剂量低血压反应
- D: 钠水潴留

答案：A

38. (2017 年真题) 属于芳香酶制剂抗肿瘤药是 ()

- A: 阿那曲唑
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 炔雌醇

答案：A

39. 低剂量可提供接近全效的降压作用的是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

40. 不良反应多, 治疗窗窄个体差异大, 与很多药物存在不良相互作用, 已降为二线用药的平喘药物是 ()

- A: 沙美特罗
- B: 茶碱
- C: 氟替卡松
- D: 孟鲁司特

答案：B

41. 阻断白三烯受体，起效缓慢，作用较弱，仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 茶碱
- D: 氟替卡松

答案：A

42. 抗菌活性强，并对 β -内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是（）。

- A: 头孢吡肟
- B: 氨曲南
- C: 亚胺培南
- D: 头孢美唑

答案：C

43. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是（）

- A: 蒙脱石散
- B: 乳果糖
- C: 地芬诺酯
- D: 洛哌丁胺

答案：C

44. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨

D: 长春瑞滨

答案: B

45. 左炔诺孕酮为

A: 促性腺激素

B: 促性腺激素释放激素类似物

C: 短效口服避孕药

D: 雌激素类

答案: C

46. 稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 维拉帕米

D: 地尔硫

答案: C

47. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量

B: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

C: 碱化尿液，促进尿酸排泄

D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案: B

48. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇 4000

C: 酚酞

D: 开塞露

答案：A

49. 配制静脉输液时,应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释,不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是()

A: 伏立康唑

B: 卡泊芬净

C: 两性霉素 B

D: 氟康唑

答案：B

50. 蛋白结合率较高(>70%)的头孢菌素类是

A: 头孢曲松

B: 头孢吡肟

C: 头孢呋辛

D: 头孢噻肟

答案：A

51. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法,错误的是

A: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治

B: 儿童可使用 5%的软膏

C: 密切接触者应同时接受治疗

D: 用药期间应勤用热水洗澡

答案：D

52. (2019 年真题) 关于氢氯噻嗪临床应用的说法,错误的是()

- A: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状
- B: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应
- C: 对血糖和尿酸无影响，可长期服用
- D: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害

答案：C

53. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 抑制 DNA 螺旋酶
- B: 破坏细菌细胞壁
- C: 抑制二氢蝶酸合成酶
- D: 抑制二氢叶酸还原酶

答案：D

54. 呆小病宜选用

- A: 硫脲类
- B: 普萘洛尔
- C: 甲状腺片
- D: 硫脲类+大剂量碘

答案：C

55. 关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

- A: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- B: 外用糖皮质激素可增加感染风险
- C: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药
- D: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案：C

56. 利伐沙班的药理作用是

- A: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用
- B: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶
- C: 抑制血小板聚集
- D: 抑制游离凝血酶

答案：A

57. 属于第二代 CCB 的是

- A: 乐卡地平
- B: 左旋氨氯地平
- C: 氨氯地平
- D: 硝苯地平控释片

答案：D

58. 卡马西平用于

- A: 特发性震颤
- B: 慢性脑功能不全
- C: 神经源性尿崩症
- D: 早期帕金森病

答案：C

59. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 作用于 RAAS 初始环节，从源头减少血管紧张素 II 的生成
- B: 阻断 AT1 受体
- C: 促进缓激肽水解
- D: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素 II 的生成

答案：D

60. 天然的雌激素是()

- A: 炔雌醚
- B: 黄体酮
- C: 雌二醇
- D: 戊酸雌二醇

答案: C

61. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 普罗帕酮

答案: B

62. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 钙剂
- B: 铁剂
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 维生素 D

答案: A

63. 维生素 B

- A: 纤溶亢进所致的出血
- B: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血
- C: 拮抗肝素过量导致的出血
- D: 拮抗华法林过量导致的出血

答案: B

64. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 滴速 80~100 滴 / 分
- B: 不超过 15 滴 / 分
- C: 不超过 40 滴 / 分
- D: 滴速 20~30 滴 / 分

答案：C

65. 通过促进组织对葡萄糖的摄取和利用发挥作用()

- A: 阿卡波糖
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 艾塞那肽

答案：C

66. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 溴己新
- D: 羧甲司坦

答案：A

67. 属于促血小板生成药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 甲苯氢醌
- C: 氨甲环酸

D: 酚磺乙胺

答案：A

68. 患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

A: 阿莫西林

B: 双氯西林

C: 苄星青霉素

D: 万古霉素

答案：A

69. 关于美罗培南使用的叙述，正确的是

A: 一天一次给药

B: 癫痫等中枢神经系统不良反应发生率与亚胺培南相似

C: 所致肾功能损害和恶心、呕吐等胃肠道反应较亚胺培南少

D: 肝功能不全患者应用需调整剂量

答案：C

70. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A: 普萘洛尔

B: 格列喹酮

C: 磺胺甲唑

D: 甲状腺素

答案：D

71. 下列药物中，不属于雌激素的是

A: 雌二醇

B: 黄体酮

C: 尼尔雌醇

D: 雌三醇

答案: B

72. 碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

A: 丙戊酸钠

B: 拉莫三嗪

C: 卡马西平

D: 苯巴比妥

答案: A

73. (2021 年真题) 属于烷化剂，能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是 ()

A: 厄洛替尼

B: 来曲唑

C: 长春新碱

D: 环磷酰胺

答案: D

74. 12% 复方氨基酸注射液 (18AA) 的静脉滴速为

A: 不超过 40 滴 / 分

B: 滴速 20~30 滴 / 分

C: 不超过 15 滴 / 分

D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: B

75. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案：A

76. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

A: 美托洛尔

B: 索他洛尔

C: 硝酸甘油

D: 利多卡因

答案：D

77. 下列属于短效糖皮质激素的是

A: 泼尼松

B: 泼尼松龙

C: 甲泼尼龙

D: 氢化可的松

答案：D

78. 多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

A: 表柔比星

B: 柔红霉素

C: 多柔比星

D: 吡柔比星

答案：A

79. 细胞内液的主要阳离子是

A: 钙

B: 钾

C: 钠

D: 镁

答案: B

80. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

A: 血管内皮生长因子

B: 人表皮生长因子受体-2

C: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

D: 表皮生长因子受体

答案: B

81. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

A: 阿莫西林

B: 庆大霉素

C: 红霉素

D: 奈替米星

答案: B

82. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A: 多柔比星

B: 吡柔比星

C: 柔红霉素

D: 表柔比星

答案: C

83. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 酚磺乙胺
- C: 氨甲环酸
- D: 甲苯氢醌

答案：D

84. 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的错误的是

- A: 可用于过敏性皮炎的治疗
- B: 未控制的细菌或真菌感染不宜使用
- C: 面部、阴部和皱褶部分的湿疹，需长期使用强效制剂
- D: 若继发细菌或真菌感染，可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案：C

85. 地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

- A: 拟杆菌
- B: 乳酸杆菌
- C: 葡萄球菌
- D: 双歧杆菌

答案：C

86. 属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 奥美拉唑
- C: 莫沙必利
- D: 胃蛋白酶

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/588116007044007022>