

病理学(医学高级)《诊断学基础考试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：肝脏肿大不应该出现于下列哪一种疾病（ ）。A. 急性病毒性肝炎
B. 脂肪肝
C. 肝淤血
D. 肝糖原累积症
E. 晚期肝硬化
- 2、单项选择题：下列哪一项不是支气管呼吸音的特征（ ）。A. 强度响亮
B. 高音调
C. 吸气相与呼气相之比为 1：1
D. 呈管样性质
E. 正常人于胸骨上窝可闻及
- 3、单项选择题：符合高血钾心电图表现的是（ ）。A. T 波高耸，基底部狭窄，呈帐篷型 T 波
B. u 波倒置
C. 冠状 T 波
D. ST 段水平型下移
E. QT 间期缩短
- 4、单项选择题：诊断甲状旁腺功能亢进症的主要依据是（ ）。A. TT4
B. TT3
C. T3
D. PTH
E. CT
- 5、单项选择题：男，60 岁，主诉近 2 天头晕、胸闷、心悸，来院就诊。如患者是高血压，其最可能出现的心音改变是（ ）。A. A2 增强
B. A2 减弱
C. P2 增强
D. P2 减弱
E. P2 分裂
- 6、多项选择题：能引起菊粉清除率降低的疾病有（ ）。A. 心力衰竭
B. 慢性肾炎
C. 急性肾炎
D. 膀胱炎

E. 尿道炎

- 7、单项选择题：AMI 患者 CK-MB 增高，其增高的时间为发病后（ ）。A. 3~8 小时升高，10~36 小时达到峰值
B. 3~8 小时升高，9~30 小时达到峰值
C. 1~4 小时升高，4~8 小时达到峰值
D. 3~6 小时升高，10~24 小时达到峰值
E. 0.5~2.0 小时升高，5~12 小时达到峰值
- 8、单项选择题：以下关于焦虑的说法，正确的是（ ）。A. 咖啡因、阿片类药物、激素、镇静催眠药以及酒精等，长期使用或戒断、中毒后可引起焦虑症状
B. 女性和男性患焦虑的几率无统计学差异
C. 严重的急性焦虑发作不会出现呼吸困难和心跳加快
D. 对于初诊、无心理应激因素、病前个性良好的焦虑患者，无须行器质性疾病排查
E. 焦虑的发生与遗传无关
- 9、单项选择题：肥胖指超过标准体重（ ）。A. 20%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
E. 30%
- 10、单项选择题：为提高大便中副溶血弧菌阳性检出率，最佳运送培养液是（ ）。A. 肉汤培养基
B. 咽拭子运送培养基
C. 大便运送盒
D. 无菌杯
E. Cary-blair 运送培养基
- 11、单项选择题：先天性心脏病动脉导管未闭可见（ ）。A. 水冲脉
B. 脱落脉
C. 无脉
D. 交替脉
E. 奇脉
- 12、单项选择题：患者，男，62 岁，进行性吞咽困难 2 个月，1 周来仅能进流食。X 线食管造影：食管中段约 5cm 长不规则样狭窄，管壁僵硬，蠕动消失。该患者吞咽困难属于（ ）。A. 机械性吞咽困难
B. 运动性吞咽困难
C. 口咽性吞咽困难
D. 机械性与运动性两者均有
E. 精神性吞咽困难
- 13、单项选择题：患者男性，52 岁，高血压病史 20 年，近来活动后气喘。心电图如图 5-11 所示，应诊断为（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588142053003006066>