

2024 广西壮族自治区灌阳县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库含答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害，临床用药需要重点关注的抗癫痫药是()

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 氯硝西泮
- D: 丙戊酸钠

答案：D

2. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()

- 。
- A: 亚胺培南
 - B: 头孢美唑
 - C: 氨曲南
 - D: 头孢吡肟

答案：B

3. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 整合素受体阻断剂
- D: 环氧酶抑制剂

答案：D

4. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

- A: $3\sim 5\mu\text{g/L}$
- B: $10\sim 15\mu\text{g/L}$
- C: $20\sim 30\mu\text{g/L}$
- D: $30\sim 50\mu\text{g/L}$

答案：D

5. 下列药物属于肾素抑制剂的是()

- A: 卡托普利
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 阿利克仑

答案：D

6. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 雷洛昔芬
- C: 降钙素
- D: 骨化三醇

答案：B

7. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 通过增强抗凝血酶川（AT-III）的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用

B: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

C: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除

D: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程

答案：A

8. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 青霉素类

C: 氨基糖苷类

D: 四环素类

答案：A

9. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的是

A: 米力农

B: 卡维地洛

C: 氯沙坦

D: 氢氯噻嗪

答案：B

10. 多柔比星与阿糖胞苷同用可()

A: 增加心脏毒性

B: 易产生沉淀

C: 导致坏死性结肠炎

D: 增加肝毒性

答案：C

11. 链霉素属于

- A: 四环素类
- B: 氨基糖苷类
- C: 酰胺醇类
- D: β -内酰胺类

答案：B

12. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲环酸
- D: 酚磺乙胺

答案：D

13. 破坏 DNA 结构和功能的抗恶性肿瘤药是

- A: 环磷酰胺
- B: 吉非替尼
- C: 多柔比星
- D: 5-氟尿嘧啶

答案：A

14. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 前列腺素类药物
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 拟肾上腺素能药
- D: 拟胆碱能药

答案：A

15. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 噻托溴铵
- B: 喷托维林
- C: 沙丁胺醇
- D: 氨溴索

答案：A

16. 对贝特类(苯氧芳酸类)的叙述正确的是()

- A: 可降低 HDL-ch
- B: LDL-chC 主要用于原发性高胆固醇血症
- C: 可升高 T
- D: 能明显降低血浆 TG、VLDL-ch

答案：D

17. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 拟胆碱药
- C: α_2 受体激动剂
- D: 前列腺素衍生物

答案：B

18. 常用抗真菌药中，()抑制真菌细胞壁主要成分葡聚糖的合成

- A: 棘白菌素类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：A

19. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 红霉素
- B: 维生素 C
- C: 氯丙嗪
- D: 他莫昔芬

答案：B

20. 组胺 H

- A: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁
- B: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- C: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案：B

21. 与肝素相比，华法林的作用特点不包括

- A: 起效快
- B: 价格便宜
- C: 作用持久
- D: 口服有效，应用方便

答案：A

22. 有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：D

23. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 血糖升高
- B: 低镁血症
- C: 血尿酸升高
- D: 定向力障碍

答案：B

24. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 降低凝血酶活性
- B: 激活抗凝血酶
- C: 直接对抗血小板聚集
- D: 使环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用

答案：D

25. 多柔比星

- A: 干扰核酸生物合成
- B: 干扰 RNA 转录
- C: 直接破坏 DNA 结构和功能
- D: 影响蛋白质合成和功能

答案：B

26. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

- A: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效
- B: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用
- C: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌
- D: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

答案：A

27. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 莫沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮
- D: 西沙必利

答案：C

28. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 阿莫西林
- C: 氧化镁
- D: 四环素类

答案：A

29. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 胶体果胶铋
- B: 熊去氧胆酸
- C: 山莨菪碱
- D: 多潘立酮

答案：B

30. (2021 年真题) 痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是
()

- A: 哌拉西林他唑巴坦
- B: 青霉素 G
- C: 苯唑西林

D: 苕星青霉素

答案：A

31. 复方炔诺酮()

A: 促进蛋白质合成

B: 抑制排卵作用

C: 抗着床

D: 减少精子数目

答案：B

32. 激动 I1 咪唑啉受体的降压药是

A: 吡那地尔

B: 可乐定

C: 利血平

D: 肼屈嗪

答案：B

33. (2017 年真题) 奥司他韦治疗流行性感冒, 首次用药的时间是 ()

A: 出现流感症状后 72 小时内

B: 出现流感症状后 100 小时内

C: 出现流感症状后 36 小时内

D: 出现流感症状后 96 小时内

答案：C

34. 头孢哌酮的主要清除途径是

A: 主要经肝脏清除

B: 主要经呼吸道排泄

C: 主要经肾脏排泄

D: 经肝、肾双途径清除

答案: D

35. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是 ()

A: 吡嗪酰胺

B: 链霉素

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: B

36. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A: 柔红霉素

B: 吡柔比星

C: 表柔比星

D: 多柔比星

答案: A

37. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A: 阿那曲唑

B: 氟他胺

C: 炔雌醇

D: 他莫昔芬

答案: A

38. 维生素 A 缺乏时可引起

A: 脚气病

B: 角膜软化

C: 坏血病

D: 成人佝偻病

答案: B

39. 乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

A: 直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出

B: 增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出

C: 恶心性祛痰作用

D: 使痰量逐渐减少，产生化痰作用

答案: A

40. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A: 晚餐前

B: 下午 4 时左右

C: 中午 12 时左右

D: 上午 8 时左右

答案: D

41. 下列属于 β 受体阻断剂的是

A: 卡托普利

B: 螺内酯

C: 美托洛尔

D: 阿利吉仑

答案: C

42. 与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A: 胺碘酮

- B: 多巴胺
- C: 拟交感药
- D: 考来烯胺

答案：A

43. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

- A: 格雷司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 甲地孕酮
- D: 阿瑞吡坦

答案：B

44. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 阿昔洛韦
- C: 奥司他韦
- D: 干扰素

答案：A

45. 腺苷蛋氨酸作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：A

46. 可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

- A: 多西环素
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案: C

47. 治疗慢性室性心律失常的药物是()

- A: 奎尼丁
- B: 美西律
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案: B

48. (2021 年真题) 属于烷化剂，能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是()

- A: 来曲唑
- B: 厄洛替尼
- C: 长春新碱
- D: 环磷酰胺

答案: D

49. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 阿托伐他汀

答案: D

50. 下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 呋塞米

答案：D

51. 患者，男，56 岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

- A: 芳香族氨基酸
- B: 脂肪族氨基酸
- C: 支链氨基酸
- D: 杂环氨基酸

答案：C

52. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 立克次体
- B: 衣原体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 支原体

答案：C

53. 通过保护胃黏膜起到抗消化性溃疡目的的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 碳酸钙
- C: 硫糖铝
- D: 奥美拉唑

答案：C

54. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 考来烯胺
- B: 多巴胺
- C: 胺碘酮
- D: 拟交感药

答案：B

55. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 艾塞那肽

答案：B

56. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

- A: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者
- B: 肝、肾功能不全者
- C: 有子宫内膜癌症状和体征者
- D: 心力衰竭患者

答案：D

57. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 剧烈疼痛
- B: 阿片中毒
- C: 惊厥
- D: 失眠

答案：B

58. 苯妥英钠血药浓度超过多少可出现中毒症状

A: 20 $\mu\text{g/ml}$

B: 10 $\mu\text{g/ml}$

C: 5 $\mu\text{g/ml}$

D: 2 $\mu\text{g/ml}$

答案：A

59. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 来曲唑

答案：B

60. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

A: 4g

B: 1g

C: 2g

D: 3g

答案：A

61. 属于短效胰岛素制剂的是

A: 甘精胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 地特胰岛素

答案：C

62. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 埃索美拉唑
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 克拉霉素
- D: 硝苯地平缓释片

答案：A

63. 阿司匹林的抗血小板作用机制为

- A: 抑制内皮细胞中 TXA
- B: 促进内皮细胞中 PGI
- C: 抑制血小板中 TXA
- D: 激活环氧酶

答案：C

64. 蛋白结合率较高（>70%）的头孢菌素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢吡肟

D: 头孢曲松

答案：D

65. 具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

A: 比索洛尔

B: 卡托普利

C: 氨氯地平

D: 氢氯噻嗪

答案：B

66. 可使青光眼患者症状加重的是()

A: 噻托溴铵

B: 孟鲁司特

C: 沙美特罗

D: 沙丁胺醇

答案：A

67. 紧急降低眼压首选的药物是()

A: 20%甘露醇

B: β 受体阻滞药

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 拟 M 胆碱药

答案：A

68. 羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌肉注射次数

A: 3 次

B: 1 次

C: 2 次

D: 4 次

答案：B

69. 连续应用易产生耐受性的是

A: 硝苯地平

B: 地尔硫

C: 硝酸甘油

D: 普萘洛尔

答案：C

70. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 骨关节炎

B: 胃溃疡

C: 肾绞痛

D: 痛风

答案：A

71. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

A: 孟鲁司特

B: 多索茶碱

C: 噻托溴铵

D: 沙美特罗

答案：D

72. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是

A: 普萘洛尔

B: 瑞格列奈

C: 格列美脲

D: 二甲双胍

答案：B

73. 易引起低血钾的利尿药是

A: 阿米洛利

B: 山梨醇

C: 氢氯噻嗪

D: 氨苯蝶啶

答案：C

74. 用药时需关注肺毒性的药物是

A: 柔红霉素

B: 紫杉醇

C: 长春新碱

D: 博来霉素

答案：D

75. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A: 来曲唑

B: 羟喜树碱

C: 卡莫氟

D: 甲氨蝶呤

答案：C

76. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

A: 甲睾酮

B: 非那雄胺

C: 丙酸睾酮

D: 硝酸甘油

答案：D

77. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 可作为术后预防呕吐的常规用药

B: 无心脏不良反应

C: 对泌乳素的分泌无影响

D: 对化疗所致的呕吐有效

答案：C

78. 对 G

A: 第三代头孢菌素

B: 第二代头孢菌素

C: 第一代头孢菌素

D: 第四代头孢菌素

答案：D

79. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在 ()

A: 远曲小管初段

B: 肾小球

C: 髓袢升支粗段

D: 集合管

答案：A

80. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 阿那曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 丙酸睾酮

答案：C

81. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 洛伐他汀

答案：A

82. 关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

- A: 最佳服药时间是餐前
- B: 碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂
- C: 抗酸药直接中和胃酸
- D: 不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生

答案：A

83. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 尼扎替丁
- C: 雷尼替丁
- D: 西咪替丁

答案：A

84. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 吗啡
- B: 美沙酮
- C: 可待因
- D: 布洛芬

答案：B

85. 用于预防及治疗深静脉血栓及肺栓塞，严重出血时可静脉注射维生素 K1 的是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 K1
- C: 肝素
- D: 香豆素类

答案：D

86. 属于广谱抗心律失常药物的是()

- A: 地高辛
- B: 苯妥英钠
- C: 胺碘酮
- D: 利多卡因

答案：C

87. 阿司匹林的作用机制是

- A: 促进凝血因子合成
- B: 抑制血小板聚集
- C: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- D: 促进纤溶

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/595012001120012033>