

主治医师（口腔医学）-口腔修复学(A1/A2 型题 6)

1、上颌后部口腔前庭与口腔本部的交界处为

- A. 腭小凹
- B. 后堤区
- C. 翼上颌切迹
- D. 上颌结节
- E. 颤动线

2、全口义齿排牙时，下颌第二磨牙远中应不超过

- A. 磨牙后垫前缘
- B. 磨牙后垫前 1/2
- C. 磨牙后垫中 1/3
- D. 磨牙后垫后 1/3
- E. 磨牙后垫后缘

3、全口义齿排牙时，下颌曲线的延长线应

- A. 与磨牙后垫 1/2 处一致
- B. 与磨牙后垫前 1/3 与中 1/3 部分的交界处一致
- C. 与磨牙后垫中 1/3 与后 1/3 部分的交界处一致
- D. 与磨牙后垫中 1/3 与下 1/3 部分的交界处一致
- E. 与磨牙后垫上 1/3 与中 1/3 部分的交界处一致

4、全口义齿排牙时，下颌第一磨牙应

- A. 与磨牙后垫的前缘等高
- B. 与磨牙后垫的 $1/3$ 等高
- C. 与磨牙后垫的 $1/2$ 等高
- D. 与磨牙后垫的 $2/3$ 等高
- E. 与磨牙后垫的后缘等高

5、全口义齿修复，检查架时，发现切针升高而离开切导盘，造成的主要原因为

- A. 托蜡收缩
- B. 托蜡膨胀
- C. 石膏结固后膨胀
- D. 石膏调拌过快
- E. 石膏调拌过稀

6、检查架时，若发现切针升高，未与切导盘接触，若不纠正，易造成的后果是

- A. 义齿固位差
- B. 垂直距离改变
- C. 义齿稳定性差
- D. 义齿翘动

E. 义齿不易就位

7、技师对无牙颌模型的某些区域用石膏填补倒凹，其目的主要为

A. 节省基托材料

B. 节省时间

C. 增加义齿固位

D. 消除基托对此区域的压迫

E. 增加模型的美观与光洁

8、制作全口义齿的印模属于

A. 初印模

B. 加压印模

C. 闭合式印模

D. 解剖式印模

E. 功能性印模

9、全口义齿修复时，采用功能性印模的目的是

A. 使口腔组织受压均匀

B. 使印模组织面清晰

C. 能精确塑造出唇、颊、舌侧边缘与功能运动时的粘膜皱襞和系带间的吻合关系

D. 边缘及粘膜转折清晰

E. 使印模边缘圆滑

10、对无牙颌印模范围的要求中，不正确的描述为

- A. 基托伸展范围过大，会损伤粘膜组织
- B. 基托伸展范围不足，将使义齿的固位和支持力均受到影响
- C. 上颌印模后缘应盖过腭小凹和翼上颌切迹
- D. 下颌印模后缘应盖过磨牙后垫前缘
- E. 舌侧后缘伸展应越过下颌舌骨嵴舌侧翼缘区

11、无牙颌模型边缘应有一定的宽度，一般宽为

- A. 1~2mm
- B. 2~3mm
- C. 3~4mm
- D. 4~5mm
- E. 5~6mm

12、某男性患者，74 岁，全牙列缺失。检查见上颌牙槽嵴有不平整的牙槽窝，全口义齿修复，在无牙颌模型上，哪一个解剖结构相对应的基托组织面不需要缓冲

- A. 不平整的牙槽窝
- B. 上颌隆突
- C. 下颌舌骨嵴

D. 舌侧翼缘区

E. 切牙乳突

13、对无牙颌模型的要求中，不正确的是

A. 模型厚度 3~4mm

B. 模型边缘的宽度 3~4mm

C. 可形成上颌后堤区

D. 下颌不可形成后堤区

E. 后堤区可刮除石膏少许

14、在无牙颌模型上，哪一区域如不缓冲易形成支点，使义齿产生前后翘动

A. 颧突

B. 腭小凹

C. 切牙乳突

D. 上颌硬区

E. 上颌唇侧前庭

15、牙列缺失后，软组织将出现改变，以下哪项是不易发生的

A. 唇颊沟变深

B. 舌沟间隙变浅

C. 鼻唇沟变深

- D. 舌形态改变
- E. 磨牙后垫位移

16、某男性患者，71 岁，牙列缺失，全口义齿修复，在无牙颌模型上确定义齿边缘位置时，不宜过度伸展的区域是

- A. 远中颊角区
- B. 上颌唇侧前庭
- C. 后弓区
- D. 舌侧翼缘区
- E. 颊棚区

17、人工牙根据制作材料分为

- A. 前牙和后牙
- B. 解剖式牙和半解剖式牙
- C. 解剖式牙和非解剖式牙
- D. 塑料牙和瓷牙
- E. 树脂牙和金属牙

18、非解剖式牙的牙尖斜度为

- A. 0 度
- B. 10 度
- C. 20 度

D. 30 度

E. 33 度

19、咬合时，上、下颌牙之间有一定的尖窝锁结关系的是

A. 解剖式牙

B. 非解剖式牙

C. 半解剖式牙

D. 有尖牙

E. 无尖牙

20、人工前牙的长度主要根据()而定

A. 患者的颌弓大小

B. 颌间距的大小

C. 患者的面形

D. 患者的年龄

E. 患者的面部皮肤颜色

21、进行全口义齿修复，患者微笑时，上唇微笑线到平面的直线距离约为上中切牙的

A. 切 1/3 长

B. 切 2/3 长

C. 中 1/3 长

D. 中 2/3 长

E. 颈 1/3 长

22、在全口义齿修复时，对于前牙的大小的确定，不起决定作用的是

A. 唇的长短

B. 患者的拔除前牙

C. 患者的面形大小

D. 颌弓形状

E. 两口角线间的长度

23、对于无牙颌病人，在选择后牙，确定其颊舌径宽度时，以下说法不正确的是

A. 牙槽嵴低平者，宜选择颊舌径较窄的人工后牙

B. 牙槽嵴呈刀刃状者，宜选择颊舌径较窄的人工后牙

C. 牙槽嵴较丰满者，所选人工后牙颊舌径应小于原天然牙

D. 牙槽嵴较丰满者，所选人工后牙应大于原天然牙

E. 牙槽嵴低平者，宜选择咀嚼面积小的人工后牙

24、平衡是指

A. 正中时有广泛均匀的接触

B. 前伸时，前后牙均有接触

C. 侧方颌时，工作侧和非工作侧均有接触

D. B 与 C

E. A 与 B 与 C

25、无牙颌模型应有一定的厚度，一般厚为

A. 2mm

B. 4mm

C. 6mm

D. 8mm

E. 10mm

26、某女性患者，64 岁。全口义齿戴用一周，舌系带感觉疼痛。检查见，舌系带处有一 1mm 左右小溃疡，引起舌系带疼痛的主要原因是

A. 舌系带过短

B. 舌系带过长

C. 基托在舌系带处缓冲不足

D. 基托在舌系带处不密合

E. 以上都对

27、上颌全口义齿的后缘应在腭小凹后

A. 1mm 处

B. 2mm 处

C. 3mm 处

D. 4mm 处

E. 5mm 处

28、关于下颌牙槽嵴的描述，不正确的是

A. 牙槽嵴表面覆盖着高度角化的鳞状上皮及紧密的粘膜下层

B. 是影响下全口义齿固位的主要区域

C. 下颌牙槽嵴可变成刃状或低平

D. 下颌牙槽嵴呈弓形

E. 下颌牙槽嵴支持咀嚼压力的面积较上颌小

29、下颌全口义齿基托应尽量伸展的区域为

A. 远中颊角区

B. 下颌隆突

C. 下颌舌骨嵴

D. 颊棚区

E. 下颌唇系带

30、下颌全口义齿相对应的应缓冲的区域，不包括

A. 舌侧翼缘区

B. 下颌舌骨嵴

C. 下颌颊系带

- D. 舌系带
- E. 下颌隆突

31、下颌全口义齿后界封闭区为

- A. 下颌颊系带
- B. 磨牙后垫
- C. 远中颊角区
- D. 下颌舌骨嵴
- E. 舌侧翼缘区

32、全口义齿的固位力主要为

- A. 牵张力
- B. 夹持力
- C. 粘着力
- D. 摩擦力
- E. 大气压力与吸附力

33、当对藻酸盐弹性印模材料进行消毒时，为了不影响印模的精确度，所选择的消毒药物应在较短的时间内达到消毒目的，此时间应限制在

- A. 一小时内
- B. 两小时内

- C. 半小时内
- D. 一个半小时内
- E. 两个半小时内

34、全口义齿后堤区处理的主要目的是

- A. 增加基托厚度，有利于磨改
- B. 防止患者恶心与不适应
- C. 增加边缘封闭作用，有利于固位
- D. 防止义齿行使功能时旋转脱位
- E. 有利于义齿承受较大力

35、某女性患者，69 岁，全牙列缺失。检查见颧突有明显倒凹，模型处理时不正确的是

- A. 贴一层胶布缓冲
- B. 可以不作处理
- C. 用磷酸锌粘固粉加高少许
- D. 均匀削除少许石膏
- E. 用石膏加厚少许

36、前伸髁导斜度为 32 度时，侧方髁导斜度为

- A. 10 度
- B. 20 度

C. 25 度

D. 30 度

E. 16 度

37、某男性患者，57 岁，全牙列缺失，全口义齿修复。初戴全口义齿时，非咬合状态出现松动脱落，其最常见的原因因为

A. 基托在上颌硬区缓冲不够

B. 基托组织面与粘膜不密合

C. 唇、颊、舌系带区基托边缘让开不够

D. 基托磨光面形态不佳

E. 颌位记录有偏差

38、某男性患者，64 岁。全口义齿戴用一周后，上牙槽嵴粘膜疼痛，造成此症状的原因，除外

A. 骨突末缓冲

B. 模型牙槽嵴处石膏磨损

C. 垂直距离过高

D. 模型骨突处用磷酸盐粘固粉加厚少许

E. 刮除模型骨突处石膏，以去除倒凹

39、切牙乳突是无牙颌中稳定的解剖标志，它与上中切牙之间的距离是相对稳定的，上中切牙唇面距切牙乳突中点的距离为

- A. 3~5mm
- B. 5~8mm
- C. 8~10mm
- D. 10~12mm
- E. 12~15mm

40、某男性患者，78 岁，无牙颌，一周前行全口义齿修复。复诊主诉：大张口、进食，说话时义齿碰撞脱落，查患者表情自然，颌位关系正常，造成此症状的最可能的原因为

- A. 垂直距离过小
- B. 基托不密合
- C. 非正中关系位
- D. 垂直距离过大
- E. 上颌结节颊侧基托过厚

41、某男性患者，59 岁，全牙列缺失，全口义齿修复。若缓冲区未作缓冲处理，最可能出现的后果是

- A. 疼痛
- B. 义齿翘动
- C. 义齿咀嚼功能不良
- D. 义齿纵折
- E. 恶心

42、某女，49 岁，因牙周病造成全口牙齿脱落，2 年前行全口义齿修复，最近下颌义齿在说话和吃饭时经常脱落，造成此现象的主要原因因为

- A. 侧向运动有牙尖干扰
- B. 基托伸展范围不够
- C. 基托过长
- D. 垂直距离过低
- E. 牙槽嵴吸收，基托与牙槽嵴不密合

43、对上颌后堤区的描述，不正确的是

- A. 位于前后颤动线之间
- B. 宽约 2~12mm，平均 8.2mm
- C. 有利于义齿封闭
- D. 此区无弹性
- E. 有利于义齿固位

44、上下无牙颌的主承托区为

- A. 牙槽嵴顶
- B. 牙槽嵴的舌腭侧
- C. 牙槽嵴的唇颊侧
- D. 上下牙槽嵴的唇颊侧及舌腭侧，包括硬区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595040200340011330>