

---

## 常见药物作用机制及不良反应知识试卷

1. 糖皮质激素用于严重感染的目的是

- A、加强抗生素的抗菌作用
- B、提高机体抗病能力
- C、缓解中毒症状，防止病灶扩散
- D、加强心肌收缩力
- E、减轻过敏症状

**【正确答案】：** B

2. 氟喹诺酮类药物的抗菌作用机制是

- A、抑制细菌二氢叶酸合成酶
- B、抑制细菌二氢叶酸还原酶
- C、抑制细菌转肽酶
- D、抑制细菌 DNA 回旋酶
- E、抑制细菌细胞壁合成

**【正确答案】：** D

3. 下列给药途径中，一般来说，吸收速度最快的是（ ）

- A、吸入
- B、口服
- C、肌内注射
- D、皮下注射
- E、静脉给药

**【正确答案】：** A

4. 用于治疗外周血管痉挛性疾病的药物是（ ）

- A、多巴胺
- B、酚妥拉明
- C、阿托品
- D、东莨菪碱
- E、普萘洛尔

**【正确答案】：** B

5. 青蒿素的主要缺点是

- A、复发率高
- B、不易通过血脑屏障
- C、疗效低
- D、易产生耐药性
- E、对红细胞外期疟原虫无效

---

**【正确答案】：A**

6. 左旋多巴抗帕金森病的作用机制是

- A、在中枢转变为多巴胺
- B、促进中枢多巴胺的释放
- C、抑制中枢多巴胺的再摄取
- D、激动中枢多巴胺受体
- E、在中枢转变为去甲肾上腺素

**【正确答案】：A**

7. 能刺激胃黏膜，反射性引起呼吸道腺体分泌增加而稀释痰液的药物是

- A、溴己新
- B、羧甲司坦
- C、氯化铵
- D、乙酰半胱氨酸
- E、酮替芬

**【正确答案】：C**

8. 可用于治疗肝性脑病的是

- A、左旋多巴
- B、罗匹尼罗
- C、培高利特
- D、普拉克索
- E、吡贝地尔

**【正确答案】：A**

9. 治疗心绞痛长期应用后不能突然停药的药物是

- A、硝苯地平
- B、普萘洛尔
- C、硝酸甘油
- D、维拉帕米
- E、硝酸异山梨酯

**【正确答案】：B**

10. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的不良反应

- A、咳嗽
- B、低血压
- C、味觉异常
- D、腹泻
- E、高血钾

**【正确答案】：D**

11. 不能单独用于甲状腺功能亢进行内科治疗的药物是

- 
- A、普萘洛尔
  - B、丙硫氧嘧啶
  - C、甲巯咪唑
  - D、卡比马唑
  - E、甲硫氧嘧啶

**【正确答案】：**A

12. 吸收较快的给药途径是（ ）

- A、肌肉注射
- B、皮下注射
- C、口服
- D、经直肠给药
- E、贴皮

**【正确答案】：**A

13.  $\alpha$  受体拮抗药的主要不良反应是（ ）

- A、血糖过低
- B、支气管哮喘
- C、直立性低血压
- D、高脂血症
- E、心力衰竭

**【正确答案】：**C

14. 助消化药稀盐酸的浓度是

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%
- E、60%

**【正确答案】：**A

15. 普萘洛尔能诱发下列哪种严重病症（ ）

- A、高脂血症
- B、消化性溃疡
- C、窦性心动过速
- D、支气管哮喘
- E、高血压

**【正确答案】：**D

16. 应用阿司匹林治疗无效的是

- A、头痛
- B、牙痛

- 
- C、关节痛
  - D、胃肠绞痛
  - E、肌肉痛

**【正确答案】：** D

17. 甲巯咪唑的严重不良反应是

- A、肝损害
- B、过敏反应
- C、粒细胞缺乏
- D、肾损害
- E、心悸、多汗

**【正确答案】：** C

18. 普萘洛尔不具有下列哪项作用（ ）

- A、抑制心肌收缩力
- B、减慢心率
- C、减少心排血量
- D、松弛支气管平滑肌
- E、减少肾素释放

**【正确答案】：** D

19. 慢性钝痛不宜用吗啡的主要原因是

- A、疗效差
- B、致便秘
- C、抑制呼吸
- D、易产生依赖性
- E、致尿潴留

**【正确答案】：** D

20. 下列哪项对毛果芸香碱的叙述是错误的（ ）

- A、直接激动 M 受体
- B、易透过黏膜吸收
- C、滴眼可导致瞳孔扩大
- D、滴眼后可导致近视
- E、滴眼后可导致眼压降低

**【正确答案】：** C

21. 氯丙嗪影响体温调节的机制是

- A、抑制内热原释放
- B、抑制体温调节中枢
- C、阻断  $\alpha$  受体
- D、阻断 M 受体

---

E、抑制前列腺素生成

**【正确答案】：** B

22. 目前扩瞳查眼底常选用下列哪种药（ ）

- A、阿托品
- B、托吡卡胺
- C、山莨菪碱
- D、东莨菪碱
- E、毛果芸香碱

**【正确答案】：** B

23. 不宜与普萘洛尔联合应用的抗心绞痛药物是

- A、维拉帕米
- B、硝酸异山梨酯
- C、硝苯地平
- D、硝酸甘油
- E、尼群地平

**【正确答案】：** A

24. 妨碍铁吸收的因素是

- A、胃酸
- B、维生素 C
- C、半胱氨酸
- D、四环素
- E、果糖

**【正确答案】：** D

25. 异丙嗪抗过敏的机制主要是

- A、阻断 H<sub>1</sub> 受体
- B、激动 H<sub>1</sub> 受体
- C、阻断 H<sub>2</sub> 受体
- D、激动 H<sub>2</sub> 受体
- E、激动 M 受体

**【正确答案】：** A

26. 易透过血脑屏障的药物具有的特点为（ ）

- A、与血浆蛋白结合率高
- B、分子量大
- C、极性大
- D、脂溶性高
- E、极性大且脂溶性高

**【正确答案】：** D

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/595211204102012112>