

2024 年福建省晋江市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整题库及答案 1 套

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2017 年真题）患者男，70 岁，典型的“面具脸”“慌张步态”表现，临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是（）

- A: 苯海索
- B: 卡比多巴
- C: 甲基多巴
- D: 普拉克索

答案：A

2. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 甲氧氯普胺注射液
- B: 尼莫地平注射液
- C: 硫酸镁注射液
- D: 葡萄糖酸钙注射液

答案：C

3. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 乙酰胺
- B: 维生素 B
- C: 阿托品

D: 维生素 K

答案：D

4. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

A: 瘦肉精中毒

B: 亚硝酸盐中毒

C: 麦角胺中毒

D: 异烟肼中毒

答案：A

5. 静脉滴注速度过快或口服剂量过大，可引起急性肾衰竭的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 脂肪乳

C: 人促红素

D: 利巴韦林

答案：A

6. 可引发周围神经疾病，需同服维生素 B6 进行防止

A: 异烟肼

B: 链霉素

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案：A

7. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 瑞格列奈片应于餐前服用

- B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- C: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：C

8. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

- A: 肝肾功能不全者
- B: 药物治疗窗窄、需要做监测者
- C: 需要重新选择药品或调整用药方案者
- D: 应用特殊剂型者

答案：A

9. 患者,男,38 岁,因腹部受寒胃痉挛疼痛,应选用的药物是()

- A: 山莨菪碱
- B: 卡马西平
- C: 麦角胺咖啡因
- D: 布洛芬

答案：A

10. 常用缓泻药的作用机制不包括

- A: 膨胀性
- B: 容积性
- C: 刺激性
- D: 润湿性

答案：D

11. 能与胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶中的蛋白结合，减弱其助消化药效的是

- A: 茶叶中的鞣酸
- B: 食盐中的氯化钠
- C: 食醋中的醋酸
- D: 酒中的乙醇

答案：A

12. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

- A: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品
- B: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品
- C: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品
- D: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

答案：C

13. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 白消安
- B: 博来霉素
- C: 柔红霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

14. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

15. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征
- D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

16. （2015 年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

- A: 需要终身服药
- B: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状
- C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- D: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

答案：D

17. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- C: 每次腹泻后均需少量多次喂水，直至腹泻停止
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食

答案：B

18. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: ALT 升高
- B: 低血糖
- C: 心律失常
- D: 腹胀

答案：D

19. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物不良反应的发生率增高。

- A: 磺胺异恶唑
- B: 维生素 B1
- C: 阿司匹林
- D: 苯巴比妥

答案：B

20. 可提示骨骼疾病的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- B: A/G 值低于 1
- C: γ -谷氨酰转移酶升高

D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：D

21. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

A: 可杜绝投诉事件

B: 可提高患者用药的依从性和满意度

C: 可使患者获得有关的用药指导

D: 是药师实施药学服务的基本技能

答案：A

22. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施

A: 静脉药物配置

B: 治疗药物监测

C: 处方点评

D: 处方审核

答案：C

23. 顺应人体生物节律的变化，适宜清晨给药的是

A: 地塞米松

B: 洛伐他汀

C: 鞣酸蛋白

D: 强力泻药

答案：A

24. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A: 食醋

B: 酒

C: 烟

D: 浓茶

答案: B

25. 复方樟脑酊中毒时，宜首选的特殊解毒剂为

A: 硫酸铜

B: 氟马西尼

C: 碳酸氢钠

D: 纳洛酮

答案: D

26. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

A: 双解磷

B: 谷胱甘肽

C: 盐酸烯丙吗啡

D: 亚硝酸钠

答案: B

27. 尿失禁治疗的首要处理原则是

A: 除去诱因和针对原发病进行治疗

B: 药物治疗

C: 进行行为治疗

D: 调整生活方式

答案: A

28. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 直立性低血压

- B: 口干、便秘、尿潴留
- C: 鼻咽炎和尿路感染
- D: 卧位和坐位时高血压

答案：C

29. 在骨骼疾病的诊断酶学中最重要酶是

- A: ALP
- B: LDH
- C: ACP
- D: CK

答案：A

30. 耳蜗神经损伤及耳毒性

- A: 米诺环素
- B: 庆大霉素
- C: 氯霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

31. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 泼尼松龙
- D: 苯溴马隆

答案：D

32. 具体写明稀释比例和使用时间，是倡导开处方环节的

- A: 医嘱完整不漏项

- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 实现个体化治疗
- D: 医嘱清楚准确

答案：A

33. 和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

- A: 多潘立酮
- B: 利福平
- C: 左氧氟沙星
- D: 丙磺舒

答案：C

34. 患者，男，50 岁，主诉咳嗽，症状持续 8 天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者 14 岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温 37.1℃、心率 70 次 / 分、血压 130 / 70mmHg、呼吸 18 次 / 分，动脉血氧饱和度为 98%，肺部可闻及喘鸣音。

- A: 右美沙芬
- B: 阿莫西林
- C: 沙丁胺醇
- D: 喷托维林

答案：A

35. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5

B: 100kcal:1gN

C: 150kcal:1gN

D: NPC7:3

答案：A

36. 腔道疾病时宜选用

A: 注射剂

B: 片剂

C: 软膏剂

D: 栓剂

答案：D

37. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

A: 阿托品

B: 氯噻嗪

C: 四环素

D: 地高辛

答案：D

38. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

A: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6

B: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

C: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

D: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能

答案：C

39. 患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是()

- A: 卡比多巴
- B: 苯海索
- C: 甲基多巴
- D: 普拉克索

答案: B

40. 丝裂霉素的主要毒副作用是 ()

- A: 肺纤维化
- B: 出血性膀胱炎
- C: 心脏毒性
- D: 溶血性尿毒症

答案: D

41. 高胆固醇血症, 首选的治疗药物是

- A: ω -3 脂肪酸制剂
- B: 他汀类
- C: 贝特类
- D: 烟酸类

答案: B

42. 药源性疾病是由药物诱发的疾病, 是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 肝硬化患者应用利多卡因, 可引起严重的中枢神经系统疾病

- B: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5 小时
- C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：A

43. 阿糖腺苷属于

- A: 抗肿瘤药
- B: 抗过敏药
- C: 抗病毒药
- D: 抗真菌药

答案：C

44. (2018 年真题) 患者, 女, 19 岁, 面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现, 临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳, 换用异维 A 酸片。使用异维 A 酸片的用药注意事项和用药指导, 不包括 ()

- A: 治疗期间或治疗后 1 个月内避免献血
- B: 用药前排除妊娠
- C: 监测精神症状
- D: 每 1—3 个月监测血尿酸水平

答案：D

45. 可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 雌激素、孕激素、雄激素
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 苯巴比妥
- D: 沙利度胺

答案：A

46. 选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

- A: 硫酸氨基葡萄糖
- B: 阿司匹林
- C: 可待因
- D: 塞来昔布

答案：A

47. 流行性腮腺炎

- A: 白细胞减少
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

答案：C

48. 患者男,64 岁,诊断为 2 型糖尿病,既往有磺胺过敏史不宜选用的药物是 ()

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 吡格列酮
- D: 阿卡波糖

答案：B

49. 服用后可致嗜睡,驾驶员应慎用的药物是 ()

- A: 引达帕胺
- B: 氯苯那敏
- C: 胰酶
- D: 阿司匹林

答案：B

50. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q—T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是

- A: 福辛普利
- B: 地高辛
- C: 胺碘酮
- D: 美托洛尔

答案：C

51. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 胰岛素
- B: 西咪替丁
- C: 氯丙嗪
- D: 呋塞米

答案：D

52. 伴有 Q—T 间期延长的过敏性鼻炎患者不宜使用的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 鼻用抗组胺药
- C: 口服抗组胺药
- D: 口服糖皮质激素

答案：C

53. 治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

- A: 甲硝唑栓
- B: 硝酸咪康唑栓
- C: 聚甲酚磺醛栓
- D: 克霉唑栓

答案：C

54. 下列药物中适宜在睡前服用的是()

- A: 美洛昔康
- B: 泼尼松
- C: 辛伐他汀
- D: 多潘立酮

答案：C

55. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 维生素
- B: 维生素 A
- C: 复合维生素 B
- D: 维生素 C

答案：B

56. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

- A: 流行性结膜炎
- B: 流行性出血性结膜炎
- C: 过敏性结膜炎
- D: 急性卡他性结膜炎

答案：D

57. 药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

- A: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性
- B: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

C: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂

D: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5-羟色胺综合征

答案：A

58. 药师应当主动对药物的风险/效益进行定量评估和分析，将全部信息进行反馈，改进相关监督、管理及所使用的法律、法规这一药学服务工作属于

A: 药物重整

B: 药物评价

C: 药物治疗管理

D: 药物警戒

答案：D

59. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

A: 双脱氧胞苷

B: 奈韦拉平

C: 替诺福韦

D: 拉米夫定

答案：B

60. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

A: 滴眼剂

B: 胰岛素制剂

C: 肝素等生物制品

D: 水溶性基质栓

答案：D

61. 药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

62. 阿司匹林可导致

- A: 结晶沉积
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小球滤过率下降
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

63. （2018 年真题）患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mg tidpo，罗格列酮片 2mg bidpo，甲钴胺片 0.5mg tidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mg bidpo。

- A: 立刻服用美托洛尔片
- B: 立刻喝白开水 200mL
- C: 立刻舌下含服硝酸甘油片
- D: 立刻口服糖水或糖块

答案：D

64. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.50~0.70

B: 0.20~0.40

C: 0.01~0.05

D: 0.03~0.08

答案：A

65. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

A: 双向交流作用

B: 应对投诉作用

C: 用药监督作用

D: 药物警戒作用

答案：A

66. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

A: II 期临床试验

B: 临床预试验

C: III 期临床试验

D: I 期临床试验

答案：A

67. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下的儿童不宜应用的是

A: 右美沙芬

B: 苯丙哌林

C: 喷托维林

D: 可待因

答案：C

68. 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是：

- A: 阿奇霉素
- B: 头孢呋辛
- C: 磺胺甲恶唑
- D: 红霉素

答案：C

69. 药师在处方调剂操作中，下列处方应重新开具才能调剂的是

- A: 给流感患者开具速感宁胶囊、维生素 C 片使用一张处方用纸，分行书写
- B: 给门诊患者开具 7d 用量的地西泮片
- C: 给儿童细菌性腹泻患者开具小檗碱片使用淡绿色处方用纸
- D: 给慢性支气管炎患者开具沙丁胺醇气雾剂、中药饮片，使用同一张处方用纸

答案：D

70. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 碳酸氢钠
- B: 小檗碱
- C: 胰酶
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：C

71. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A: 竞争性拮抗作用
- B: 敏感化作用
- C: 减少不良反应

D: 协同作用

答案：B

72. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

A: 清晨服用帕罗西汀

B: 餐前服用格列本脲

C: 餐前服用阿莫西林

D: 清晨服用硫酸镁

答案：A

73. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

A: 维生素 K1

B: 维生素 C

C: 低分子肝素

D: 鱼精蛋白

答案：D

74. 美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益表明

A: 有助个体化给药

B: 列为行政决策的依据

C: 改变降脂治疗观念

D: 有利诊断特殊疾患

答案：C

75. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

- A: 20~24 例
- B: 20~30 例
- C: 10~18 例
- D: 12~13 例

答案：B

76. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓后 24h?
- B: 溶栓后 1h?
- C: 溶栓后 12h?
- D: 溶栓后 3h?

答案：A

77. 急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

- A: AST 下降
- B: AST/ALT 比值>1
- C: ALT 下降
- D: AST/ALT 比值<1

答案：D

78. 适宜餐前服用的助消化药是

- A: 硫糖铝
- B: 铝碳酸镁
- C: 乳酸菌素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 法莫替丁

答案: C

79. 查询药物质量检验标准可首选的书籍是

A: 《中华人民共和国药典》

B: 《药物治疗学》

C: 《药物流行病学》

D: 《新编药物学》

答案: A

80. Xa 因子抑制剂

A: 肝素

B: 氯吡格雷

C: 利伐沙班

D: 华法林

答案: C

81. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 奥美拉唑

D: 碳酸氢钠

答案: B

82. 脑梗死的治疗药物，脱水治疗

A: 普通肝素

B: 阿替普酶

C: 阿司匹林

D: 甘露醇

答案：D

83. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 铅中毒

B: 乙醇中毒

C: 催眠药中毒

D: 汞中毒

答案：B

84. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

A: 非诺贝特

B: 烟酸类

C: 考来烯胺

D: 阿托伐他汀

答案：B

85. 剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A: 多奈哌齐

B: 吗啡

C: 可待因

D: 阿司匹林

答案：C

86. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏反应等用药信息，归属于

A: 环境与流程的优化与持续改进

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 管理规范到位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/595241204120012033>