

2023 年江苏省普通高校专科升本科大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、调节产热活动最重要的体液因素是()

- (A)甲状腺激素
- (B)甲状旁腺激素
- (C)胰岛素
- (D)生长激素

2、第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是（）

- (A)肌皮神经
- (B)正中神经
- (C)尺神经
- (D)桡神经
- (E)腋神经

3、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

- (A)尿素
- (B)氨基酸
- (C)大分子蛋白质
- (D)葡萄糖
- (E)电解质

4、符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是（）

- (A) $PaO_2/FiO_2 \leq 200\text{mmHg}$
- (B)一般吸氧治疗无效
- (C)胸片显示有广泛点、片状阴影

(D)双肺可闻及湿啰音

(E)呼吸频率逐渐加快

5、造成心室前负荷增大的因素是（）

(A)心肌收缩力增强

(B)静脉回流速度下降

(C)心室充盈量增大

(D)心率增快

(E)心室顺应性减小

6、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

(A)尿素

(B)氨基酸

(C)大分子蛋白质

(D)葡萄糖

(E)电解质

7、水冲脉的特点是【】

(A)脉搏骤起骤落

(B)脉搏强弱不等

(C)呼气时脉搏明显减弱

(D)脉搏迅速上升缓慢下降

(E)脉搏节律不整

8、男，18岁。因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术。术后3天切口红肿，有脓性分泌物，将缝线拆除后引出20ml脓液，10天后再次缝合而愈合。该患者切口愈合类型为()

(A)III/丙

(B) III/乙

(C) II/丙

(D) II/乙

9、男，48岁。因右季肋部胀满2个月就诊。查体：触诊肝脏质地坚硬、表面结节状，无压痛。最可能的诊断是【】

(A) 慢性肝脓肿

(B) 慢性肝炎

(C) 急性肝炎

(D) 原发性肝癌

(E) 多发性肝囊肿

10、清创术的目的是【】

(A) 冲洗伤腔

(B) 清除伤口内异物

(C) 修剪伤口边缘

(D) 清除血肿

(E) 将污染伤口变为清洁伤口

11、包被于肾实质表面的结构是【】

(A) 肾筋膜

(B) 肾纤维囊

(C) 肾脂肪囊

(D) 肾周围脂肪

(E) 脏腹膜

12、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

- (A) 回结肠动脉
- (B) 右结肠动脉
- (C) 左结肠动脉
- (D) 中结肠动脉
- (E) 空肠动脉

13、防止子宫脱垂的主要结构是()

- (A)子宫圆韧带
- (B)子宫主韧带
- (C)子宫阔韧带
- (D)子宫骶韧带

14、烧伤患者早期抗休克应先补充（）

- (A)电解质溶液
- (B)血浆
- (C)5%葡萄糖溶液
- (D)10%葡萄糖溶液
- (E)全血

15、男，70岁。有慢性支气管炎病史30年。受凉后突发气促、烦躁3天。查体：口唇发绀，呼吸36次/分，脉率100次/分，双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是()

- (A)心电图
- (B)血常规
- (C)血气分析
- (D)肺功能

16、三尖瓣所在的位置是（）

- (A)左房室口
- (B)肺动脉口
- (C)主动脉口
- (D)冠状窦口
- (E)右房室口

17、具有结肠带和肠脂垂的肠管是（）

- (A)肛管
- (B)直肠
- (C)阑尾
- (D)盲肠
- (E)回肠

18、正常成年人代谢率最低的情况见于【】

- (A) 清醒平卧
- (B) 熟睡
- (C) 闭目思考
- (D) 深呼吸
- (E) 餐前半小时

19、具有结肠带和肠脂垂的肠管是（）

- (A)肛管
- (B)直肠
- (C)阑尾
- (D)盲肠
- (E)回肠

20、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

21、男，60 岁。餐后突感上腹痛、大汗 1 小时。查体：腹肌紧张，压痛、反跳痛(+)，肝浊音界消失。此时应首选的检查是()

(A)立位腹平片

(B)血、尿淀粉酶

(C)腹部 B 超

(D)心电图

22、不属于预防性应用抗菌药物适应证的选项是（）

(A)人造物置留手术

(B)甲状腺腺瘤手术后

(C)结肠手术前准备

(D)开放性骨折

(E)大面积烧伤

23、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是（）

(A)骨髓炎

(B)气管炎

(C)结肠癌

(D)食管炎

(E)食管癌

24、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 $\mu$ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

25、迅速失血可导致休克，出血量至少超过全身总血量的比例是()

(A)20%

(B)30%

(C)40%

(D)50%

26、冠状动脉的起始部位是()

(A)左心室

(B)主动脉弓

(C)胸主动脉

(D)升主动脉

27、属于肾锥体的结构是()

(A)肾窦

(B)肾乳头

(C)肾小盏

(D)肾柱

28、下列与心指数直接相关的参数是【】

- (A) 体重
- (B) 年龄
- (C) 体表面积
- (D) 身高
- (E) 能量

29、不属于机体内环境的体液是（）

- (A)淋巴液
- (B)组织液
- (C)血浆
- (D)脑脊液
- (E)细胞内液

30、下列属于腺垂体激素的是【】

- (A) 生长激素
- (B) 甲状腺素
- (C) 缩宫素
- (D) 血管升压素
- (E) 生长抑素

31、无尿的定义是（）

- (A)24 小时尿量少于 100mL
- (B)12 小时尿量少于 200mL
- (C)24 小时尿量少于 500mL



(D)每小时尿量少于 50mL

(E)每小时尿量少于 17mL

32、女，80岁。头晕、心悸就诊。心电图如下。最可能的诊断是【】 (A) 窦性心动过缓

(B) 二度 I 型房室传导阻滞

(C) 三度房室传导阻滞

(D) 二度 II 型房室传导阻滞

(E) 窦房传导阻滞

33、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是 ( )

(A)右心衰竭

(B)下腔静脉阻塞

(C)门脉高压症

(D)左侧胸腔积液

(E)肝功能衰竭

34、凝血酶的主要作用是【】

(A) 加速因子 VIII 复合物的形成

(B) 使纤维蛋白原转变为纤维蛋白

(C) 加速凝血酶原复合物的形成

(D) 激活因子 III 和 XII

(E) 激活血小板第 3 因子

35、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为 ( )

(A)创伤制动、保证呼吸道通畅

(B)及早建立静脉通路

(C)早期给予鼻导管或面罩吸氧

(D)采取平卧位

(E)注意保暖

36、自主神经节前纤维释放的递质是 ( )

(A)多巴胺

(B)腺苷

(C)谷氨酸

(D)甘氨酸

(E)乙酰胆碱

37、开口于上鼻道的鼻旁窦是【】

(A)上颌窦

(B)额窦

(C)蝶窦

(D)筛窦后群

(E)筛窦前中群

38、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是 ( )

(A)尿道内口

(B)尿道外口

(C)尿道前列腺部

(D)尿道球部

(E)尿道膜部

39、女，32岁。查体：心界叩诊不大，心率72次/分，律齐，S1增强，可闻及开瓣音，心尖部闻及舒张期隆隆样杂音。最可能的诊断是()

(A)主动脉瓣狭窄

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596010154220010104>