

2024 年四川省蓬安县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库【真题汇编】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者女，7 岁，体重 23kg，查血清钠浓度为 152mmol / L，诊断为高渗性失水。相关资料：氯化钠注射液用于高渗性失水：所需补液总量（L）=[血钠浓度（mmol / L）- 142] / 血钠浓度（mmol / L）×0.6×体重（kg），第 1 日补给半量，余量在以后 2~3 日内补给，并根据心、肺、肾功能酌情调节。

A: 450ml

B: 350ml

C: 250ml

D: 150ml

答案：A

2. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

A: 氨基糖苷类

B: 多黏菌素 B

C: 红霉素

D: 氯霉素类

答案：A

3. 广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

A: 甲硝唑

- B: 吡嗪酮
- C: 三苯双脒
- D: 乙胺嘧啶

答案：C

4. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 前列腺素类药物
- B: 拟肾上腺素能药
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: 拟胆碱能药

答案：A

5. 长期服用雌激素可导致

- A: 阴道出血
- B: 高血压
- C: 体重下降
- D: 脱发

答案：A

6. 对高肾素型高血压病有特效的是

- A: 尼群地平
- B: 肼屈嗪
- C: 依那普利
- D: 卡托普利

答案：D

7. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 粪肠球菌
- B: 梭状芽孢杆菌
- C: 嗜酸乳杆菌
- D: 双歧杆菌

答案：B

8. 治疗慢性失血（如内痔出血）所致的贫血应选用

- A: 谷维素
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 硫酸亚铁

答案：D

9. 与双膦酸盐同时使用，有引起肾功能不全的报道，故禁止合用的非甾体类抗炎镇痛药是

- A: 高钙食品
- B: 沙利度胺
- C: 抗血管生成药
- D: 萘普生

答案：D

10. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是（）

- A: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射
- B: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射
- C: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射

D: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

答案：D

11. 氯磺丙脲的降糖作用机制是

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 防治遗传性血管神经性水肿

C: 能明显降低空腹血糖、胰岛素和 C 肽水平

D: 降低靶组织对胰岛素的敏感性

答案：A

12. 不属于氟喹诺酮类的药物是

A: 小檗碱

B: 环丙沙星

C: 依诺沙星

D: 莫西沙星

答案：A

13. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A: 二甲双胍

B: 磺酰脲类

C: A 和 B 均无效

D: 胰岛素

答案：B

14. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

A: 升高血糖

B: 提高蛋白质的分解代谢

C: 增高肝糖原

D: 增强钙离子的吸收

答案: D

15. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

A: 青霉素

B: 氯霉素

C: 四环素

D: 多西环素

答案: B

16. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: M 期

D: G

答案: D

17. 激动 α

A: 胍屈嗪

B: 哌唑嗪

C: 可乐定

D: 硝普钠

答案: C

18. 阻断白三烯受体，起效缓慢，作用较弱，仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是()

A: 氟替卡松

- B: 茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案：D

19. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 保钾利尿药
- B: 强效利尿药
- C: 碳酸酐酶抑制药
- D: 中效利尿药

答案：B

20. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

- A: 林旦霜
- B: 过氧苯甲酰
- C: 苯甲酸苄酯
- D: 硫黄软膏

答案：B

21. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

- A: 利奈唑胺
- B: 头孢他啶
- C: 罗红霉素
- D: 头孢曲松

答案：B

22. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

B: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平

C: 易引起直立性低血压

D: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

答案：C

23. 治疗轻度尿崩症可选用

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案：B

24. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是()。

A: 酚妥拉明

B: 普适泰

C: 度他雄胺

D: 特拉唑嗪

答案：C

25. 被还原后参与嘌呤和嘧啶形成的是()

A: 叶酸

B: 尿激酶

C: 重组人促红素

D: 链激酶

答案：A

26. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A: 灰黄霉素

- B: 咪康唑
- C: 克霉唑
- D: 制霉菌素

答案：D

27. (2018 年真题) 关于乙酰半胱氨酸的说法, 错误的是 ()

- A: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类、四环素类药物的抗菌活性
- B: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救
- C: 对痰液较多的患者, 乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效
- D: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键, 使浓痰易于咳出

答案：C

28. (2016 年真题) 患者, 男, 55 岁, 诊断为良性前列腺增生症, 服用非那雄胺片治疗, 最有可能发生与用药相关的不良反应是

- A: 性欲减退
- B: 心悸
- C: 体位性低血压
- D: 脱发

答案：A

29. (2019 年真题) 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

- A: 苄星青霉素
- B: 庆大霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：D

30. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

- A: 用药过量可导致出血并发症
- B: 对于不同的手术选择的疗程不同
- C: 用药期间需定期测定血红蛋白
- D: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

答案：D

31. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿米洛利
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：D

32. 下述药物中长期使用易产生耐受性的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: β
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: M 受体拮抗剂

答案：B

33. 与多柔比星合用或配伍可增加肝毒性的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 利福平
- D: β 受体阻断剂

答案：C

34. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 皮肤色素沉着
- B: 红斑
- C: 中枢神经毒性
- D: 眼周局部刺激

答案: C

35. 可用于治疗伤寒的药物是

- A: 氟喹诺酮类
- B: 四环素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 青霉素类

答案: A

36. 下列药物中，能促进食物消化的是()

- A: 乳酶生
- B: 兰索拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 雷尼替丁

答案: A

37. 大剂量碘剂

- A: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- D: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

答案: D

38. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 林可霉素
- B: 哌拉西林
- C: 氯霉素
- D: 庆大霉素

答案：B

39. 弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：A

40. 主要作用于 S 期的抗肿瘤药物是

- A: 长春碱类
- B: 烷化剂
- C: 抗癌抗生素
- D: 抗代谢药

答案：D

41. 中和胃酸的药物是()

- A: 哌仑西平
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 氢氧化铝

答案：D

42. 卡泊芬净属于()

- A: 棘白菌素类抗真菌药
- B: 丙烯胺类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 唑类抗真菌药

答案：A

43. 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性(感觉障碍、痉挛)的行为是()。

- A: 饮用热饮
- B: 接触塑料制品
- C: 冷水浴
- D: 日光浴

答案：C

44. 用于过敏性休克的是()

- A: 阿托品
- B: 肾上腺素
- C: 熊去氧胆酸
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

45. 左甲状腺素成人维持量是

- A: 75-125ug
- B: 125ug
- C: 55-75ug

D: 25-75ug

答案：A

46. 下列药物中属于缩瞳药的是

A: 氢溴酸后马托品

B: 硫酸阿托品

C: 毛果芸香碱

D: 托吡卡胺

答案：C

47. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

A: 利多卡因

B: 苯妥英钠

C: 普鲁卡因胺

D: 维拉帕米

答案：B

48. (2021 年真题) 作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是 ()

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液 (9AA)

C: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

D: 复方氨基酸注射液 (18AA)

答案：B

49. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

A: 拉氧头孢

B: 氨曲南

C: 头孢孟多

D: 头孢氨苄

答案：A

50. 青霉素()

A: 特别对铜绿假单胞菌有效

B: 对 G

C: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

D: 对 G

答案：D

51. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ()

A: 氟马西尼

B: 苯甲酸钠咖啡因

C: 纳洛酮

D: 阿托品

答案：D

52. (2017 年真题) 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是 ()

A: 拉氧头孢

B: 头孢吡肟

C: 头孢西丁

D: 氨曲南

答案：D

53. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

A: 短效口服避孕药

- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 长效避孕药

答案：C

54. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

- A: 胺碘酮
- B: 氯沙坦
- C: 硝普钠
- D: 哌唑嗪

答案：A

55. 大剂量具有抗雄激素作用,可用于子宫内膜癌或肾癌的药物是

- A: 环丙孕酮
- B: 地屈孕酮
- C: 甲羟孕酮
- D: 屈螺酮

答案：A

56. 下述药物用于治疗消化性溃疡时,不属于抑制胃酸分泌的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 泮托拉唑

答案：B

57. 患者,女性,63岁,诊断为支气管哮喘急性发作,使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 血常规
- B: 茶碱血药浓度
- C: 腹部 B 超
- D: 胸部 CT

答案：B

58. (2016 年真题) 组胺 H₂ 受体阻断的抑酸作用强度比较，正确的是

- A: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- B: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- C: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁
- D: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

答案：A

59. 阿糖胞苷属于

- A: 胸苷酸合成酶抑制剂
- B: 核苷酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 二氢叶酸还原酶抑制剂

答案：C

60. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 万古霉素

答案：D

61. 干扰转录过程和阻止 RNA 合成的药物是()

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 氟尿嘧啶
- C: 多柔比星
- D: 顺铂

答案：C

62. 作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 磺胺甲唑
- B: 利奈唑胺
- C: 呋喃妥因
- D: 甲氧苄啶

答案：A

63. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

- A: 孟鲁司特
- B: 茶碱
- C: 噻托溴铵
- D: 沙美特罗

答案：D

64. 硝酸酯类药物扩张血管是通过

- A: 产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高
- B: 直接作用于血管平滑肌
- C: 阻滞 Ca^{2+} 通道
- D: 促进前列环素的生成

答案：A

65. (2019 年真题) 因易导致新生儿溶血，妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是 ()

- A: 苄星青霉素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 庆大霉素

答案：C

66. 以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

- A: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- B: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- C: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐
- D: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

答案：D

67. 戊酸雌二醇属于

- A: 促性腺激素
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 雌激素类
- D: 短效口服避孕药

答案：C

68. 强心苷中毒引起的室性心律失常，治疗应首选的药物是

- A: 丙吡胺
- B: 普萘洛尔
- C: 普罗帕酮
- D: 苯妥英钠

答案：D

69. 可致色觉异常的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 卡托普利
- D: 硝酸甘油

答案：A

70. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加肾毒性
- C: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- D: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

答案：A

71. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

- A: 地高辛
- B: 毛花苷丙（西地兰 C）
- C: 洋地黄毒苷
- D: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

答案：C

72. 易引起过敏性休克的药物是()

- A: 链霉素
- B: 四环素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 青霉素

答案：D

73.（2018 年真题）能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是（）

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 鱼精蛋白
- C: 卡巴克络
- D: 甲苯氢醌

答案：A

74.（2019 年真题）患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是（）

- A: 硝普钠
- B: 美托洛尔
- C: 贝那普利
- D: 氨氯地平

答案：B

75. 治疗青光眼宜选用

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：B

76. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

- A: 可待因
- B: 喷托维林

C: 右美沙芬

D: 吗啡

答案: C

77. 华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 维生素 K1

B: 鱼精蛋白

C: 葡萄糖酸钙

D: 氨基己酸

答案: A

78. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

A: 非诺贝特

B: 依折麦布

C: 烟酸

D: 辛伐他汀

答案: A

79. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

A: 卡莫氟

B: 来曲唑

C: 羟喜树碱

D: 甲氨蝶呤

答案: C

80. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

- B: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 服药过程中适当补充维生素 B

答案：B

81. 易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

- A: 复方新诺明
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺多辛
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

82. 前列腺素类似物的不良反应不包括

- A: 角膜病变
- B: 眼睑水肿和红斑
- C: 虹膜颜色加深
- D: 眼部刺激症状

答案：A

83. 茶碱属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 白三烯调节剂
- D: 黄嘌呤类药物

答案：D

84. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A: 是广谱抗心律失常药

B: 在肝中代谢

C: 脂溶性高，口服、静脉注射均可

D: 主要经肾脏排泄

答案：D

85. 患者已经使用利尿剂治疗高血压，医生欲开始使用福辛普利，应该

A: 开始用福辛普利前停用利尿剂 5~7 日

B: 直接加用福辛普利即可

C: 直接换用福辛普利即可

D: 开始用福辛普利前停用利尿剂 2~3 日

答案：D

86. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

A: 毒性反应

B: 继发反应

C: 副作用

D: 变态反应

答案：A

87. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

A: 铜绿假单胞菌

B: 衣原体

C: 支原体

D: 立克次体

答案：A

88. 哮喘急性发作首选的治疗药物是()。

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 磷酸二酯酶抑制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/596040144220011030>