

医院急诊科 2021 年 10 月业务学习考试《专科理论知识、院感相关知识、临床护理技术操作常见并发症预防与处理、法律法规》

一、选择题:

1. 急救医疗服务体系的救援人员对无目击者的心脏停跳患者除颤前应 ()
 - A. 心前区叩击
 - B. 先行约 5 组 (约 2 分钟) 心肺复苏再行除颤(正确答案)
 - C. 不需要其他处理, 立即进行电除颤
 - D. 先给予静脉推注胺碘酮再除颤
2. 无脉性心脏停跳患者两次心跳检查之间应 ()
 - A. 先给予约 5 组 (或者约 2 分钟) 心肺复苏(正确答案)
 - B. 行 12 导心电图检查
 - C. 建立深静脉通道
 - D. 准备电除颤
3. 医护人员对于婴儿和儿童及有两个现场救助者的心肺复苏应当使用按压呼吸比为 ()
 - A. 15:2(正确答案)
 - B. 30:2
 - C. 15:1
 - D. 30:1
4. 有关急诊范围, 下列哪项是错误的? ()
 - A. 急性疾病
 - B. 发热病人 (体温大于 37 摄氏度) (正确答案)
 - C. 慢性疾病急性发作
 - D. 急性创伤
5. 急诊科主要工作制度, 下列何项不妥? ()

- A. 预检分诊
 - B. 首诊负责
 - C. 急诊留观
 - D. 护理管理(正确答案)
6. PaO₂ 是判断缺氧及缺氧程度的重要指标, 其正常值为 ()
- A. 95-100mmHg(正确答案)
 - B. 60-65mmHg
 - C. 100-105mmHg
 - D. 70-75mmHg
7. 中心静脉压是反映右心功能和血容量的重要指标。其正常值为 ()
- A. 1-7 cmH₂O
 - B. 5-12 cmH₂O(正确答案)
 - C. 12-19 cmH₂O
 - D. 19-26 cmH₂O
8. 张力性气胸急救首先是 ()
- A. 手术治疗
 - B. 抗生素治疗
 - C. 排气减压(正确答案)
 - D. 胸带固定
9. 静息状态下, 颅内压正常范围为 ()
- A. 130-260 mmH₂O
 - B. 140-400 mmH₂O
 - C. 170-300 mmH₂O
 - D. 70-200 mmH₂O(正确答案)
10. 有机磷农药中毒病人, 阿托品用至病人出现阿托品化, 即 ()
- A. 恶心、呕吐、头痛、多汗
 - B. 口干舌燥, 无汗, 肺部啰音消失, 意识清楚(正确答案)
 - C. 神志恍惚, 口唇干裂, 出现舌刺

D. 大汗，流涎，神志清楚，瞳孔轻度缩小

11. 怀疑一氧化碳中毒，常测定（）

A. 全血胆碱酯酶活力

B. 高铁血红蛋白

C. 碳氧血红蛋白(正确答案)

D. 血常规

12. 单纯脑震荡伤，按伤情分类属（）

A. 轻度颅脑损伤(正确答案)

B. 中度颅脑损伤

C. 重度颅脑损伤

D. 特重度颅脑损伤

13. 根据烧伤严重程度分类，烧伤总面积为 10%-29%或III度烧伤面积在 10%以下属
()

A. 重度烧伤

B. 特重烧伤

C. 中度烧伤(正确答案)

D. 轻度烧伤

14. 灾难急救中休克病人救护的首要环节是（）

A. 应用血管活性药物

B. 应用纠酸药物

C. 消除病因，补充血容量(正确答案)

D. 应用肾上腺皮质激素

15. 电击病人的现场救护，需立即（）

A. 注意保温

B. 脱离电源(正确答案)

C. 包扎伤口

D. 进行心肺复苏

16. 烧伤休克期护理的首要措施是（）

- A. 病情观察
 - B. 恢复有效循环血量(正确答案)
 - C. 书写护理记录
 - D. 做好创面保护和消毒隔离
17. 烧伤感染期特殊护理的首要措施是 ()
- A. 高热和低体温的护理(正确答案)
 - B. 心率的观察
 - C. 观察呼吸变化
 - D. 消化道护理
18. 心电监护仪的应用目的, 下列何项不妥 ()
- A. 观察动态心电图
 - B. 指导抗心律失常的治疗
 - C. 消除心室颤动(正确答案)
 - D. 发现致命性心律失常
19. 处理多发伤活动性出血, 最有效的紧急止血法是 ()
- A. 包扎
 - B. 止血药
 - C. 加压包扎(正确答案)
 - D. 输液
20. 心肺脑复苏过程中, 首选给药途径为 ()
- A. 静脉(正确答案)
 - B. 气管
 - C. 心内
 - D. 肌注
21. 那种情况为毛细血管出血 ()
- A. 点、片状渗出, 色暗红
 - B. 点、片状渗出, 色鲜红(正确答案)
 - C. 缓慢流出, 色暗红

D. 缓慢流出，色鲜红

22. 高血压危象治疗时，快速降压首选药物为（）

A. 硝普钠(正确答案)

B. 降压嗪

C. 利血平

D. 肼苯达嗪

23. 用生理盐水清除眼内毒物时间不少于（）

A. 2 分钟

B. 3 分钟

C. 4 分钟

D. 10 分钟(正确答案)

24. 敌百虫中毒禁用的洗胃液是（）

A. 牛奶

B. 清水

C. 等渗盐水

D. 碱性溶液(正确答案)

25. 关于除颤叙述错误的是（）

A. 除颤前应详细检查器械和设备，做好一切抢救准备

B. 电极板位置要准确

C. 电击时任何人不能接触患者或床

D. 电击后可能出现红斑，1 天后可自行消失(正确答案)

26. 气道内分泌物的吸引不正确的是（）

A. 进行上下抽吸(正确答案)

B. 每次抽吸时间不超过 15 秒

C. 两次抽吸时间间隔在 3 分钟以上

D. 抽吸频率根据分泌量而定

27. 多器官功能障碍患者，第一个受累的器官常为（）

A. 心

B. 肺(正确答案)

C. 肾

D. 肝

E. 脑

28. 活性炭属于 ()

A. 吸附剂(正确答案)

B. 保护剂

C. 溶解剂

D. 中和剂

29. 抢救口服有机磷杀虫药中毒成功的关键是 ()

A. 休克纠正是否及时

B. 阿托品剂量大小

C. 胆碱酯酶复能剂剂量大小

D. 洗胃是否彻底(正确答案)

30. 成人双人心肺复苏时，胸外心脏按压与人工呼吸比为 ()

A. 15:1

B. 15:2

C. 5:1

D. 30:2(正确答案)

31. 休克患者适宜的卧位是 ()

A. 平卧位

B. 头和腿部各抬高 30° (正确答案)

C. 头低足高位

D. 下肢抬高

32. 超高热是指体温超过 ()

A. 38.5℃

B. 39℃

C. 40℃

D. 41℃ (正确答案)

E. 42℃

33. 多器官功能障碍患者，恢复性最小、可逆性最差的器官为 ()

A. 心

B. 肺

C. 肾

D. 脑 (正确答案)

34. 判断有机磷杀虫药中毒程度最可靠的指标是 ()

A. 临床症状

B. 临床体征

C. 血清胆碱酯酶活力 (正确答案)

D. 血氨测定

35. 下列哪项不是洋地黄中毒的表现 ()

A. 恶心呕吐

B. 头痛头晕

C. 视力模糊

D. 尿量增加 (正确答案)

36. MODS 出现心衰时，病人口服地高辛之前应测量 ()

A. 体温

B. 脉搏 (正确答案)

C. 呼吸

D. 血压

37. 关于急性肺水肿的护理措施，哪一项是错误的 ()

A. 氧气吸入，流量为 6L/min

B. 立即平卧，头偏向一侧 (正确答案)

C. 50%酒精加入氧气湿化瓶中

D. 皮下注射吗啡

38. 急性肺水肿时吸入乙醇湿化氧的目的是 ()

- A. 兴奋呼吸中枢
 - B. 解除支气管平滑肌痉挛
 - C. 降低肺泡内泡沫的表面张力(正确答案)
 - D. 促使毛细血管扩张而减轻心脏负荷
39. 急性有机磷中毒后出现最早的症状是 ()
- A. 烟碱样症状
 - B. 毒蕈碱样症状(正确答案)
 - C. 头痛、头晕
 - D. 共济失调
40. 治疗休克的首要措施是 ()
- A. 吸氧
 - B. 补充血容量(正确答案)
 - C. 抗休克药物
 - D. 监护
41. 能使瞳孔缩小的毒物是 ()
- A. 阿托品
 - B. 颠茄
 - C. 麻黄碱
 - D. 有机磷杀虫药类(正确答案)
42. 中暑降温时冰袋禁放于 ()
- A. 心前区
 - B. 腹部
 - C. 足底
 - D. 以上都是(正确答案)
43. 现场救护局部伤口处理正确的是 ()
- A. 无菌纱布覆盖(正确答案)
 - B. 内脏、组织等纳回
 - C. 清除伤口异物

D. 清除血凝块

44. 冠心病猝死的最常见原因为 ()

A. 室颤(正确答案)

B. 房颤

C. 酸碱平衡失调

D. 房室传导阻滞

45. 糖尿病酮症酸中毒特征性表现为 ()

A. 呼吸加速

B. 二氧化碳结合力下降

C. 皮肤粘膜呈樱桃红色

D. 呼吸带有烂苹果味(正确答案)

46. 休克早期病人主要表现为 ()

A. 脉细速 血压下降 脉压明显缩小

B. 脉微弱 尿量减少 血压测不清

C. 脉细速 血压正常 脉压无变化 尿量减少

D. 脉细速 血压变化不大 脉压变小 尿量减少(正确答案)

47. 下列反映右心功能的指标是 ()

A. 中心静脉压(正确答案)

B. 肺动脉楔压

C. 心排血量

D. 心脏指数

48. 关于心肺复苏成功的有效指征叙述错误的是 ()

A. 能摸到大动脉搏动

B. 面色、口唇、甲床及皮肤色泽转红润

C. 缩小的瞳孔散大(正确答案)

D. 意识逐渐恢复

49. 有关糖尿病的饮食治疗错误的是 ()

A. 向病人解释饮食治疗的重要性

- B. 病人感到饥饿时，应增加饭量(正确答案)
- C. 按医生规定的食谱进食
- D. 不得随便吃甜食
50. 张力性气胸急救首先是 ()
- A. 手术治疗
- B. 抗生素治疗
- C. 排气减压(正确答案)
- D. 胸带固定
51. 电击病人的现场救护，需立即 ()
- A. 注意保温
- B. 脱离电源(正确答案)
- C. 包扎伤口
- D. 进行心肺复苏
52. 中暑高热多见于 ()
- A. 健康青壮年(正确答案)
- B. 老年人
- C. 未能适应高温者
- D. 儿童
- E. 重危患者
53. 多根多处肋骨骨折合并开放性气胸，首先应采取的抢救措施是 ()
- A. 吸氧、输血
- B. 胸壁牵引固定
- C. 闭合伤口(正确答案)
- D. 辅助正压呼吸
54. 诊断颅内压增高的主要依据是 ()
- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 复视

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596052144120010045>