

2024 湖北省樊城区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题完整版及答案【夺冠系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

- A: 依那西普
- B: 萘普生
- C: 糖皮质激素
- D: 司来吉兰

答案：D

2. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 奥利司他
- C: 鲑降钙素
- D: 阿法骨化醇

答案：C

3. 有关维生素 K 的描述，错误的是

- A: 参与凝血因子的合成
- B: 天然维生素 K 为脂溶性
- C: 维生素 K
- D: 对于应用链激酶所致出血有特效

答案：D

4. 下列关于低镁血症的描述，错误的是

- A: 抗菌药物可增加镁的排泄
- B: 质子泵抑制剂可使镁的排泄减少
- C: 质子泵抑制剂可使镁的排泄增加
- D: 长期应用胰岛素，可引起镁向细胞内转移而导致低镁血症

答案：B

5. 可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 恩替卡韦
- B: 阿昔洛韦
- C: 更昔洛韦
- D: 金刚烷胺

答案：C

6. 属于多巴胺 D₂ 受体阻断剂的是

- A: 奥美拉唑
- B: 氯苯那敏
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：D

7. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 瑞格列奈
- B: 二甲双胍
- C: 利拉鲁肽
- D: 吡格列酮

答案：D

8. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药物是

- A: 甲氧苄啶
- B: 呋喃唑酮
- C: 氧氟沙星
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

9. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

- A: 硝普钠
- B: 地高辛
- C: 氨力农
- D: 多巴酚丁胺

答案：A

10. 磺酰脲类促胰岛素分泌药存在“继发失效”的问题，应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年，患者发生继发性失效的发生率是

- A: 50%~60%
- B: 1%~5%
- C: 5%~15%
- D: 30%~40%

答案：D

11. 静脉注射人工合成的 ACTH，在循环中的半衰期是

- A: 4 小时
- B: 8 小时

C: 7~12 分钟

D: 10~25 分钟

答案: D

12. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()

A: 肝内代谢转化快

B: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

C: 肾脏排泄速度快

D: 口服后吸收不完全

答案: B

13. (2019 年真题) 选择性沉积在牙齿和骨骼中, 不可用于 8 岁以下患儿的药物是()

A: 氨基糖苷类

B: 氟喹诺酮类

C: 四环素类

D: 大环内酯类

答案: C

14. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

A: 阿托伐他汀

B: 依折麦布

C: 阿昔莫司

D: 非诺贝特

答案: B

15. 大剂量使用维生素 K

A: 维生素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 肝素

C: 氨基苯酸

D: 双香豆素

答案：B

16. 属于第二代头孢菌素口服制剂的是()。

A: 头孢克洛

B: 头孢吡肟

C: 头孢克肟

D: 头孢拉定

答案：A

17. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

A: 留钾利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: 噻嗪类利尿剂

D: 人促红素

答案：C

18. 与卡比马唑合用应谨慎的是

A: 放射性碘

B: 糖皮质激素

C: 甲状腺素

D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

19. (2021 年真题) 患者，男，46 岁。新诊断为高血压，最高血压 155/95mmHg，心率 100 次/分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 氯沙坦

答案：B

20. 右美沙芬与吗氯贝胺合用会出现

- A: 精神症状
- B: 反射亢进，异常发热、昏睡
- C: 支气管平滑肌痉挛
- D: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

答案：B

21. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 口干、皮肤干燥
- B: 肝功能损害
- C: 再生障碍性贫血
- D: 抑制呼吸

答案：B

22. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 西咪替丁
- C: 长春新碱
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

23. 属于 I A 类抗心律失常药

- A: 胺碘酮
- B: 利多卡因
- C: 普萘洛尔
- D: 奎尼丁

答案：D

24. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 卡莫氟
- B: 来曲唑
- C: 甲氨蝶呤
- D: 喜树碱

答案：D

25. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 减少房水生成
- B: 收防止激光手术后的反应性眼压升高
- C: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- D: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳

答案：A

26. 替罗非班的作用机制是

- A: 拮抗维生素 K
- B: 抑制凝血酶
- C: 抑制凝血因子 X
- D: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

答案：D

27. 右旋体是产生神经毒性的主要根源，故开发其左旋体，用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

- A: 替硝唑
- B: 奥硝唑
- C: 多黏菌素
- D: 甲硝唑

答案：B

28. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素
- B: 叶酸
- C: 维生素 B
- D: 维生素 A

答案：B

29. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

- A: 维生素 C
- B: 精氨酸
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 AD

答案：C

30. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物

- A: 胺碘酮
- B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 地高辛

答案: B

31. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 氨苯蝶啶

C: 氢氯噻嗪

D: 托拉塞米

答案: D

32. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

A: 硝苯地平

B: 氨氯地平

C: 尼莫地平

D: 维拉帕米

答案: C

33. 能选择性地兴奋子宫平滑肌，使其产生节律性收缩，并软化和扩张子宫颈，促使宫口开全和胎儿娩出，临床用于中期引产、足月妊娠引产及治疗性流产的药物是

A: 缩宫素

B: 地诺前列酮

C: 麦角新碱

D: 普拉睾酮

答案: B

34. 干扰核酸生物合成的药物是()

- A: 多柔比星
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 高三尖杉酯碱

答案: C

35. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

- A: 氟维司群
- B: 他莫昔芬
- C: 依西美坦
- D: 来曲唑

答案: C

36. 下列不属于硝基呋喃类抗菌药物的不良反应是()

- A: 头痛
- B: 腹泻
- C: 呕吐、食欲减退
- D: 发热

答案: D

37. 外用无效，口服治疗体癣，毛发癣的药物是

- A: 克霉唑
- B: 咪康唑
- C: 制霉菌素

D: 灰黄霉素

答案: D

38. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 紫杉醇

C: 顺铂

D: 来曲唑

答案: D

39. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高

B: 抑制磷酸二酯酶

C: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张

D: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

答案: A

40. 属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 萘啶酸

C: 诺氟沙星

D: 莫西沙星

答案: C

41. 原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血可选用

A: 尿激酶

B: 氨甲环酸

C: 维生素 K

D: 低分子肝素

答案：B

42. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

A: 顺铂

B: 高三尖杉酯碱

C: 氟尿嘧啶

D: 多柔比星

答案：B

43. 小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

A: 维生素 B12

B: 烟酸

C: 维生素 B6

D: 叶酸

答案：D

44. 可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

A: 维生素 B

B: 烟酸

C: 泛酸钙

D: 叶酸

答案：D

45. 维生素 C 的主要适应证是

A: 防治坏血病

B: 治疗厌食症

C: 治疗脂溢性皮炎

D: 治疗佝偻病

答案：A

46. 毛果芸香碱的作用特点不包括

A: 收缩睫状肌，使小梁网眼张开

B: 缩小瞳孔，拉紧虹膜

C: 开放前房角降低眼压

D: 减少房水生成

答案：D

47. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

A: 烟酸

B: 洛伐他汀

C: 阿昔莫司

D: 非诺贝特

答案：B

48. 属于多烯类的是

A: 卡泊芬净

B: 制霉菌素

C: 氟胞嘧啶

D: 特比萘芬

答案：B

49. 口服吸收少，用于肠道感染的是

A: 甲氧苄啶

B: 呋喃唑酮

C: 氧氟沙星

D: 磺胺嘧啶

答案: B

50. 新生儿服用可发生低凝血酶原血症及出血的药物是

A: 唑吡坦

B: 地西洋

C: 卡马西平

D: 苯巴比妥

答案: D

51. 四环素联用麦角生物碱

A: 调整抗凝血药的剂量

B: 口服吸收减少

C: 肝毒性增加

D: 增加麦角中毒的风险

答案: D

52. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案: D

53. 用于抗结核杆菌的药物是

A: 妥布霉素

B: 新霉素

C: 庆大霉素

D: 异烟肼

答案: D

54. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A: 普萘洛尔

B: 胺碘酮

C: 地尔硫革

D: 美西律

答案: A

55. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

A: 只给碘化物

B: 只给硫脲类

C: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类

D: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物

答案: D

56. 属于 M 受体阻断剂的药物是

A: 布林佐胺

B: 拉坦前列素

C: 奥布卡因

D: 阿托品

答案: D

57. (2021 年真题) 常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是()

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 吡格列酮
- B: 沙格列汀
- C: 达格列净
- D: 二甲双胍

答案：C

58. 与呋喃妥因特性不符的叙述是

- A: 有广谱抗菌活性
- B: 主要用于泌尿系感染
- C: 口服吸收差
- D: 细菌易对其产生耐药性

答案：D

59. β -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

- A: 叶酸
- B: 链激酶
- C: 重组人促红素
- D: 尿激酶

答案：B

60. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 谷丙胺
- D: 法莫替丁

答案：A

61. 睾酮替代治疗的给药方式不包括

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 注射给药
- B: 直肠给药
- C: 透皮给药
- D: 肠道外给药

答案：B

62. 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 磺胺甲恶唑
- B: 头孢呋辛
- C: 左氧氟沙星
- D: 克林霉素

答案：A

63. 易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺多辛
- C: 甲氧苄啶
- D: 复方新诺明

答案：A

64. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

- A: 文拉法辛
- B: 吗氯贝胺
- C: 氟西汀
- D: 阿米替林

答案：C

65. 患者易于配合，多用于重症患者和儿童的是

- A: 口服制剂
- B: 气雾剂
- C: 雾化吸入溶液
- D: 干粉吸入方法

答案：C

66. 属于雌激素类的是

- A: 他莫昔芬
- B: 睾酮
- C: 己烯雌酚
- D: 甲地孕酮

答案：C

67. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

- A: 多潘立酮
- B: 氯苯那敏
- C: 奥美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：D

68. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

- A: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药
- B: 于月经后半周期(撤药性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期
- C: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日
- D: 一日 30mg，连服 6 个月

答案：A

69. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水
- B: 服药过程中适当补充维生素 B
- C: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：A

70. 属于血小板糖蛋白 GP II b / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 替格瑞洛
- D: 替罗非班

答案：D

71. 选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬
- C: 福尔可定
- D: 苯丙哌林

答案：A

72. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 四环素
- B: 曲伏前列素

C: 9%硼酸冰片滴耳液

D: 1%碘甘油

答案：B

73. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 红霉素

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 克林霉素

答案：D

74. 易导致牙齿黄染的药品是

A: 头孢哌酮

B: 加替沙星

C: 多西环素

D: 庆大霉素

答案：C

75. 患者男,8岁,静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿,考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制,该患者发生的过敏反应在分型上属于()

A: III型变态反应

B: I型变态反应

C: IV型变态反应

D: II型变态反应

答案：B

76. (2018 年真题) 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是 ()

- A: 低分子肝素
- B: 华法林
- C: 肝素钠
- D: 达比加群酯

答案: D

77. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 吉西他滨

答案: B

78. (2016 年真题) 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是

- A: 美司钠
- B: 亚叶酸钙
- C: 二巯基丙醇
- D: 右雷佐生

答案: A

79. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 液状石蜡
- B: 酚酞
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案: D

80. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 双歧杆菌
- B: 嗜酸乳杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 梭状芽孢杆菌

答案：D

81. (2016 年真题) 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应 ()

- A: 急性肾衰竭
- B: 肺部纹理加重
- C: 急性肝衰竭
- D: 胰腺坏死

答案：A

82. 替比夫定的作用靶点是

- A: 脱氧核糖核酸聚合酶
- B: HIV-1 反转录酶
- C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- D: 神经氨酸酶

答案：A

83. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是 ()

- A: 阻断 H
- B: 阻断 CTZ 的 D

C: 抗幽门螺杆菌

D: 抑制胃壁细胞的 H

答案: D

84. 青霉素常见的不良反应

A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

B: 锥体外系反应

C: 细胞缺氧、酸中毒、休克

D: 过敏反应

答案: D

85. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

A: 羧甲司坦

B: 氨溴索

C: 溴己新

D: 乙酰半胱氨酸

答案: D

86. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 胺碘酮

B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 苯妥英钠

答案: D

87. 对环氧化酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 对乙酰氨基酚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/596140025054011030>