

护士考试试题

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1 使之保持无菌状态的技术)。

2、患者仰卧的时间过久，最轻易发生 压疮的部位是(骶尾部 。

3、静脉输液调整输液速度时，一般成人~60)滴/分钟，小朋友(20~滴/分钟。

4、铺好的无菌盘有效期为(4)小时。

5、除颤器电极板上“A”代表(心尖部)，其位置放置于左乳外侧，其中心在

左腋中线；”S”代表(心底部)，其位置放置于胸骨右缘 2—4 肋间。徒手打开气道

的措施有(仰头抬颏法)和(托颌法)。

6、王老师右侧肢体瘫痪，来医院就诊，护士为其测量血压为 180/100mmHg，

护士在测量血压时应选择患者的(左侧)肢体。如测量王老师的下肢血压，则应

比上肢高(20—40mmHg)。

7、常见的输液反应有：(发热反应)、(急性肺水肿)、(静脉炎)和(空气

栓塞)。

8、注射部位应当避开（炎症）、（硬结）、（瘢痕）等部位。

9、使用干燥无菌持物钳时，应每（4）小时更换一次。

10、护理操作前后（洗手）可防止病原菌通过操作者的手传播，以到达保

护患者和护士自身的目的。

二、选择题（每空1分，共20分,请将对的答案的标号填入括号内）

1、输液后引起静脉炎的原因是（C）

A、输入致热物质 B、输入致敏物质 C、输入药液浓度过高

D、输入药液量大，速度过快 E、输液滴管中空气未排尽

2、慢阻肺病人痰液黏稠，多饮水是为了（E）

A、补充出汗等所丢失的水分 B、防止尿酸性肾病

C、减少出血性膀胱炎并发症 D、加速细菌、毒素及炎性分泌物排出 E、增

进痰液稀释而轻易排出

3、除下列哪项外都是护士必须具有的素质：（D）

A、反应敏捷 B、关怀体贴 C、勇于实践

D、情绪一直快乐 E、遇烦心事要忍耐

4、护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是：（C）

A、健康教育 B、卫生指导 C、预检分诊

D、查阅病案 E、心理安慰

5、应付压力引起的情感变化首先是：（ B ）

A、自我评估压力来源 B、精神发泄，以示防卫

C、承认事实，自我放松 D、听天由命，顺其自然

E、与亲人交谈，获得支持

6、护理诊断公式中的P代表：（ A ）

A、病人的健康问题 B、病人的现实状况 C、症状与体征

D、病人的既往史 E、病人健康问题发生的原因

7、构成护理程序框架的理论是：（ B ）

A、人的基本需要论 B、系统论 C、措施论

D、信息交流论 E、处理问题论

8、患者刚出院，对病床单元的处理下列哪项不妥：（ E ）

A、撤下被服送洗 B、床垫、棉胎置于日光下曝晒 6h

C、痰杯、便盆浸泡于消毒液中 D、病床单元用消毒液擦拭 E、立即铺好暂

空床

9、对一位需住院的心力衰竭病人，住院处的护理人员首先应：（ C ）

A、卫生处置 B、简介医院的规章制度

C、立即护送病人入病区 D、告知医生做术前准备

E、理解病人有何护理问题

10、颈椎骨折进行颅骨牵引时，采用何种卧位：（ D ）

A、端坐位 B、半坐卧位 C、头低足高位

D、头高足低位 E、俯卧位

11、颅内手术后，头部翻转过剧可引起：（ A ）

A、脑疝 B、休克 C、脑出血

D、脑栓塞 E、脑干损伤

12、铺无菌盘时哪项是错误的：（ D ）

A、用无菌持物钳夹取治疗巾 B、注意使治疗巾边缘对齐

C、治疗巾开口部分及两侧反折 D、有效期不超过 6h E、防止潮湿和暴露过

久

13、穿脱隔离衣时要防止污染的部位是：（ C ）

A、腰带如下 B、腰带 C、领子

D、袖子背面 E、胸前、背后

14、使用化学消毒剂的注意事项中，下列哪一项是错误的：（ E ）

A、严格掌握药物的有效时间和浓度 B、浸泡前要打开器械的轴节

C、物品应所有浸没在消毒液中 D、消毒液容器要盖严 E、使用前用 3% 盐

水冲净，以免药液刺激组织

15、昏迷病人口腔护理时不须准备：（ D ）

A、石蜡油 B、压舌板 C、弯血管钳

D、吸水管 E、治疗碗

16、描述炎性浸润期褥疮，下列哪项不对的：（ E ）

A、皮肤呈紫色 B、皮下硬结 C、有大、小水疱

D、水疱表皮剥脱，露出湿润的创面 E、创面上有浓性分泌物

17、有关静脉注射，如下哪项描述是错误的：（ A ）

A、长期给药，应由近心端到远心端选择血管

B、根据病情，掌握注药的速度

C、防止刺激性强的药液溢出血管外

D、不可在静脉瓣处进针

E、不要在一种部位反复穿刺

18、酒精擦浴时，禁擦的部位是：（ C ）

A、侧颈、上肢 B、腋窝、腹股沟 C、前胸、腹部

D、臀部、下肢 E、手掌、脚心

19、扁桃体手术后防止出血的最佳措施是：（ B ）

A、病人取半坐位 B、颈部用冰囊 C、应用止血药

D、嘱病人喝温开水 E、头部置冰槽内

20、在对高热病人的护理中，下列护理措施哪项不妥：（ D ）

A、卧床休息 B、测体温每 4h1 次 C、鼓励多饮水

D、冰袋放入头顶，足底处 E、每日口腔护理 2-3 次

21、测血压时袖带缠得过紧可使：（ A ）

A、血压偏低 B、脉压加大 C、收缩压偏高

D、舒张压偏高 E、舒张压偏低

22、代谢性酸中毒患者的呼吸体现为：（ D ）

A、吸气性呼吸困难 B、呼气性呼吸困难 C、呼吸间断

D、呼吸深大而规则 E、呼吸浅表而不规则

23、在鼻饲插管过程中病人出现呛咳、应采取的措施是：（ E ）

A、嘱病人深呼吸 B、嘱病人做吞咽动作 C、托起病人的头部插管

D、用注射器抽吸胃液 E、拔出胃管休息半晌后再插管

24、为病人保暖解痉最简便的措施是：（ A ）

A、热水袋 B、热坐浴 C、热湿敷

D、温水浴 E、红外线照射

25、大便隐血试验前，饮食中可选择：（ D ）

A、肉类 B、肝类 C、动物血

D、豆制品、冬瓜 E、绿色蔬菜

26、热坐浴的禁忌证是：（ E ）

A、肛门部充血 B、外阴部炎症 C、痔疮手术后

D、肛门周围感染 E、妊娠后期痔疮疼痛

27、为两岁以下婴幼儿肌肉注射，不恰当的是：（ A ）

A、宜选肌肉肥厚的臀大肌 B、注射时应固定好肢体，以防折针

C、切勿把针梗全部刺入 D、注意更换注射部位 E、注意药物的配伍禁忌

28、肝昏迷病人灌肠时禁用肥皂水是由于：（ C ）

A、肥皂水易引起腹胀 B、肥皂水易导致肠穿孔

C、可以减少氨的产生和吸取 D、可以防止发生水肿 E、可以防止发生酸中

毒

29、在无菌技术操作中，启封的无菌溶液在未被污染的状况下限用（ D）

A、2小时 B、4小时 C、12小时

D、24小时 E、36小时

30、一患者吸氧的流量为4L/min，其吸氧的浓度是（ B ）

A、40% B、37% C、33%

D、27% E、25%

31、静脉输液时，下列哪项不是液体检查的内容（D）

A、液体的名称 B、浓度和剂量 C、生产日期和有效期

D、开瓶时间 E、液体的质量

32、进行下述哪项检查时，不必告知患者空腹采集血标本（B）

A、抽血检查甘油三酯 B、抽血做交叉配血试验

C、检查血糖 D、检查二氧化碳结合力 E、检查肝功能

33、输液速度过快导致急性肺水肿的特性性症状是（D）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596212020013010113>