

2024 年广东省江海区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试附参考答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A：如原方案中已应用左氧氟沙星，重复应用时剂量加倍

B：如原方案中已应用甲硝唑，且日剂量达到 1600mg/d，重复应用时剂量加倍

C：应重复原方案治疗 2 周

D：如原方案中已应用克拉霉素，应避免再次使用

答案：D

2. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：A

3. 代表乙型肝炎病毒核心抗体的是

- A: HBeAb
- B: HBeAg
- C: HBcAb
- D: HBsAb

答案：C

4. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是()

- A: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液
- B: 青霉素与 5%葡萄糖注射液
- C: 头孢曲松与复方氯化钠注射液
- D: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液

答案：C

5. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

- A: 2 周
- B: 3 天
- C: 5 天
- D: 1 周

答案：A

6. 消化不良患者宜选用

- A: 乳果糖
- B: 小檗碱
- C: 阿苯达唑
- D: 干酵母

答案：D

7. 患者，男，71 岁，因高血压、心力衰竭给予氢氯噻嗪、地高辛等治疗，产生的药物相互作用属于()

- A: 增加靶器官药物浓度，药品不良反应减少
- B: 敏感化作用，药品不良反应增加
- C: 降低抗药性，疗效增加
- D: 拮抗作用，药品不良反应增加

答案：B

8. 应急能力较差，较敏感，极易产生药品不良反应，是指

- A: 严格掌握适应证
- B: 明确诊断
- C: 密切监护
- D: 严格掌握用药剂量

答案：C

9. 胰岛素制剂适宜

- A: 干燥、压缩成包贮存的药品
- B: 不宜冷冻的药品
- C: 置阴凉干燥、阳光不易直射到的地方的药品
- D: 与其他药品分库贮存的药品

答案：B

10. 心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

- A: 氢氯噻嗪
- B: 维拉帕米
- C: 美托洛尔
- D: 依那普利

答案：B

11. 《中国药典》2015 年版分为几部

- A: 三部
- B: 二部
- C: 一部
- D: 四部

答案：D

12. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 替普瑞酮
- C: 奥美拉唑
- D: 多潘立酮

答案：C

13. 药历是开展个体化药物治疗的重要依据。药历书写的基本要求是

- A: 科学、易懂
- B: 客观、完整
- C: 客观、真实
- D: 完整、真实

答案：C

14. 杨某，女，19 岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温 39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。该患者对青霉素过敏。

- A: 青霉素 G
- B: 利福霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 链霉素

答案：C

15. 用于癌性胸水

- A: 腔内注射
- B: 静脉注射
- C: 动脉注药
- D: 肌肉注射

答案：A

16. 乳汁中药物的浓度与下列哪种因素无关

- A: 脂溶性
- B: 药物剂型
- C: 母体中的药物浓度
- D: 药物与母体血浆蛋白结合率

答案：B

17. 热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

- A: 热衰竭
- B: 热射病
- C: 热痉挛
- D: 休克

答案：A

18. 通过抑制磷酸二酯酶，升高 cAMP 水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

- A: 地高辛
- B: 洋地黄毒苷
- C: 卡维地洛
- D: 米力农

答案：D

19. 适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

- A: 单纯雌激素补充治疗
- B: 单纯孕激素补充治疗
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 雌孕激素连续联合用药

答案：D

20. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 乳酶生片
- C: 硫普罗宁片
- D: 西地碘片

答案：A

21. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 泼尼松
- B: 痰液稀释剂
- C: 吗啡
- D: 氨茶碱

答案：D

22. 治疗水疱型脚癣宜选用()

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 阿昔洛韦软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 维 A 酸乳膏

答案：A

23. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 普萘洛尔
- B: 地高辛

C: 利多卡因

D: 硝酸酯类

答案: D

24. 儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

A: 3.3~5.5mmol/L

B: 4.2~6.5mmol/L

C: 3.9~6.1mmol/L

D: 3.3~5.0mmol/L

答案: A

25. 阿司匹林

A: 血红蛋白量增多

B: 中性粒细胞减少

C: 血小板减少

D: 嗜酸性粒细胞减少

答案: C

26. 属于容积性泻药的是

A: 乳果糖

B: 番泻叶

C: 硫酸镁

D: 开塞露

答案: C

27. 不属于处方前记内容的是()。

A: 医疗、预防、保健机构名称

B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

C: 患者姓名、性别、年龄

D: 门诊或住院病历号、日期

答案: B

28. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

A: 温度

B: 空气

C: 湿度

D: 日光

答案: D

29. “加至”的外文缩写为()。

A: Add

B: Ad

C: gtt

D: qod

答案: A

30. 2 级高血压是指

A: 收缩压 160~179mmHg 和（或）舒张压 100~109mmHg

B: 收缩压 $\geq$ 180mmHg 和（或）舒张压 $\geq$ 110mmHg

C: 收缩压 $<$ 120mmHg 和舒张压 $<$ 80mmHg

D: 收缩压 140~159mmHg 和（或）舒张压 90~99mmHg

答案: A

31. 患者，女，26 岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶 450mg / d 治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

A: 红细胞

B: 嗜酸粒细胞

C: 白细胞

D: 血红蛋白

答案: C

32. 患者女，53 岁，上腹痛、腹泻、消瘦 1 年。大便常规有大量脂肪球，X 线腹平片显示上腹中部多发钙化点。对其宜选用的药品是

A: 硫糖铝

B: 胰酶

C: 乳酶生

D: 酵母

答案: B

33. 在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

A: 华法林

B: 噻氯匹定

C: 肝素

D: 尿激酶

答案: A

34. 体操运动员使用后，可减慢心率、减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

A: 阿替洛尔

B: 依那普利

C: 利血平

D: 氢氯噻嗪

答案: A

35. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 $50 \mu\text{mol} / \text{L}$ (正常参考范围 $45 \sim 84 \mu\text{mol} / \text{L}$)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：A

36. 口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药，较为有效的用药时间是症状出现的

- A: 48 小时内
- B: 72 小时内
- C: 96 小时内
- D: 108 小时内

答案：A

37. 用于氰化物中毒解救的药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 毛果芸香碱
- C: 碘解磷定
- D: 阿托品

答案：A

38. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- B: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- C: 每 3-5 天调整 1 次
- D: 每次调整 1-4 单位

答案: A

39. 粪外观所对应的疾病, 上消化道出血(>50ml)

- A: 米泔水样
- B: 暗红果酱色
- C: 白陶土便
- D: 柏油便, 黑色有光泽

答案: D

40. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 有利诊断特殊疾患
- B: 有助个体化给药
- C: 列为行政决策的依据
- D: 改变降脂治疗观念

答案: C

41. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

- A: 750 μ /ml
- B: 100 μ g / ml

C: 500 μ g/ml

D: 250 μ g/ml

答案：C

42. 高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 缬沙坦

C: 美托洛尔

D: 非洛地平

答案：B

43. 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

A: 拮抗作用

B: 协同作用

C: 敏感化作用

D: 减少不良反应

答案：A

44. 门诊处方药品用量一般不宜超过

A: 7 日用量

B: 3 日用量

C: 1 日用量

D: 15 日用量

答案：A

45. 糖皮质激素所致的骨质疏松治疗

A: 单独用双膦酸盐

B: 长期口服维生素 D

C: 用甲状旁腺激素

D: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

答案: D

46. 能抑制性腺，造成男性不育和女性闭经的抗风湿药物是

A: 青藤碱

B: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂

C: 白芍总苷

D: 雷公藤多苷

答案: D

47. 驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 阿司匹林?

B: 阿莫西林?

C: 氯苯那敏?

D: 维生素 C?

答案: C

48. 躯干部出现鞭打状色素沉着

A: 氟尿嘧啶

B: 柔红霉素

C: 博来霉素

D: 白消安

答案: C

49. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

A: 按时给药

B: 按需给药

C: 按阶梯给药

D: 提倡无创给药

答案: B

50. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

A: 阿奇霉素

B: 磷霉素

C: 万古霉素

D: 链霉素

答案: C

51. 属于癌痛治疗第二阶梯的止痛药物为

A: 二氢可待因

B: 羟考酮

C: 对乙酰氨基酚

D: 哌替啶

答案: A

52. (2018 年真题) 婴幼儿腹泻,服用地衣芽孢杆菌活菌制剂,正确的使用方法是 ()

A: 应同时碱化尿液

B: 舌下含服

C: 用温水调服

D: 清晨服用

答案: C

53. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 罗格列酮片
- B: 消渴丸
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 硝苯地平控释片

答案：A

54. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

- A: 普罗布考
- B: 他汀类
- C: 依折麦布
- D: 烟酸类

答案：C

55. （2016 年真题）美国食品药品监督管理局（FDA）根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

- A: C 级
- B: D 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：B

56. $90\text{g/L} \leq \text{Hb 量}$

- A: 重度贫血
- B: 基本正常
- C: 中度贫血
- D: 轻度贫血

答案：D

57. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 黄酮哌酯
- B: 前列康
- C: 特拉唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：C

58. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 1~2h
- B: 2~4h
- C: 0.5h
- D: 1.0h

答案：C

59. 用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。

- A: 盐酸烯丙吗啡
- B: 二巯基丁二钠
- C: 氯丙嗪
- D: 谷胱甘肽

答案：B

60. 儿科用药中，在病情危重抢救时最常用的给药途径是

- A: 口服给药
- B: 肌肉注射
- C: 静脉滴注
- D: 静脉注射

答案：D

61. 患者突发心前区压榨性疼痛，立即取出硝酸甘油片，正确的使用方法是()

- A: 用温水调服
- B: 舌下含服
- C: 清晨服用
- D: 应同时碱化尿液

答案：B

62. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

- A: 戊巴比妥
- B: 苯巴比妥
- C: 巴比妥
- D: 硫喷妥

答案：A

63. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

- A: 复方苯甲酸软膏
- B: 酮康唑软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 联苯苄唑软膏

答案：C

64. 二甲双胍片的适宜服药时间是

- A: 清晨
- B: 餐中
- C: 餐后
- D: 餐前

答案：B

65. 药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

- A: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5-羟色胺综合征
- B: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性
- C: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂
- D: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

答案：B

66. (2015 年真题) 治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是 ()。

- A: 依从性
- B: 经济性
- C: 安全性
- D: 有效性

答案：A

67. 抗菌药物适宜

- A: 餐后服用
- B: 清晨服用

C: 餐中服用

D: 餐前服用

答案: D

68. (2015 年真题) 格列齐特片的适宜服药时间是 ()。

A: 餐前

B: 餐后

C: 餐中

D: 清晨

答案: A

69. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A: 男性<40U/L

B: 男性 11~50U/L

C: 成人<40U/L

D: 成人<50U/L

答案: C

70. 多巴胺受体激动剂

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 左旋多巴

答案: D

71. 患者，男，22 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃。经实验室和 X 线胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是

- A: 阿米卡星
- B: 阿莫西林
- C: 阿奇霉素
- D: 亚胺培南-西司他丁

答案：B

72. 病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别的

- A: 2 级证据
- B: 3 级证据
- C: 4 级证据
- D: 1 级证据

答案：B

73. 为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药,白三烯受体阻断剂

- A: 扎鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：A

74. (2019 年真题) 能减轻眼部平滑肌及血管痉挛, 改善局部微循环, 缓解视疲劳的药物是

- A: 聚乙烯醇滴眼液
- B: 山莨菪碱滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 可的松滴眼液

答案：B

75. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 厄贝沙坦
- B: 氨氯地平
- C: 比索洛尔
- D: 卡托普利

答案：A

76. 与二、三级信息源相比一级信息源的特点是

- A: 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）
- B: 内容更新
- C: 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考
- D: 内容广泛，使用方便

答案：B

77. 口服降糖药是（）。

- A: 多粘菌素
- B: 法莫替丁
- C: 二甲双胍
- D: 卡托普利

答案：C

78. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 阿莫西林
- C: 头孢洛林
- D: 替考拉宁

答案：A

79. 对于尿比重叙述正确的是

- A: 新生儿的正常尿比重一般高于成人的正常尿比重
- B: 急性肾小球肾炎可引起尿比重降低
- C: 尿比重是指在 4℃ 时尿液与同体积纯水的重量之比
- D: 尿比重数值的大小取决于尿量的多少

答案: C

80. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

- A: 维生素
- B: 维生素 A
- C: 维生素 C
- D: 复合维生素 B

答案: C

81. 两种药物配伍之后效价降低的是()

- A: 青霉素与 5% 葡萄糖注射液
- B: 胰岛素与 0.9% 氯化钠注射液
- C: 头孢曲松与复方氯化钠注射液
- D: 头孢唑林钠与 0.9% 氯化钠注射液

答案: A

82. 万古霉素 0.5g 加入 5% 葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h, 已知每毫升 15 滴, 每分钟最多可滴注的滴数约是()

- A: 15 滴
- B: 50 滴
- C: 7 滴
- D: 25 滴

答案：D

83. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 注意定期监测器官功能
- B: 了解患者及家族的过敏史
- C: 注意药物的迟发反应
- D: 注意特殊人群用药

答案：B

84. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

- A: 双胍类降糖药
- B: 磺酰脲类降糖药
- C: 胰岛素
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：A

85. 使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

- A: 位置标志明确
- B: 环境舒适
- C: 适当隐私
- D: 配备必备设备

答案：C

86. 对购药患者讲授安全用药常识是

- A: 质问方式

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 指令方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/597141146052010024>