专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年四川省巴州区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题完整题库答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

A：利福平

B：地塞米松

C：异烟肼

D：苯巴比妥

答案：C

2.可作为急性胰腺炎的症状指标是

A：磷酸激酶降低

B：淀粉酶降低

C：淀粉酶升高

D：磷酸激酶升高

答案：C

3.ADR报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

A：可能无关

B：可能

C：待评价

D：很可能

答案：C

4.服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

A：粉剂

B：糖浆剂

C：胶囊剂

D：包衣片

答案：B

5.妊娠期间，药物致畸的高敏感期是

A：受精后3周以内

B：受精后3周～3个月

C：妊娠3天

D：妊娠18天

答案：B

6.甲亢患者服用丙硫氧嘧啶治疗期间，应定期监测的是

A：TC

B：CK

C：BUN

D：WBC

答案：D

7.中度支气管哮喘的临床表现为

A：休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30次／分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，常见心率增快>120次／分，奇脉，PaO2<60mmHg，PaCO2>45mmHg，SaO2>190%，pH可降低

B：稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

C：步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

D：不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

答案：B

8.有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

A：确认

B：待验证

C：驳倒

D：验证

答案：A

9.有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

A：常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

B：尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

C：尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自食物代谢的结果

D：正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

10.恶性肿瘤

A：白细胞增多

B：血小板增多

C：淋巴细胞增多

D：红细胞沉降率减慢

答案：A

11.设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

A：二级证据

B：四级证据

C：一级证据

D：三级证据

答案：D

12.春季卡他性结膜炎严重者可选用

A：碘苷滴眼液

B：1%泼尼松龙滴眼液

C：杆菌肽眼膏

D：硫酸锌滴眼液

答案：B

13.以下所列药物中，有腹泻的2岁以下儿童不宜使用的是

A：盐酸小檗碱

B：鞣酸蛋白

C：洛哌丁胺

D：双歧三联活菌制剂

答案：C

14.能增强华法林的抗凝作用的食物是

A：韭菜

B：芒果

C：地瓜

D：维生素K

答案：B

15.分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

A：患者自行选购药品、误用假药、劣药

B：医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治

C：新手值班以及计算机医嘱系统缺陷

D：调剂工作过于繁忙

答案：B

16.（2015年真题）解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予（）。

A：山莨菪碱

B：东莨菪碱

C：麻黄碱

D：毛果芸香碱

答案：D

17.对于妊娠期用药，下述治疗措施错误的是

A：能单独用药就避免联合用药

B：可使用D级药物

C：可使用A级药物

D：禁止在孕期给予试验性用药

答案：B

18.可引起视力模糊的是

A：东莨菪碱

B：阿米洛利

C：右美沙芬

D: 抗过敏药

答案：A

19.应在睡前服用，疗效较好的是

A: 噻氯匹定

B: 沙丁醇胺

C: 维生素B1

D: 硫酸镁

答案：B

20.耳、肾毒性大，肾功能不全患者不宜使用的药物是

A: 头孢哌酮

B: 阿米卡星

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

答案：B

21.γ-谷氨酰转移酶正常参考区间是

A: ≤50U/L

B: 男性11～50U/L

C: ≤30U/L

D: <40U/L

答案：B

22.抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

A: 阿司匹林

B: 别嘌醇

C: 丙磺舒

D: 秋水仙碱

答案：B

23.患者女,32岁,一天前发热体温39.8℃全身乏力,四肢疼痛近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血,血常规检查白细胞计数偏低,中性粒细胞比例低，该患者最适宜选用的药物是()

A: 利巴韦林片

B: 阿昔洛韦片

C: 奥司他韦胶囊

D: 金刚烷胺片

答案：C

24.非甾体抗炎药的不良反应,偶可致无菌性脑膜炎

A: 塞来昔布

B: 美洛昔康

C: 布洛芬

D: 保泰松

答案：C

25.氟胞嘧啶属于

A: 抗肿瘤药

B: 抗真菌药

C: 抗病毒药

D: 抗过敏药

答案：B

26.高血压患者的降压目标一般患者高血压（）

A: <120／80mmHg

B：<150／90mmHg

C：<130／80mmHg

D：<140／90mmHg

答案：D

27.引起心悸、心绞痛发作的药物是

A：左甲状腺素

B：丙硫氧嘧啶

C：胰岛素

D：碘和碘化物

答案：A

28.单核细胞正常参考区间是

A：0.20～0.40

B：0.005～0.05

C：0～0.01

D：0.03～0.08

答案：D

29.评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

A：CHA，DS，-VASe评分

B：HAS-BLED评分

C：CTP分级

D：FEV1占预计值%

答案：B

30.查询药物质量检验标准可首选的书籍是

A：《药物流行病学》

B: 《药物治疗学》

C: 《中华人民共和国药典》

D: 《新编药物学》

答案：C

31.抗胆碱能药

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 左旋多巴

答案：C

32.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 氨溴索片30mg／次 tid

B: 桉柠蒎肠溶软胶囊300mg／次 qd

C: 阿奇霉素片500mgqd

D: 右美沙芬片30mgtid

答案：A

33.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
D：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
答案：B

34.在《中国药典临床用药须知》以外的权威性文献中记载的应该做皮肤敏感试验的品种是
A：鱼肝油酸钠
B：降纤酶
C：肉毒抗毒素
D：右旋糖酐
答案：D

35.单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病患者宜选用
A：格列本脲
B：二甲双胍
C：大剂量碘剂
D：胰岛素
答案：B

36.下列白细胞计数中，属于不正常的是
A：成人3.5X109/L
B：成人4.3X109/L
C：成人5.0X109/L
D：新生儿15.0X109/L
答案：A

37.以下药物中，适宜处置蛇类咬伤的是
A：胃蛋白酶

B: 胰蛋白酶
C: 糜蛋白酶
D: 凝血酶
答案：B

38.慢性功能性便秘
A: 乳果糖
B: 羧甲基纤维素钠
C: 比沙可啶
D: 开塞露
答案：A

39.患者,女,38岁,已婚,妊娠2个月,近日自觉心慌、多汗,查FT3,FT4偏高TSH0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为()
A: 维持妊娠,行甲状腺切除手术
B: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗
C: 终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗
D: 维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗
答案：B

40.对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用
A: 甲磺酸去铁胺
B: 富马酸亚铁
C: 叶酸+维生素B12
D: 维生素K1
答案：C

41.与贝母枇杷糖浆不宜联用的药物是

A: 乳酶生
B: 氢氧化铝
C: 苯巴比妥
D: 氨茶碱
答案：D

42.(肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的
A: 1/7～1/5
B: 3/5～3/4
C: 1/10～1/5
D: 1/5～1/2
答案：D

43.伴有认知障碍的老年帕金森病患者，首选治疗药物为
A: 复方左旋多巴
B: 金刚烷胺
C: 司来吉兰
D: 苯海索
答案：A

44.（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。
A: 地西泮
B: 米氮平
C: 雷美尔通
D: 佐匹克隆
答案：B

45.某男孩，12岁,近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。
A：苯妥英钠
B：氯丙嗪
C：丙戊酸
D：地西泮
答案：C

46.医师无权调配处方
A：技术性
B：法律性
C：有效性
D：经济性
答案：B

47.III期临床试验
A：以特殊人群为给药对象
B：以目标适应证患者为给药对象
C：以健康志愿者为给药对象
D：以患者为给药对象
答案：B

48.左心衰竭最早出现的症状是
A：夜间阵发性呼吸困难
B：劳力性呼吸困难
C：端坐呼吸
D：粉红色泡沫样痰
答案：B

49.与两性霉素B合用在体外有拮抗作用

A：酮康唑

B：碳酸氢钠

C：链霉素

D：强心苷

答案：A

50.在骨骼疾病的诊断酶学中最重要的酶是

A：ALP

B：LDH

C：CK

D：ACP

答案：A

51.具有心脏毒性，治疗期间每3个月进行一次心脏评估，且在治疗后每6个月重复一次，直至停止治疗后24个月的靶向药是

A：帕博利珠单抗

B：曲妥珠单抗

C：利妥昔单抗

D：贝伐珠单抗

答案：B

52.防心绞痛药物

A：去氨升压素

B：硝酸甘油

C：胃黏膜保护剂

D：甘草合剂

答案：B

53.患者，女，72岁，主诉“眼干、眼红、刺激感、砂砾感”，医师初步诊断为干眼症，建议患者选用

A: 山莨菪碱滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 聚乙烯醇滴眼液

D: 吡诺克辛滴眼液

答案：C

54.以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 青霉素

B: 多粘菌素

C: 甲氨蝶呤

D: 庆大霉素

答案：A

55.餐后1～2h服用的是

A: 质子泵抑制剂

B: 解痉、镇痛药

C: 抗酸药

D: 胃黏膜保护剂

答案：C

56.糖尿病合并肾病者应首选的药物是

A: 格列喹酮

B: 二甲双胍

C: 罗格列酮

D: 阿卡波糖

答案：A

57.可诊断女性高尿酸血症的是

A: 血尿酸为200μmol/L

B: 血尿酸为270μmol/L

C: 血尿酸为380μmol/L

D: 血尿酸为420μmol/L

答案：C

58.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用：

A: 左旋多巴

B: 苯海索

C: 多巴丝肼

D: 司来吉兰

答案：B

59.下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

B: 与血浆蛋白结合率增加，使游离型药物减少

C: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降

D: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长

答案：B

60.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐后

B: 餐后1小时

C: 餐前0.5～1小时

D: 餐前

答案：C

61.适用于早期、轻度症状者

A: 左旋多巴

B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 恩托卡朋

答案：B

62.服用保泰松、水杨酸钠可呈现

A: 红至黑色

B: 白陶土便

C: 黄色

D: 橘红至红色

答案：A

63.判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

A: 3周

B: 6周

C: 5周

D: 4周

答案：B

64.能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

A: 计算机检测方法

B: 岗位工作问责

C: 病历审查

D: 直接观察

答案：A

65.急性荨麻疹伴休克或严重的荨麻疹伴血管性水肿患者的治疗药物是

A: 第二代非镇静抗组胺药

B: 1：1000肾上腺素注射液

C: 第一代抗组胺药

D: 肾上腺糖皮质激素

答案：B

66.po.表示

A: 口服

B: 饭后

C: 每日

D: 双眼

答案：A

67.填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 用药起止时间

B: 不良反应/事件的结果

C: 用药原因

D: ADR/ADE过程描述

答案：C

68.沙眼的病原体为

A：衣原体
B：支原体
C：细菌
D：病毒
答案：A

69.可引起嗜酸性粒细胞减少的药物不包括
A：氢化可的松
B：头孢氨苄
C：甲基多巴
D：坎地沙坦
答案：B

70.老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎，主要是因为老年人()。
A：肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加
B：血浆蛋白含量降低，使游离性药物增加
C：对药物处于高敏状态，影响中枢神经系统的功能
D：消化腺分泌减少，药物吸收增加
答案：A

71.(抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是
A：加巴喷丁
B：乙琥胺
C：卡马西平
D：扑米酮
答案：C

72.消化性溃疡发病机制中的防御因子为（）

A: 前列腺素
B: H.pylori 感染
C: 吸烟
D: 酒精
答案：A

73.病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的
A: 2级证据
B: 4级证据
C: 1级证据
D: 3级证据
答案：B

74.（2019年真题）患者，男，34岁，既往有胃溃疡病史，现因反复关节疼痛、肿大就诊，诊断为骨关节炎，应选用的药物是
A: 吲哚美辛
B: 塞来昔布
C: 萘普生
D: 布洛芬
答案：B

75.（2017年真题）容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是（）
A: 脂溶性高，分子量小
B: 蛋白结合率高,具有手性、分布容积大
C: 分子量大、弱碱性
D: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长
答案：A

76.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A: 1%硫酸铜

B: 1%氯化钠

C: 1%硫酸镁

D: 3%过氧化氢

答案：C

77.长期慢性便秘者不宜长期大量使用的是

A: 乳果糖

B: 番泻叶

C: 开塞露

D: 硫酸镁

答案：B

78.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 药理作用

B: 药物的使用

C: 药动学相互作用

D: 药物制剂因素

答案：D

79.药源性疾病一旦确诊，首要的治疗措施是

A: 停用致病药物

B: 对症治疗

C：调整治疗方案

D：拮抗致病药物

答案：A

80.据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达80%左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A：青霉素

B：米非司酮

C：水溶性维生素

D：阿莫西林

答案：B

81.（2019年真题）能改善眼部干燥症状，缓解视疲劳的药物是

A：可的松滴眼液

B：山莨菪碱滴眼液

C：聚乙烯醇滴眼液

D：硫酸锌滴眼液

答案：C

82.患者在使用丙戚酸钠时应监测血药浓度,适宜的血药浓度范围是（）

A：50~150ug/ml

B：10~20ug/ml

C：4~12ug/ml

D：10~40ug/ml

答案：A

83.合用维生素B12与陈皮，可以达到的效果是

A: 减少维生素B12的氧化
B: 抑制维生素B12的代谢
C: 加快维生素B12的排泄
D: 促进维生素B12的吸收
答案：D

84.患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选
A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
B: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
C: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
D: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
答案：C

85.哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,氯喹
A: 可能致胎儿畸形
B: 导致新生儿血钙过高
C: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
D: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
答案：D

86.对5岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是
A: 布洛芬混悬液
B: 20%阿司匹林溶液滴鼻
C: 20%安乃近溶液滴鼻
D: 贝诺酯混悬液
答案：C

87.有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

A: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

B: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

C: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果

D: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

88.高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛，提示可能是

A: 动脉瘤

B: 脑膜炎

C: 脑血管意外

D: 脑肿瘤

答案：C

89.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高160cm，体重70kg。实验室检查：白细胞8．0×109／L，红细胞4．0×1012／L，总胆红素11μmol／L，总胆固醇6．0mmol／L，空腹血糖7．6mmol／L。

A: 辛伐他汀

B: 二甲双胍

C: 格列齐特

D: 非诺贝特

答案：B

90.评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

A: CHA，DS，-VASe评分

B: FEV1占预计值%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/598054063124007022