北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿泌尿外科必看题库知识点》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：前列腺癌患者已有盆腔淋巴结转移，不应采取的治疗方法是（　）。A.双侧睾丸切除术
B.口服雌激素
C.皮下注射 IMRH 类似物
D.根治性前列腺切除和盆腔淋巴结清扫术
E.发生急性尿潴留可留置导尿

2、单项选择题：无痛性肉眼全程血尿最常见的原因是（　）。A.泌尿系感染
B.泌尿系结核
C.泌尿系肿瘤
D.泌尿系结石
E.前列腺肥大

3、单项选择题：肾盂肿瘤的主要诊断依据是（　）。A.镜下血尿
B.终末血尿
C.全程肉眼血尿
D.全血尿伴有血块
E.无痛性间歇性肉眼血尿

4、单项选择题：诊断淋菌性尿道炎最常用的检查方法是（　）。A.尿道分泌物做普通培养
B.PCR 找淋球菌核酸
C.尿道分泌物染色涂片找淋球菌
D.血 RPR 试验
E.尿道分泌物涂片有大量白细胞

5、单项选择题：3 岁男孩，自幼蹲位排尿，阴茎发育小，向下弯曲，尿道口位于阴茎根部与阴囊交界处，双侧阴囊内可触及正常睾丸。首选的治疗方法为（　）。A.手术治疗
B.绒毛膜促性腺激素治疗
C.不需特殊处理
D.雄激素替代疗法
E.以上均可

6、单项选择题：有症状的淋菌性尿道炎诊断的最可靠方法是（　）。A.尿道分泌物做普通培养
B.PCR 查淋球菌基因片段
C.尿道分泌物染色涂片找淋球菌
D.RPR 试验

E.尿道分泌物涂片有大量白细胞

7、单项选择题：双肾积水最常见的原因为（　）。A.双输尿管狭窄

B.输尿管结石

C.下尿路梗阻

D.膀胱肿瘤

E.输尿管畸形

8、单项选择题：膀胱三角区有蒂乳头瘤（T1 期），肿瘤直径小于 2cm，治疗应选择（　）。A.经尿道电切或电灼

B.膀胱部分切除

C.膀胱全切除

D.化学疗法

E.放射疗法

9、单项选择题：先天性尿道下裂除尿道口异位以外，同时存在（　）。A.阴茎弯曲

B.隐睾

C.尿道口狭窄

D.包皮过长

E.不能站立排尿

10、单项选择题：有关隐睾的治疗，下列哪项是错误的（　）。A.内分泌治疗

B.睾丸松解固定术，一般应在 2 岁前进行

C.合并斜疝者，同时做疝修补术

D.如睾丸萎缩或疑有恶变者，应予切除

E.隐睾松解固定，可以防止睾丸恶性变

11、单项选择题：为了解肾脏积水的严重程度，下列检查哪一项帮助不大（　）。A.B 超检查

B.同位素肾图

C.静脉肾盂造影

D.逆行尿路造影

E.核磁共振水成像

12、单项选择题：尿道下裂的临床分型不包括（　）。A.阴茎头型

B.阴茎型

C.海绵体型

D.阴囊型

E.会阴型

13、单项选择题：在尿流率测定的各项参数中，下列哪项最有意义（　）。A.最大尿流率

B.平均尿流率

C.排尿时间

D.尿流时间

E.尿量

14、单项选择题：在上尿路结石的预防中哪一项是错误的（　）。A.足够的饮水保持尿量在 2000ml 以上

B.少饮用牛奶

C.少食用富含草酸的食物

D.多饮浓茶以起到利尿作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598056031015006063