

全科医学住院医师：眼科考试答案三

1、单选 流行性出血性结膜炎是由（）引起的。

- A. 7 型腺病毒
- B. 70 型肠道病毒
- C. 8 型腺病毒
- D. 10 型肠道病毒
- E. 以上均可引起

[点（江南博哥）点击查看答案](#)

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：无晶状体眼青光眼的机制包括晶状体皮质残留，血液、色素、炎症细胞等阻塞小梁间隙、瞳孔膜闭、虹膜嵌塞手术切口、手术导致小梁水肿等。

2、单选 细菌性角膜溃疡中最严重的致病菌是（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 流感嗜血杆菌

正确答案：D

3、单选 下列哪些治疗对急性结膜炎不适合（）。

- A. 结膜囊冲洗
- B. 全身应用抗生素
- C. 局部滴眼液
- D. 包扎患眼
- E. 局部应用眼药膏

正确答案：D

4、单选 美开朗的作用机制（）。

- A. 阻断睫状体色素上皮细胞 $\beta 1$ 受体，减少房水生成
- B. 阻断睫状体色素上皮细胞 $\beta 2$ 受体，减少房水生成
- C. 阻断睫状体非色素上皮细胞 $\beta 1$ 受体，减少房水生成
- D. 阻断睫状体非色素上皮细胞 $\beta 2$ 受体，减少房水生成
- E. 增加葡萄膜-巩膜途径房水引流

正确答案：D

5、单选 青光眼滤过手术后两年失败率是多少（）。

- A. 小于 5%
- B. 5%~15%
- C. 15%~25%
- D. 25%~35%
- E. 大于 35%

正确答案：C

6、多选 沙眼和包涵体性结膜炎敏感的有效治疗药物包括（）。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素
- D. 利福平
- E. 氧氟沙星

正确答案：A, C, D

7、单选 以下治疗青光眼的药物中，哪一种的降压机制是使阻塞房角开放（）。

- A. 醋唑磺胺
- B. 甘露醇
- C. 噻吗心安
- D. 甘油盐水
- E. 毛果芸香碱

正确答案：E

8、多选 春季角结膜炎患者可选用的药物（）。

- A. 色甘酸钠
- B. 埃美丁
- C. 典必殊
- D. 氧氟沙星
- E. 0.05%FK-506

正确答案：A, B, C, E

参考解析：春季角结膜炎可应用血管收缩剂、抗组胺药、细胞膜稳定剂、糖皮质激素及免疫抑制剂。

9、多选 晶状体源性青光眼包括（）。

- A. 晶状体肿胀
- B. 晶状体脱位
- C. 晶状体混浊
- D. 球形晶状体
- E. 晶状体溶解

正确答案：A, B, D, E

10、单选 泪道冲洗时，水由下泪小点进入，自下泪小点流出，未见脓性分泌物，其诊断为（）。

- A. 泪小管阻塞
- B. 泪小点闭塞
- C. 泪小管炎
- D. 慢性泪囊炎

E. 鼻泪道阻塞

正确答案：A

11、单选 结膜炎的治疗中哪项是错误的（）。

A. 冲洗结膜囊

B. 冷敷

C. 局部点用抗生素

D. 全身应用抗生素

E. 遮盖患眼

正确答案：E

12、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最早的药（）。

A. 拟胆碱药

B. 缩瞳剂

C. β 受体阻滞剂

D. 前列腺素衍生物

E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：A

13、单选 晶状体源性青光眼（）。

A. Marfan 综合征

B. 溶血性青光征

C. 青光眼睫状体炎综合征

D. 广泛视网膜缺血所致青光眼

E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：A

14、填空题 视网膜脱离是指视网膜的（）与（）的分离。

正确答案：神经上皮层；色素上皮层

15、填空题 急性卡他性结膜炎发病潜伏期为（），发病后（）是病情达到高潮，其自然病程为（）。

正确答案：1~3 天；3~4 天；10~14 天

16、填空题 视觉电生理检查常用的有（）、（）、（）。

正确答案：眼电图；视网膜电图；视觉诱发电位

17、单选 在 40 岁个体眼压超过正常的约有（）。

A. 5%

B. 7%

C. 10%

D. 15%

E. 25%

正确答案：B

18、单选 前房角是指（）。

- A. 虹膜之后与睫状体之间的间隙
- B. 角膜之后的周边部分
- C. 巩、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝
- D. 角膜与虹膜睫状体之夹角
- E. 巩膜与虹膜睫状体之夹角

正确答案：C

19、单选 患儿，12岁，男，双眼痒，春夏季明显，检查：上睑结膜可见扁平大小不等浅红色乳头，如铺路石，分泌物呈黏丝状（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：D

20、单选 对中心性浆液性脉络膜视网膜病变不应该使用（）。

- A. 维生素
- B. 激素
- C. 肌苷
- D. 三磷酸腺苷（ATP）
- E. 50%葡萄糖注射液

正确答案：B

21、单选 患者男性，52岁，右眼傍晚出现雾视2个月。检查：右眼视力1.0，右眼周边前房1/3CT，房角功能性小梁开放2/3圆周，右眼底视神经乳头和视野正常。最恰当的手术方式（）。

- A. 周边虹膜切除术
- B. 节段性虹膜切除术
- C. 小梁切除术
- D. 非穿透滤过手术
- E. 小梁切开术

正确答案：A

参考解析：急性闭角型青光眼先兆期手术方式为周边虹膜切除术。

22、单选 解除小梁网阻塞的手术（）。

- A. 周边虹膜切除术
- B. 睫状体光凝术
- C. 小梁切开术
- D. 睫状体冷凝术
- E. 小梁切除术

正确答案：C

23、多选 先天性青光眼通常和哪些眼病相鉴别（）。

- A. 婴儿鼻泪管阻塞
- B. 眼睑内翻倒睫
- C. 角膜炎
- D. 先天性大角膜
- E. 眼内肿瘤

正确答案：A, B, C, D, E

24、单选 患者女性，24岁，左眼红5天后就医。检查：右眼下方球结膜充血，相应部位见一疱疹样结节，角膜透明，最可能的诊断是（）。

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 泡性结膜炎
- C. 滤泡性结膜炎
- D. 慢性结膜炎
- E. 过敏性结膜炎

正确答案：B

参考解析：泡性结膜炎多见于女性、青少年、儿童，早期为实性、隆起结节，周围有充血区，是迟发型免疫反应性疾病。

25、单选 结膜皮样瘤最常见于（）。

- A. 鼻上角膜缘
- B. 颞上角膜缘
- C. 鼻下角膜缘
- D. 颞下角膜缘
- E. 下穹隆

正确答案：D

26、单选 流行性角结膜炎的病原体不包括（）。

- A. 腺病毒7型
- B. 腺病毒8型
- C. 腺病毒19型
- D. 腺病毒29型
- E. 腺病毒37型

正确答案：A

参考解析：腺病毒3、4、7型引起咽结膜热。

27、单选 脑膜炎球菌性结膜炎的潜伏期为（）。

- A. 24小时以内
- B. 1~2天
- C. 2~3天
- D. 3~4天
- E. 4~5天

正确答案：A

28、填空题 视神经可分为（）、（）、（）、（）四部分。

正确答案：眼内段；眶内段；管内段；颅内段

29、单选 沙眼的病原体不包括（）。

- A. Ba 抗原型沙眼衣原体
- B. B 抗原型沙眼衣原体
- C. D 抗原型沙眼衣原体
- D. C 抗原型沙眼衣原体
- E. A 抗原型沙眼衣原体

正确答案：C

参考解析：沙眼的病因多为 A、B、C 或 Ba 抗原型沙眼衣原体所致。D~K 抗原型沙眼衣原体主要引起包涵体性结膜炎。

30、多选 慢性滤泡性结膜炎病变主要位于（）。

- A. 上穹隆
- B. 上睑结膜
- C. 下穹隆
- D. 下睑结膜
- E. 上下睑结膜弥漫病变

正确答案：C, D

31、单选 急性闭角型青光眼在急性发作期哪项不能作为诊断要点（）。

- A. 视力急剧下降
- B. 恶心、呕吐
- C. 眼压升高、眼球坚硬如石
- D. 混合充血、角膜水肿、瞳孔散大
- E. 眼底可见明显青光眼杯

正确答案：E

32、单选 色素性青光眼描述不正确的（）。

- A. 有一定的家族性
- B. 色素沉积在小梁网
- C. 多为远视眼
- D. 深前房和宽房角
- E. UBM 检查可以揭示虹膜-悬韧带接触

正确答案：C

参考解析：色素性青光眼特点有一定的家族性、色素沉积在小梁网、多为近视眼、深前房和宽房角、UBM 检查可以揭示虹膜-悬韧带接触。

33、单选 关于 β 受体激动剂，错误的是（）。

- A. 地匹福林属于 β 受体激动剂
- B. 兴奋 β_1 受体
- C. 既降低小梁网房水流出阻力，又增加葡萄膜-巩膜途径房水引流

- D. 禁用于闭角型青光眼
- E. 血管收缩和散瞳均为其主要不良反应

正确答案：B

参考解析：β受体激动剂兴奋β₂受体。

34、单选 闭角型青光眼的促发因素中，不包括（）。

- A. 情绪波动
- B. 过度疲劳
- C. 近距离过度用眼
- D. 暗室环境
- E. 瞳孔缩小

正确答案：E

参考解析：闭角型青光眼的促发因素中常包括情绪波动、过度疲劳、近距离过度用眼、暗室环境、全身疾病。

35、多选 闭角型青光眼的激发试验有几种（）。

- A. 暗室试验
- B. 俯卧试验
- C. 散瞳试验
- D. 饮水试验
- E. 缩瞳试验

正确答案：A, B, C, D

36、单选 青光眼黄斑功能改变除外（）。

- A. 获得性色觉障碍
- B. 图形视网膜电图改变
- C. 视诱发电位改变
- D. 眼电图改变
- E. 视觉对比敏感度改变

正确答案：D

37、单选 在青光眼导致眼压升高的病理生理过程中，临床上绝大部分青光眼是哪一种因素导致的（）。

- A. 房水外流阻力增加
- B. 眼球变小
- C. 睫状突生成房水的速率增加
- D. 表层巩膜的静脉压增加
- E. 葡萄膜巩膜途径阻力增加

正确答案：A

38、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最新的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂

- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案： D

参考解析： Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

39、单选 结膜结石常见于（）。

- A. 沙眼患者
- B. 慢性结膜炎患者
- C. 过敏性结膜炎患者
- D. 急性结膜炎患者
- E. 特应性角结膜炎

正确答案： B

40、多选 闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制（）。

- A. 刺激导致眼部自主神经功能的紊乱
- B. 交感一副交感系统失去平衡
- C. 刺激瞳孔扩大
- D. 刺激瞳孔缩小
- E. 周边虹膜触碰摩擦小梁组织

正确答案： A, B, C, E

参考解析： 闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制包括刺激直接或间接引起眼部自主神经功能的紊乱，交感一副交感系统失去平衡使得瞳孔扩大并增加瞳孔阻滞；睫状肌调节痉挛，推虹膜根部向前；或周边虹膜触碰摩擦小梁组织，以及眼局部血管舒缩功能失调，共同导致了狭窄的房角阻塞关闭，促使青光眼发病。

41、填空题 我国人眼球突出度的正常值为（），两眼相差一般不超过（）。

正确答案： 12~14； 2

42、多选 下列可出现向心性视野缩小的疾病有（）。

- A. 视网膜色素变性
- B. 青光眼晚期
- C. 垂体病
- D. 球后视神经炎
- E. 癔症

正确答案： A, B, D, E

43、单选 青光眼的临床诊断最基本的检查项目不包括以下（）。

- A. 眼压
- B. 房角
- C. 视野
- D. 视盘

E. 角膜

正确答案：E

44、多选 容易出现球结膜下出血的是（ ）。

A. 春季结膜炎

B. 慢性细菌性结膜炎

C. 腺病毒性角结膜炎

D. 沙眼

E. 流行性出血性角结膜炎

正确答案：C, E

45、填空题 急性闭角青光眼的病程可分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）五个阶段。

正确答案：临床前期及先兆期；急性发作期；缓解期；慢性期；绝对期

46、填空题 睑缘炎可分为（ ）、（ ）和（ ）三种。

正确答案：鳞屑性；溃疡性；眦性

47、多选 眼压高低主要取决于房水循环中的哪些因素（ ）。

A. 睫状突生成房水的速率

B. 葡萄膜巩膜通道的大小

C. 上巩膜静脉压

D. 前房角的宽窄

E. 房水通过小梁网流出的阻力

正确答案：A, C, E

参考解析：眼压高低主要取决于房水循环中睫状突生成房水的速率、上巩膜静脉压、房水通过小梁网流出的阻力。

48、多选 以下继发性青光眼属于开角型青光眼的是（ ）。

A. 糖皮质激素性青光眼

B. 房角后退性青光眼

C. 新生血管性青光眼

D. 溶血性青光眼

E. 色素性青光眼

正确答案：A, B, D, E

49、单选 急性闭角型青光眼发病因素不包括（ ）。

A. 眼轴短

B. 大角膜

C. 前房浅

D. 房角窄

E. 晶状体厚

正确答案：B

50、多选 关于高眼压症描述正确的（ ）。

- A. 高眼压症主要与原发性开角型青光眼相鉴别
- B. 大部分的高眼压症发展为青光眼
- C. 大约 10% 的个体发展为青光眼
- D. 高眼压症主要与原发性闭角型青光眼相鉴别
- E. 需要手术治疗

正确答案：A, C

参考解析：高眼压症主要与尚未出现视盘损害和视野缺损的早期原发性开角型青光眼相鉴别，长期随访不出现视盘和视野损害，仅有大约 10% 的个体发展为青光眼。

51、填空题 视网膜母细胞瘤在临床上可分为（）、（）、（）和（）四个阶段。

正确答案：眼内期；青光眼期；眼外蔓延期；转移期

52、单选 急性闭角型青光眼最主要的发病机制为（）。

- A. 眼轴短
- B. 小角膜
- C. 小梁网功能不全
- D. 房角窄
- E. 瞳孔阻滞

正确答案：E

53、单选 急性期或重症沙眼全身用药疗程（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：B

54、单选 胬肉侵入角膜近瞳孔区时首先考虑的治疗方法（）。

- A. 射线照射
- B. 手术切除
- C. 局部滴眼液
- D. 局部涂眼膏
- E. 局部应用丝裂霉素 C

正确答案：B

55、多选 玻璃体积血引起的并发症有（）。

- A. 视网膜毒性作用
- B. 血影细胞性青光眼
- C. 玻璃体视网膜的增殖性病变
- D. 牵拉性视网膜脱离

E. 角膜血染

正确答案：B, C, D

56、单选 患者男性，右眼红肿，分泌物增多3天，检查：右眼睑红肿。结膜囊内大量黄白色分泌物，结膜充血，水肿，耳前侧淋巴结肿大压痛，角膜透明，伴有尿急，尿频，尿痛症状。最可能诊断为（）。

A. 淋球菌性结膜炎

B. 慢性结膜炎

C. 沙眼

D. 流行性角结膜炎

E. 病毒性结膜炎

正确答案：A

参考解析：淋球菌性结膜炎，大量脓性分泌物，眼睑水肿，结膜充血，耳前淋巴结肿大压痛，可有泌尿系统症状。

57、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最广泛的药（）。

A. 拟胆碱药

B. 缩瞳剂

C. β 受体阻滞剂

D. 前列腺素衍生物

E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：C

参考解析：Marfan综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

58、单选 正常人大约多少的房水经葡萄膜巩膜途径外流（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

E. 25%

正确答案：D

59、单选 高眼压症的危险因素不包括（）。

A. 眼压升高的程度

B. 视盘的形态异常

C. 青光眼的家族史

D. 心血管疾病

E. 眼前段的大小

正确答案：E

参考解析：高眼压症的危险因素包括眼压升高的程度、视盘的形态异常、青光眼的家族史、心血管疾病、视网膜中央静脉阻塞等。

60、单选 下列哪项不是共同性斜视的特点（）。

- A. 渐进发病
- B. 眼球运动无异常
- C. 第二斜视角大于第一斜视角
- D. 无复视
- E. 无代偿头位

正确答案：C

61、单选 先天性青光眼发病机制为（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 房角结构发育不全
- D. 房角窄
- E. 瞳孔阻滞

正确答案：C

参考解析：先天性青光眼发病机制是房角结构发育不全。

62、多选 抑制房水生成（）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：B, E

63、单选 眼局部长期应用皮质类固醇，可引起的副作用是（）。

- A. 结膜炎
- B. 点状角膜炎
- C. 视神经炎
- D. 角膜溃疡
- E. 青光眼

正确答案：E

64、多选 急性闭角型青光眼发病因素包括（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 前房浅
- D. 房角窄
- E. 晶状体厚

正确答案：A, C, D, E

65、填空题 同侧偏盲是指两眼视野缺损的（）、（）和（）均相同。

正确答案：部位；大小；方向

66、多选 青光眼睫状体炎综合征的特点包括（）。

- A. 可能发生虹膜后粘连
- B. 反复发作的非肉芽肿性睫状体炎
- C. 玻璃体无炎症细胞
- D. 发作时眼压升高
- E. 发作时房角关闭

正确答案：B, C, D

参考解析：青光眼睫状体炎综合征的特点包括反复发作的非肉芽肿性睫状体炎、玻璃体无炎症细胞、发作时眼压升高，房角开放、从不发生虹膜后粘连等。

67、多选 沙眼慢性期，乳头及滤泡增生病变最显著的部位是（）。

- A. 上穹隆
- B. 上睑睑板上缘结膜
- C. 下穹隆
- D. 下睑结膜
- E. 上下睑结膜弥漫病变

正确答案：A, B

68、单选 外睑腺炎的手术治疗正确的是（）。

- A. 在皮肤上作与睑缘平行之切口
- B. 在皮肤上作与睑缘垂直之切口
- C. 在睑结膜面作与睑缘平行之切口
- D. 在睑结膜面作与睑缘垂直之切口
- E. 以上都不是

正确答案：A

69、单选 高眼压症在测量眼压时充分注意测量误差，眼压测量时的主要误差因素（）。

- A. 患者的配合
- B. 中央角膜厚度
- C. 测量的方法
- D. 巩膜的厚度
- E. 眼球内容物的多少

正确答案：B

70、多选 眼睑结膜假膜特点（）。

- A. 富有纤维蛋白的渗出物
- B. 结膜上皮一般保持完整
- C. 最常见于白喉杆菌性结膜炎
- D. 与结膜组织结合疏松，容易剥离
- E. 剥除后创面粗糙易出血

正确答案：A, B, D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598071060140006070>