可修改编辑

柑橘生产技术规范

实施目标：优良品种占有率大幅提高，熟期结构明显改善，有效延长鲜果供应期，柑橘鲜果供应从 8 月下旬到翌年 6 月，提高 12 月以后成熟的品种的比例；新定植果园基本实现种植无病毒容器(或假植)大苗，比传统种植提早一年挂果；在有检疫性病害危害的地区，两个检疫性病害得到有效控制、并逐步减少。

适宜范围：赣南－湘南－桂北柑橘带、长江上中游柑橘带、浙南－闽西－粤东柑橘带

（1）品种和砧木选择

1.1 品种选择

根据市场、区位、交通、社会和经济状况等因素，选择适合于本地主栽品种和搭配品种，同时注重早、中、晚熟柑橘品种的合理搭配。

1.1.1 赣南－湘南－桂北柑橘带

该带目前主要发展以中熟的纽荷尔脐橙为鲜食主栽品种，辅以其它各成熟期的优良品种。

适宜该带的早熟脐橙品种主要有清家脐橙、福本脐橙等；中熟品种除纽荷尔脐橙外，主要有华盛顿脐橙、纳维林娜脐橙、奉节 72－1；中晚熟脐橙品种主要有福罗斯特脐橙和红肉脐橙等。

部分冬季没有霜冻的小气候可以考虑发展晚熟脐橙品种，如能晚脐橙。

1.1.2 长江上中游柑橘带

各种柑橘品种均可在该区栽培，但与国内其它产区相比，该区域在榨汁甜橙生产方面有明显优势。根据三峡库区规划，云阳以西地区主要发展加工品种，而云阳以东至宜昌南津关主要发展鲜食甜橙，南津关以东的宜昌一带发展宽皮橘（宽皮橘品种参照浙南闽西产区）。

1.1.2.1 适宜的鲜销加工兼用甜橙品种

早熟品种：哈姆林、早金；中熟品种：锦橙 （如北碚 447、渝津橙、蓬安 100 号等优良品系)；晚熟品种：伏令夏橙（如蜜奈、奥林达、卡特、路德红、德尔塔等)。

1.1.2.2 脐橙

早熟品种：清家、福本；中熟品种：纽荷尔、华脐、奉节 72－1、奈维林娜；中晚熟品种：红肉脐橙、福罗斯特等

精选 word 欢迎下载

可修改编辑

；晚熟品种：能晚脐橙

1.1.3 浙南－闽西－粤东柑橘带

浙江和福建以及长江上中游带的宜昌地区主要栽培宽皮橘，辅以杂柑品种。

1.1.3.1 椪（芦）柑类

早熟品种：太田椪柑；中熟品种：椪柑；晚熟品种：岩溪晚芦。

1.1.3.2 温州蜜柑类

特早熟品种：日南一号、稻叶早生；早熟品种：宫川、兴津；中熟品种：尾张等。

1.1.3.3 杂柑类

在宽皮橘产区和甜橙产区可适当发展一些杂柑可以增加花色品种，以下品种可供选择。

积温在 5400℃ 以下能成熟的品种：天草、秋辉、诺瓦；积温 5400℃ 以上才能表现较好品种：不知火、默科特。

1.1.3.4 甜橙类：

早熟：清家、福本；中熟：纽荷尔；中晚熟：福罗斯特、夏橙

1.2 砧木选择

赣南、湘南、桂北地区目前柑橘砧木主要采用枳，建议今后逐渐试验和推广卡里佐枳橙。

长江上中游酸性至中性土壤栽培的苗木，砧木可选择卡里佐枳橙、特洛亚枳橙或纯正的单系枳，中性至碱性土壤栽培的苗木，砧木可选择红橘。

福建的椪柑可选择枳或福橘，温州蜜柑选择枳作砧，浙江常用砧木可以选用枳、枸头橙、枳橙等；海涂盐碱地宜选用枸头橙、温岭高橙等，山地宜选用枳、枳橙。

（2）育苗

2.1 砧木苗的培育

2.1.1 传统育苗技术

2.1.1.1 砧木种子的采集和贮藏

一般是果实转色成熟时采摘，枳 8～10 月采种，福橘 11～12 月采种，将采摘的鲜果剖切，取种淘净果渣及果胶，轻洗干净，摊放于阴凉通风处，种皮发白时收集贮存或装运，切忌在太阳下暴晒。

精选 word 欢迎下载

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598136040123006130