

全科医学住院医师：眼科考试题库（三）

1、单选 关于 β 受体激动剂，错误的是（）。

- A. 地匹福林属于 β 受体激动剂
- B. 兴奋 β_1 受体
- C. 既降低小梁网房水流出阻力，又增加葡萄膜-巩膜途径房水引流
- D. 禁用于闭角型青光眼
- （江南博哥）E. 血管收缩和散瞳均为其主要不良反应

正确答案：B

参考解析： β 受体激动剂兴奋 β_2 受体。

2、单选 碱性烧伤的特点为（）。

- A. 使组织蛋白凝固
- B. 使组织坏死
- C. 能溶解脂肪和蛋白质，使细胞分解坏死
- D. 角膜上皮点状脱落
- E. 破坏内皮细胞的脂肪外膜

正确答案：C

3、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最新的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：D

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

4、多选 下列可出现向心性视野缩小的疾病有（）。

- A. 视网膜色素变性
- B. 青光眼晚期
- C. 垂体病
- D. 球后视神经炎
- E. 癔症

正确答案：A, B, D, E

5、单选 目前，结膜假膜最主要见于（）。

- A. 腺病毒性结膜炎
- B. 白喉杆菌性结膜炎
- C. 泡性结膜炎
- D. 春季结膜炎
- E. 单纯疱疹病毒性结膜炎

正确答案：A

6、多选 影响瞳孔阻滞力的解剖因素包括（）。

- A. 晶状体肿大
- B. 晶状体悬韧带紧张
- C. 晶状体-虹膜隔前移
- D. 小眼球、小角膜
- E. 虹膜较厚和松软容易膨隆

正确答案：A, C, D, E

参考解析：影响瞳孔阻滞力的解剖因素包括晶状体肿大；晶状体悬韧带松弛；晶状体-虹膜隔前移、小眼球、小角膜，晶状体相对过大；虹膜的质地和厚度对青光眼有一定的影响，较厚和松软容易膨隆。

7、多选 眼压高低主要取决于房水循环中的哪些因素（）。

- A. 睫状突生成房水的速率
- B. 葡萄膜巩膜通道的大小
- C. 上巩膜静脉压
- D. 前房角的宽窄
- E. 房水通过小梁网流出的阻力

正确答案：A, C, E

参考解析：眼压高低主要取决于房水循环中睫状突生成房水的速率、上巩膜静脉压、房水通过小梁网流出的阻力。

8、单选 细菌性角膜溃疡中最严重的致病菌是（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 流感嗜血杆菌

正确答案：D

9、单选 眼局部长应用皮质类固醇，可引起的副作用是（）。

- A. 结膜炎
- B. 点状角膜炎
- C. 视神经炎
- D. 角膜溃疡
- E. 青光眼

正确答案：E

10、单选 高眼压症的危险因素不包括（）。

- A. 眼压升高的程度
- B. 视盘的形态异常
- C. 青光眼的家族史
- D. 心血管疾病

E. 眼前段的大小

正确答案：E

参考解析：高眼压症的危险因素包括眼压升高的程度、视盘的形态异常、青光眼的家族史、心血管疾病、视网膜中央静脉阻塞等。

11、多选 急性闭角型青光眼发病因素包括（）。

A. 眼轴短

B. 大角膜

C. 前房浅

D. 房角窄

E. 晶状体厚

正确答案：A, C, D, E

12、单选 正常眼压值（）。

A. 11~20mmHg

B. 10~20mmHg

C. 11~21mmHg

D. 10~21mmHg

E. 11~22mmHg

正确答案：D

13、单选 急性闭角型青光眼最主要的发病机制为（）。

A. 眼轴短

B. 小角膜

C. 小梁网功能不全

D. 房角窄

E. 瞳孔阻滞

正确答案：E

14、单选 眼压调节主要的因素是（）。

A. 晶状体

B. 玻璃体

C. 房水

D. 血容量

E. 血渗透压

正确答案：C

参考解析：暂无解析

15、单选 关于色素性青光眼，说法错误的是（）。

A. 小梁网有明显色素沉积

B. 可见角膜后中央区中下部梭形色素沉着

C. 中周边区虹膜后凹脱色素

D. 青光眼的发生机制仅为色素颗粒阻塞小梁网所致

E. UBM 在辅助诊断中起重要作用

正确答案：D

参考解析：色素性青光眼的发生机制包括：色素颗粒阻塞小梁网、小梁功能异常、内皮细胞吞噬功能异常。

16、单选 下列哪些治疗对急性结膜炎不适合（）。

- A. 结膜囊冲洗
- B. 全身应用抗生素
- C. 局部滴眼液
- D. 包扎患眼
- E. 局部应用眼药膏

正确答案：D

17、多选 先天性青光眼通常和哪些眼病相鉴别（）。

- A. 婴儿鼻泪管阻塞
- B. 眼睑内翻倒睫
- C. 角膜炎
- D. 先天性大角膜
- E. 眼内肿瘤

正确答案：A, B, C, D, E

18、单选 在青光眼导致眼压升高的病理生理过程中，临床上绝大部分青光眼是哪一种因素导致的（）。

- A. 房水外流阻力增加
- B. 眼球变小
- C. 睫状突生成房水的速率增加
- D. 表层巩膜的静脉压增加
- E. 葡萄膜巩膜途径阻力增加

正确答案：A

19、单选 在 40 岁个体眼压超过正常的约有（）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案：B

20、多选 宽基底部的乳头状瘤常由（）引起。

- A. HPV-6 型
- B. HPV-16 型
- C. HPV-18 型
- D. HPV-11 亚型

E. 以上均可以

正确答案：B, C

参考解析：宽基底部的乳头状瘤常由 HPV-16 型、HPV-18 型引起。6 或 11 亚型引起的乳头状瘤常带柄。

21、单选 结膜结石常见于（）。

- A. 沙眼患者
- B. 慢性结膜炎患者
- C. 过敏性结膜炎患者
- D. 急性结膜炎患者
- E. 特应性角结膜炎

正确答案：B

22、多选 急性闭角型青光眼临床前期包括（）。

- A. 具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼
- B. 具有眼压急剧增高，视力明显减退的特点
- C. 具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作史，而该眼却从来没有发作过
- D. 具有视神经凹陷性萎缩的特点
- E. 有急性闭角型青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史

正确答案：A, C, E

参考解析：急性闭角型青光眼临床前期指具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼，有两种情况：一类是具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作病史，而该眼却从来没有发作过，另一类是有急性闭角型青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史。

23、单选 晶状体源性青光眼（）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征
- C. 青光眼睫状体炎综合征
- D. 广泛视网膜缺血所致青光眼
- E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：A

24、多选 一般可以选择治疗哪些具有危险因素的高眼压症病人（）。

- A. 眼压超过 30mmHg
- B. 阳性青光眼家族史
- C. 高度近视
- D. 具有心血管疾病
- E. 具有糖尿病

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：

一般可以选择治疗那些具有危险因素的高眼压症病人，如眼压超过 30mmHg、阳性青光眼家族史、高度近视、具有心血管疾病、具有糖尿病。

25、多选 新生血管性青光眼常继发于下列疾病（）。

- A. 视网膜静脉阻塞
- B. 糖尿病性视网膜病变
- C. 视网膜中央动脉阻塞
- D. 视网膜静脉周围炎
- E. Coats 病

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：新生血管性青光眼常继发于下列疾病视网膜静脉阻塞、糖尿病性视网膜病变、视网膜中央动脉阻塞、视网膜静脉周围炎、Coats 病。

26、单选 高眼压症在测量眼压时充分注意测量误差，眼压测量时的主要误差因素（）。

- A. 患者的配合
- B. 中央角膜厚度
- C. 测量的方法
- D. 巩膜的厚度
- E. 眼球内容物的多少

正确答案：B

27、填空题 虹膜睫状体炎的并发症主要有（）、（）、（）。

正确答案：继发性青光眼；并发性白内障；低眼压及眼球萎缩

28、多选 沙眼出现角膜混浊的原因包括（）。

- A. 睑内翻、倒睫
- B. 角膜血管翳形成
- C. 合并细菌感染
- D. 上睑下垂
- E. 角膜缘滤泡瘢痕化

正确答案：A, B, E

29、多选 慢性细菌性结膜炎发病原因包括（）。

- A. 急性结膜炎治疗不当
- B. 毒力不强的细菌感染
- C. 不良环境刺激
- D. 慢性泪囊炎
- E. 慢性鼻炎

正确答案：A, B, C, D, E

30、单选 患儿男性 6 天，经产道分娩，大量脓性分泌物 3 天，眼睑水肿，畏光，流泪，耳前淋巴结肿大和压痛，最可能的诊断为（）。

- A. 沙眼

B. 泡性结膜炎

- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎 **正确答案：** E

31、单选 流行性角结膜炎的分泌物为（ ）。

- A. 脓性
- B. 黏液性
- C. 水样
- D. 丝状
- E. 黏液脓性

正确答案： C

32、多选 与眼内出血有关的青光眼（ ）。

- A. 前房出血
- B. 血影细胞性青光眼
- C. 房角后退性青光眼
- D. 溶血性青光眼
- E. 血铁沉着性青光眼

正确答案： A, B, D, E

参考解析： 与眼内出血有关的青光眼包括前房出血、血影细胞性青光眼、溶血性青光眼、血铁沉着性青光眼等。

33、多选 增加葡萄膜巩膜通道房水外流（ ）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案： A, C, D

34、单选 正常 24 小时眼压波动范围（ ）。

- A. 10~21mmHg
- B. ≤ 5 mmHg
- C. ≤ 8 mmHg
- D. > 5 mmHg
- E. > 8 mmHg

正确答案： C

35、单选 沙眼局部用药疗程至少为（ ）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周

E. 10~12 周

正确答案：E

36、单选 原发性开角型青光眼早期视野（）。

A. 生理盲点扩大

B. 旁中心暗点

C. 环形暗点

D. 管状视野

E. 相对暗点

正确答案：B

37、单选 胬肉侵入角膜近瞳孔区时首先考虑的治疗方法（）。

A. 射线照射

B. 手术切除

C. 局部滴眼液

D. 局部涂眼膏

E. 局部应用丝裂霉素 C

正确答案：B

38、单选 虹膜根部离断最常见的原因是（）。

A. 虹膜睫状体挫伤

B. 睫状体剥离术后

C. 房角后退

D. 虹膜周边切除术后

E. 先天虹膜缺损

正确答案：A

39、单选 患者女性，32 岁，双眼异物感 3 个月，眼胀 1 周。检查：双眼视力 0.8，结膜轻度充血，角膜透明，前房正常，晶状体透明，杯盘比 0.4，眼压 28mmHg，病史中用地塞米松眼液 2 个月。最恰当的处理（）。

A. 停用地塞米松眼液

B. 行青光眼外引流手术

C. 停用地塞米松眼液，加用贝特类眼液

D. 停用地塞米松眼液，加用毛果芸香碱眼液

E. 改用典必殊眼液

正确答案：C

参考解析：激素导致的青光眼首先停用地塞米松眼液，同时药物降低眼压处理。

40、单选 沙眼的病原体不包括（）。

A. Ba 抗原型沙眼衣原体

B. B 抗原型沙眼衣原体

C. D 抗原型沙眼衣原体

D. C 抗原型沙眼衣原体

E. A 抗原型沙眼衣原体

正确答案：C

参考解析：沙眼的病因多为 A、B、C 或 Ba 抗原型沙眼衣原体所致。D~K 抗原型沙眼衣原体主要引起包涵体性结膜炎。

41、单选 前房角是指（）。

A. 虹膜之后与睫状体之间的间隙

B. 角膜之后的周边部分

C. 巩、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝

D. 角膜与虹膜睫状体之夹角

E. 巩膜与虹膜睫状体之夹角

正确答案：C

42、多选 慢性滤泡性结膜炎病变主要位于（）。

A. 上穹隆

B. 上睑结膜

C. 下穹隆

D. 下睑结膜

E. 上下睑结膜弥漫病变

正确答案：C, D

43、单选 超急性细菌性结膜炎发病在（）。

A. 12 小时内

B. 24 小时内

C. 3 天内

D. 7 天内

E. 14 天内

正确答案：B

44、单选 结膜炎的治疗中哪项是错误的（）。

A. 冲洗结膜囊

B. 冷敷

C. 局部点用抗生素

D. 全身应用抗生素

E. 遮盖患眼

正确答案：E

45、单选 下列属于恶性肿瘤的是（）。

A. 结膜色素痣

B. 结膜鳞状细胞癌

C. 结膜乳头状瘤

D. 结膜皮样瘤

E. 以上均是

正确答案：B

46、多选 闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制（）。

- A. 刺激导致眼部自主神经功能的紊乱
- B. 交感一副交感系统失去平衡
- C. 刺激瞳孔扩大
- D. 刺激瞳孔缩小
- E. 周边虹膜触碰摩擦小梁组织

正确答案：A, B, C, E

参考解析：闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制包括刺激直接或间接引起眼部自主神经功能的紊乱，交感一副交感系统失去平衡使得瞳孔扩大并增加瞳孔阻滞；睫状肌调节痉挛，推虹膜根部向前；或周边虹膜触碰摩擦小梁组织，以及眼局部血管舒缩功能失调，共同导致了狭窄的房角阻塞关闭，促使青光眼发病。

47、单选 包涵体性结膜炎潜伏期（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：A

48、单选 青光眼的临床诊断最基本的检查项目不包括以下（）。

- A. 眼压
- B. 房角
- C. 视野
- D. 视盘
- E. 角膜

正确答案：E

49、单选 与免疫有关的结膜病不包括（）。

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 过敏性结膜炎
- C. 泡性结膜炎
- D. 滤泡性结膜炎
- E. 春季卡他

正确答案：A

50、单选 角膜损伤最常见的临床表现是（）。

- A. 角膜上皮擦伤、基质层水肿
- B. 角膜后羊脂状 KP

- C. 角膜血染
- D. 角膜后色素沉着
- E. 角膜为浅点状混浊

正确答案：A

51、填空题 视神经可分为（）、（）、（）、（）四部分。

正确答案：眼内段；眶内段；管内段；颅内段

52、单选 原发性开角型青光眼中期视野（）。

- A. 生理盲点扩大
- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 管状视野
- E. 相对暗点

正确答案：C

53、单选 急性闭角型青光眼发病因素不包括（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 前房浅
- D. 房角窄
- E. 晶状体厚

正确答案：B

54、单选 先天性青光眼的临床表现除外（）。

- A. 角膜增大
- B. 前房浅
- C. 畏光、流泪
- D. 青光眼杯进行性扩大
- E. 眼压升高

正确答案：B

参考解析：先天性青光眼表现包括角膜增大、畏光、流泪、特征性深前房、青光眼杯进行性扩大、眼压升高。

55、单选 急性前葡萄膜炎的治疗最好首选（）。

- A. 1%阿托品眼膏
- B. 2%后马托品眼膏
- C. 5%去氧肾上腺素
- D. 0.1%肾上腺素
- E. 1%阿托品眼药水

正确答案：B

56、单选 闭角型青光眼的促发因素中，不包括（）。

- A. 情绪波动

- B. 过度疲劳
- C. 近距离过度用眼
- D. 暗室环境
- E. 瞳孔缩小

正确答案：E

参考解析：闭角型青光眼的促发因素中常包括情绪波动、过度疲劳、近距离过度用眼、暗室环境、全身疾病。

57、单选 高眼压症经过长期随访，可能发展为青光眼的比例约（）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案：C

58、填空题 同侧偏盲是指两眼视野缺损的（）、（）和（）均相同。

正确答案：部位；大小；方向

59、多选 先天性青光眼的表现包括（）。

- A. 角膜增大
- B. 前房加深
- C. 畏光、流泪
- D. 球形晶状体
- E. 眼压升高

正确答案：A, B, C, E

参考解析：先天性青光眼的临床表现包括畏光、流泪、眼睑痉挛；角膜增大、前房加深；眼压升高和特征性深前房。

60、单选 剥脱性青光眼中灰白色斑片样物质不会见于（）。

- A. 晶状体前囊中央
- B. 房角
- C. 晶状体悬韧带
- D. 晶状体前囊中央与周边的区域
- E. 睫状体

正确答案：D

61、单选 眼外伤所致的青光眼包括（）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征
- C. 青光眼睫状体炎综合征
- D. 广泛视网膜缺血所致青光眼
- E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：B

62、单选 沙眼的后遗症与并发症下列哪项是错误的（）。

- A. 睑内翻及倒睫
- B. 眼干燥症
- C. 慢性泪囊炎
- D. 虹膜后粘连
- E. 角膜溃疡

正确答案：D

63、单选 急性期或重症沙眼全身用药疗程（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：B

64、多选 容易出现球结膜下出血的是（）。

- A. 春季结膜炎
- B. 慢性细菌性结膜炎
- C. 腺病毒性角结膜炎
- D. 沙眼
- E. 流行性出血性角结膜炎

正确答案：C, E

65、多选 对流行性角结膜炎的临床特点，说法错误的是（）。

- A. 潜伏期 5~7 天，发病 5~7 天达到高峰，持续 3~4 周
- B. 睑球结膜显著充血，大量出血，睑结膜及穹隆大量滤泡，耳前淋巴结肿大
- C. 上皮型角膜炎的发生是病毒在角膜上皮内增殖所致
- D. 角膜中央区上皮下及浅基质层斑点状浸润一般不消退，遗留永久瘢痕
- E. 传染性强，发病后 10 天内应注意隔离

正确答案：B, D

参考解析：流行性角结膜炎结膜下出血少见。流行性出血性角结膜炎常见大量结膜下出血。流行性角结膜炎患者角膜中央区上皮下及浅基质层斑点状浸润与角膜基质对病毒抗原的免疫反应有关，在数月或数年后逐渐吸收。

66、单选 下列都属于青光眼特征性视神经损害，除外（）。

- A. 视盘凹陷加深扩大
- B. 盘沿宽窄不一
- C. 上下盘沿变窄
- D. 视盘水肿
- E. 视盘出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605212210341011211>