

2023-24 年辽宁省宽甸满族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版含答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

- A: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加
- B: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药
- C: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- D: 氟西汀应于每日早餐后服用

答案：B

2. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 阵发性室上性心动过速
- B: 室性期前收缩
- C: 心室颤动
- D: 心房颤动

答案：D

3. 服用伐地那非后，如果舌下含服硝酸异山梨酯，建议服药间隔时间应为

- A: 48 小时
- B: 4 小时
- C: 1 周
- D: 24 小时

答案：D

4. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

- A: 氯喹
- B: 利妥昔单抗
- C: 环孢素
- D: 硫唑嘌呤

答案：B

5. 为查询妊娠及哺乳期妇女用药注意事项，可首选的书籍是

- A: 《药物治疗学：病理生理学的方法》
- B: 《注射药物手册》
- C: 《药物流行病学》
- D: 《新编药物学》

答案：A

6. 患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 沙丁胺醇的不良反应
- B: 氨氯地平的不良反应
- C: 布地奈德剂量太大

D: 硝酸甘油剂量不足

答案：A

7. 缓解视疲劳可选用的药物是()

A: 氧氟沙星滴眼液

B: 酞丁安滴眼液

C: 羟甲基纤维素钠滴眼液

D: 色甘酸钠滴眼液

答案：C

8. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

A: 泛昔洛韦

B: 双歧杆菌

C: 山莨菪碱

D: 庆大霉素

答案：C

9. 正常人对铁剂的吸收率为

A: 10%~20%

B: 0.4

C: 0.3

D: 10%~30%

答案：A

10. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

A: 发作间歇期

B: 首次发作期

C: 急性发作期

D: 痛风性肾病治疗期

答案: C

11. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 叶酸拮抗剂

B: 苯巴比妥

C: 雌激素、孕激素、雄激素

D: 沙利度胺

答案: D

12. 雷洛昔芬能有效地抑制破骨细胞活性，降低骨转换至妇女绝经前水平，其正确的用法与用量是

A: 60mg, bid

B: 60mg, tid

C: 60mg, q4h

D: 60mg, qd

答案: D

13. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

A: 氢氧化铝

B: 氧化镁

C: 碳酸氢钠

D: 碳酸镁

答案: C

14. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- D: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

答案：C

15. 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸，减少尿酸的生成

- A: 秋水仙碱
- B: 丙磺舒
- C: 阿司匹林
- D: 别嘌醇

答案：D

16. 伴痛风者禁用()。

- A: 利尿剂（噻嗪类）
- B: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- C: 利尿剂（袢利尿药）
- D: ACEI

答案：A

17. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 阿卡波糖
- B: 格列喹酮

C: 比格列酮

D: 二甲双胍

答案: B

18. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

A: 替米沙坦

B: 二甲双胍

C: 别嘌醇

D: 奥利司他

答案: B

19. 药师应对"患者投诉", 下列说法不正确的是

A: 尽快将投诉人带离现场

B: 保存有形证据

C: 接待者应举止大方, 行为端庄

D: 当事人需要亲自接待

答案: D

20. 患者接受索拉非尼治疗时, 药师应重点监测的不良反应是 ()

A: 生殖系统毒性

B: 肺纤维化

C: 心脏毒性

D: 肝脏毒性

答案: A

21. 血红蛋白(HGB)正常参考区间是

A: (15.0~20.0) ×

B: 170~200g/L

C: 180~220g/L

D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

答案：B

22. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

A: 伊马替尼片

B: 头孢辛酯片

C: 莫沙必利片

D: 双氯芬酸钠片

答案：C

23. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

A: 血糖升高

B: 低镁血症

C: 高钾血症

D: 定向力障碍、意识混乱

答案：B

24. 结肠癌

A: 上皮细胞

B: 真菌

C: 红细胞

D: 白细胞增多

答案：C

25. 常年性过敏性鼻炎的主要吸入性变应原不包括

A: 尘埃

B: 动物皮毛

C: 真菌

D: 鱼虾

答案：D

26. 就餐时随第一、二口食物给药的是

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 瑞格列奈

答案：A

27. 抗肿瘤药物所引起的骨髓抑制，需要使用 G-CSF 的指征为

A: $WBC < 1.5 \times 10^9/L$

B: $WBC < 1.0 \times 10^9/L$

C: $WBC < 0.5 \times 10^9/L$

D: $WBC < 2.0 \times 10^9/L$

答案：D

28. (2017 年真题) 患者, 77 岁, 因感冒发热咳嗽, 自服酚麻美敏片、维 C 银翘片, 三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是什么 ()

A: 维生素

B: 对乙酰氨基酚

C: 氯苯那敏

D: 银翘

答案：C

29. 由药剂师双人核对监测

- A: 患者执行医嘱差错
- B: 医师处方差错
- C: 药师调配处方差错
- D: 护士执行医嘱差错

答案：C

30. 主要用于哮喘合并慢阻肺以及慢阻肺长期治疗的药品是

- A: 氨茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 噻托溴铵
- D: 异丙托溴铵

答案：C

31. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是()

- A: 25
- B: 33.3
- C: 30
- D: 10

答案：A

32. 属于容积性泻药的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖
- D: 甘油栓

答案：A

33. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: C 级

B: D 级

C: B 级

D: A 级

答案: C

34. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()。

A: 肯定

B: 很可能

C: 可能

D: 可能无关

答案: A

35. 口服铁剂宜选用

A: 1 价铁

B: 2 价铁

C: 3 价铁

D: 4 价铁

答案: B

36. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

A: 钙剂+维生素 D+降钙素

B: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素

C: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐

D: 钙剂+维生素 D+雌激素

答案：B

37. 某患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75kg，临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L，糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 胰岛素

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案：C

38. 属于胃食管反流病的食管外症状的是（）（消化性溃疡病的治疗）

A: 哮喘

B: 上腹部烧灼感

C: 烧心

D: 反流

答案：A

39. 静脉注射给药的外文缩写是

A: ivgtt

B: im

C: iv

D: i. h

答案：C

40. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 氯吡格雷
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 氨氯地平

答案：D

41. 给药 1 次后可避孕 1 个月的药物是

- A: 甲地孕酮硅胶环
- B: 口服低剂量孕激素避孕药
- C: 探亲避孕药
- D: 长效复方口服避孕药

答案：D

42. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于()。

- A: 药品储存环节
- B: 发药环节
- C: 调配处方环节
- D: 接待投诉环节

答案：B

43. 下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

- A: 成人 $8.0 \times 10^9 / L$
- B: 成人 $3.0 \times 10^9 / L$
- C: 新生儿 $16.0 \times 10^9 / L$
- D: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$

答案：B

44. 不仅能阻止早期炎症反应，且能稳定肥大细胞等炎症细胞，阻止组胺及其他炎症介质和细胞因子释放，阻止嗜酸性粒细胞的趋化、浸润，从而抑制或减轻晚期的炎症反应

A: 泼尼松片

B: 萘甲唑林滴鼻液

C: 氯雷他定片

D: 孟鲁司特钠片

答案：C

45. 患者，女，35 岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 肝毒性

C: 肾毒性

D: 心脏相关风险

答案：A

46. 阿糖胞苷属于

A: 抗病毒药

B: 抗真菌药

C: 抗过敏药

D: 抗肿瘤药

答案：D

47. 抗高血压药物属于利尿剂的是（）

A: 依那普利

B: 氢氯噻嗪

C: 缬沙坦

D: 氨氯地平

答案：B

48. 对缺铁性贫血者应选用的药物是

A: 烟酸

B: 叶酸+维生素 B12

C: 富马酸亚铁

D: 维生素 B12

答案：C

49. 不宜采用放射性 ^{131}I 治疗的甲亢患者是

A: 老年甲亢患者

B: 妊娠期、哺乳期女性甲亢患者

C: 成人 Graves 甲亢伴甲状腺 II 度以上肿大患者

D: 甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少患者

答案：B

50. 过敏性疾病、皮肤病与寄生虫病可呈现

A: 中性粒细胞增多

B: 单核细胞增多

C: 淋巴细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

51. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 溴己新
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：C

52. 吸附力强、可阻止毒物吸收的是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 淀粉溶液
- D: 1%硫酸镁溶液

答案：B

53. （2020 年真题）患者，女，65 岁，间断腹胀、纳差 6 年，因病情加重伴精神恍惚 3 天为主诉入院，实验室检查：ALT200UL，AST320UL，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史 20 年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史 10 年，便秘多年，3~4 天排便一次。

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 水溶性维生素
- C: 辅酶 A
- D: 维生素 B1

答案：A

54. 适用轻中度肾功不全者的是由肝胆排泄的

- A: 格列喹酮

B: 格列本脲

C: 甲苯磺丁脲

D: 格列吡嗪控释片

答案：A

55. 可引起视力模糊的是

A: 抗过敏药

B: 东莨菪碱

C: 阿米洛利

D: 右美沙芬

答案：B

56. 治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是：

A: 安全性

B: 经济型

C: 依从性

D: 有效性

答案：C

57. 中等强度镇痛选用

A: 佐匹克隆

B: 多奈哌齐

C: 丙戊酸钠

D: 布桂嗪

答案：D

58. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 肝素

答案：A

59. 氯喹与链霉素合用

- A: 根治间日疟
- B: 加重神经肌肉接头抑制作用
- C: 诱发癫痫
- D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：B

60. 药师与患者进行沟通时的技巧不包括

- A: 认真聆听，使用通俗易懂的语言
- B: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- C: 尽量使用专业性术语
- D: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

答案：C

61. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

- A: 选择性 α_1 激动剂
- B: 5α 还原酶抑制剂
- C: α_1 阻断剂
- D: 抗胆碱药物

答案：D

62. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 50mg
- B: 90mg
- C: 100mg
- D: 75mg

答案：C

63. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

- A: 4~5 周
- B: 1~2 周
- C: 2~4 周
- D: 2~3 周

答案：C

64. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 注射用阿莫西林
- C: 左氧氟沙星片
- D: 注射用头孢曲松钠

答案：B

65. 牙齿黄染及牙釉质发育不全

- A: 氯霉素
- B: 米诺环素
- C: 庆大霉素

D: 阿奇霉素

答案：B

66. 急诊处方印刷用纸为

A: 白色

B: 淡绿色

C: 淡红色

D: 淡黄色

答案：D

67. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 μ mol / L。医师给出的治疗方案是

A: 不需要调整给药方案

B: 经验剂量的 3 / 4

C: 经验剂量的 1 / 2

D: 延长给药间隔时间

答案：A

68. 弥漫性青铜色色素沉着的是

A: 博来霉素

B: 白消安

C: 氟尿嘧啶

D: 柔红霉素

答案：B

69. 患者，男，72 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 长期服用糖皮质激素
- B: 维生素 D 中毒
- C: 老年性骨质疏松症
- D: 长期服用抗癫痫药

答案：C

70. 阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是（）

- A: 颠茄
- B: 美金刚
- C: 多奈哌齐
- D: 卡巴拉汀

答案：A

71. 患者，女，42 岁。临床诊断“小三阳”，其临床意义是

- A: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- B: HBsAg 阳性
- C: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性
- D: HBeAg 阳性

答案：C

72. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

- A: 1% 硫酸镁

B: 1%氯化钠

C: 3%过氧化氢

D: 1%硫酸铜

答案：A

73. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A: 苯妥英钠

B: 氯氮平

C: 阿司匹林

D: 胰岛素

答案：B

74. (2015 年真题) 下列药品宜冷处贮存但不宜冷冻的是 ()。

A: 卡前列甲酯栓剂

B: 甘露醇注射液

C: 双歧三联活菌制剂

D: 氯化钾注射液

答案：C

75. 下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

A: 口服左氧氟沙星和硫酸亚铁

B: 磺胺甲噁唑一甲氧苄啶

C: 左旋多巴一苄丝肼

D: 头孢哌酮一舒巴坦

答案：A

76. (2018 年真题) 患者, 男, 16 岁, 因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗, 用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是 ()

- A: 浓度 500U/ml, 皮内注射 0.1ml
- B: 浓度 5000U/ml, 皮内注射 0.1ml
- C: 浓度 5000U/ml, 肌肉注射 0.1ml
- D: 浓度 500U/ml, 肌肉注射 0.1ml

答案: A

77. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- B: 受精后 3 周~3 个月接触药物最易发生先天畸形
- C: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形
- D: 受精后的半个月几乎见不到药物的致畸作用

答案: C

78. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 维生素 B
- D: 利血平

答案: A

79. 黄体酮用于输尿管结石

- A: 盲目联合用药
- B: 过度治疗用药
- C: 无适应证用药
- D: 超适应证用药

答案：D

80. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 腹胀
- B: 高血脂
- C: 高血压
- D: 肝功能异常

答案：D

81. 患者溃疡治愈后，因膝关节痛，需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡发生风险，首选的预防药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 替普瑞酮
- D: 枸橼酸铋钾

答案：A

82. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主
- B: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测
- C: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- D: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药

答案：C

83. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肝功能不全者

B: 肾功能不全者

C: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg/L 并且长疗程的患者

D: 老年人

答案：A

84. 容易引起脱发的是（）

A: 阿霉素

B: 吉非替尼

C: 氟尿嘧啶

D: 博来霉素

答案：A

85. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

A: 苯二氮类药物

B: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

C: 5-HT_{1A} 受体部分激动剂

D: 三环类药物

答案：A

86. 儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 4.2~6.5mmol/L

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/605312213132012033>