

2023-24 年江苏省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库大全【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，35 岁，因支气管哮喘入院，经正规治疗后病情缓解，仅偶尔胸闷，出院时医嘱如下。

- A: 白三烯受体拮抗剂
- B: β 受体激动剂
- C: β 受体阻断药
- D: 抗胆碱药物

答案：C

2. 某溶液的浓度为 1: 100，其含义为

- A: 100g 溶液中含有 1g 溶质
- B: 100ml 溶液中含有 1ml 溶质
- C: 1L 溶液中含有的溶质为 0.1mol
- D: 100ml 溶液中含有 1g 溶质

答案：D

3. 博来霉素的主要毒副作用是（）

- A: 出血性膀胱炎
- B: 溶血性尿毒症
- C: 肺纤维化
- D: 心脏毒性

答案：C

4. 患者,男,60 岁,因上臂出现湿疹到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 利巴韦林软膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 特比萘芬乳膏

答案: C

5. (2019 年真题) 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者, 不宜选用的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 坦索罗辛
- D: 托特罗定

答案: D

6. IV 期临床试验是在广泛使用条件下, 考察药品的疗效和不良反应, 试验样本数常见病不少于

- A: 2000 例
- B: 3000 例
- C: 1000 例
- D: 4000 例

答案: A

7. 流行性感冒发病后 48 小时内使用效果最好的抗病毒药是

- A: 金刚烷胺
- B: 布洛芬
- C: 奥司他韦

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

8. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

A: 社区获得性肺炎

B: 肺结核

C: 支气管炎

D: 哮喘

答案：A

9. 早期 AD 患者选用

A: 司来吉兰

B: 普拉克索

C: 金刚烷胺

D: 加兰他敏

答案：D

10. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 昂丹司琼

B: 雷尼替丁

C: 维生素 B6

D: 奥美拉唑

答案：A

11. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 世界卫生组织的网址是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: org. cn

B: org. cn

C: www. cp

D: www. cm

答案：C

12. 运动员长期使用可促进肌肉发达，但易导致不孕和心脑血管疾病的兴奋剂是

A: 苯丙酸诺龙

B: 氢氯噻嗪

C: 可待因

D: 人促红细胞生成素

答案：A

13. 长期服用苯妥英钠，可能导致

A: A / G 比值<1

B: 血清碱性磷酸酶升高

C: 丙氨酸氨基转移酶升高

D: γ -谷氨酰转移酶升高

答案：D

14. 下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 克林霉素

D: 咪康唑

答案：B

15. 静滴 50% 葡萄糖注射液 100ml+胰岛素 20U，用于

- A: 解救乙醇中毒
- B: 解救可待因中毒
- C: 解救丙咪嗪中毒
- D: 解救硝西泮中毒

答案：A

16. 5% 葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是()

- A: 30
- B: 25
- C: 33.3
- D: 10

答案：B

17. 以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

- A: 依地酸钙钠可"驱铅"
- B: 二巯丙醇拮抗青霉胺
- C: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒
- D: 口服氯化铵促使苯丙胺排泄

答案：A

18. 敌百虫中毒应

- A: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙
- B: 静脉滴注烟酰胺
- C: 禁止使用肱类复能剂
- D: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

答案：D

19. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 对文献进行评价、分析和整理
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：C

20. (联合用药) 普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于

- A: 超适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 非适应证用药
- D: 超剂量用药

答案：C

21. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：B

22. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 烟
- B: 食醋
- C: 浓茶
- D: 酒

答案：C

23. 肾功能不全而肝功能正常者宜选用的药物是

- A: 肾毒性小、经肝排泄的药物
- B: 经肝肾双途径消除的药物
- C: 肝毒性小、经肾排泄的药物
- D: 经肝肠循环消除的药物

答案：B

24. 服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

- A: 抗利尿药
- B: 抗尿结石药
- C: 利胆药
- D: 苦味健胃药

答案：D

25. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

- A: 《新编药理学》
- B: 《中华人民共和国药典》
- C: 《梅氏药物副作用》
- D: 《中国国家处方集》

答案：C

26. 患者用药咨询的内容是

- A: 新药信息
- B: 治疗药物监测
- C: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- D: 自我保健

答案：C

27. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

- A: 洛哌丁胺
- B: 药用炭
- C: 莫沙必利
- D: 广谱抗生素

答案：D

28. 曲唑酮的作用机制为

- A: 抑制 NE 再摄取
- B: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取
- C: 抑制 5-HT 再摄取
- D: 抑制单胺氧化酶

答案：C

29. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 成本-效果分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本法
- D: 最大成本法

答案：A

30. 春季卡他性结膜炎适宜选用

- A: 利巴韦林滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 妥布霉素滴眼液
- D: 2%色甘酸钠滴眼液

答案：D

31. 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是

- A: 消渴丸联用格列本脲片
- B: 鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片
- C: 新癬片联用吡哆美辛胶囊
- D: 曲克芦丁片联用维生素 C 片

答案：D

32. 使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血，元素铁的预防量是

- A: 60mg tid
- B: 60mg bid
- C: 60mg qd
- D: 100mg/次

答案：C

33. 利尿降压药的常见不良反应是

- A: 首剂现象
- B: 体位性低血压
- C: 水、电解质紊乱
- D: 咳嗽

答案：C

34. 进食高蛋白食物可减轻药品不良反应的是

- A: 泼尼松
- B: 格列本脲
- C: 硫酸亚铁
- D: 西咪替丁

答案：A

35. 患者女,32 岁,一天前发热体温 39.8℃全身乏力,四肢疼痛近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血,血常规检查白细胞计数偏低,中性粒细胞比例低,该患者最适宜选用的药物是()

- A: 阿昔洛韦片
- B: 奥司他韦胶囊
- C: 金刚烷胺片
- D: 利巴韦林片

答案：B

36. (2019 年真题) 患者,女,76 岁,慢性阻塞性肺病病史 10 年,一年来多次因急性加重入院,予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是

- A: 头孢他啶
- B: 阿米卡星
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢唑林

答案：A

37. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下,血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: >90g/L
- B: <30g/L
- C: 61~90g/L
- D: 31~60g/L

答案：B

38. 对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

- A: 伊维菌素
- B: 噻嘧啶
- C: 枸橼酸哌嗪
- D: 甲苯咪唑

答案：B

39. 患者,男,45 岁,因消化不良（上腹饱胀,餐后明显）来药店咨询。下列说法错误的是（）

- A: 进餐时不要摄入过多的液体
- B: 应除外器质性疾病
- C: 可用助消化药对症治疗
- D: Hp 感染是引起消化不良的常见原因

答案：D

40. 目前推荐治疗失眠的一线药物为（）

- A: 佐匹克隆
- B: 艾司唑仑
- C: 多塞平
- D: 硝西泮

答案：A

41. 属于 5-HT_{1A} 受体部分激动剂的是

- A: 舍曲林
- B: 艾司唑仑
- C: 阿米替林

D: 丁螺环酮

答案: D

42. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

A: 华法林片 3mgqdp0

B: 氯吡格雷片 75mgqdp0

C: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0

D: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0

答案: C

43. 预混胰岛素 30R 的组成为()

A: 70%超短效胰岛素, 30%中效胰岛素

B: 70%中效胰岛素, 30%短效胰岛素

C: 30%超短效胰岛素, 70%中效胰岛素

D: 30%中效胰岛素, 70%短效胰岛素

答案: B

44. 配制下列化疗药时只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是()

A: 博来霉素

B: 环磷酰胺

C: 奥沙利铂

D: 依托泊苷

答案: C

45. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

- A: 20~30min
- B: 15~30min
- C: 10~20min
- D: 5~10min

答案：B

46. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- B: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
- C: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
- D: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

答案：A

47. 卡比马唑的维持剂量是一日

- A: 15~60mg
- B: 30~60mg
- C: 25~80mg
- D: 5~15mg

答案：D

48. 一般由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal: 1gN
- C: 100kcal: 1gN
- D: NPC7: 3

答案：D

49. 沟通时多使用服务用语、通俗易懂的语言、短句子和开放式提问方式

- A: 注意语言的表达
- B: 认真聆听
- C: 注意掌握时间
- D: 关注特殊人群

答案：A

50. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 硫酸镁
- B: 噻氯匹定
- C: 维生素 B1
- D: 沙丁醇胺

答案：D

51. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- B: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- C: 与食物和药物相互作用小
- D: 需监测 INR

答案：D

52. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 $50\mu\text{mol} / \text{L}$ (正常参考范围 $45\sim 84\mu\text{mol} / \text{L}$)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 普罗布考
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案：B

53. 隔日 1 次用药的外文规范缩写是

- A: qh
- B: qod
- C: qn
- D: qd

答案：B

54. 引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

- A: 基础疾病
- B: 性别
- C: 遗传因素
- D: 年龄

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

55. 对慢性中重度铅中毒患者给予

A: 补充蛋白质

B: 卫生教育

C: 驱铅治疗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 糖皮质激素

答案：C

56. 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是()

A: 替硝唑含漱液

B: 西地碘含片

C: 地塞米松粘贴片

D: 氯己定含漱液

答案：B

57. 可致驾驶员嗜睡、神志低沉的是

A: 东莨菪碱

B: 阿米洛利

C: 阿司匹林

D: 氯苯那敏

答案：D

58. 第二类精神药品处方印刷用纸为

A: 淡绿色

B: 淡黄色

C: 白色

D: 淡红色

答案：C

59. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

A: 度他雄胺

B: 索利那新

C: 哌唑嗪

D: 特拉唑嗪

答案: D

60. 患者，女，50 岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

A: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能

B: 用药前应进行 RAS 基因筛查

C: 从第 2 周起，每次给药 100mg，静脉滴注 30min

D: 每周给药 1 次，第 1 周给药剂量 200mg，静脉滴注 90min

答案: B

61. 使用消化性溃疡治疗药物的注意事项，因长期应用可导致腹泻或便秘的药物是

A: 硫糖铝

B: 丙谷胺

C: 铋剂

D: 铝碳酸镁

答案: D

62. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是以控制关节炎症(红肿、疼痛)为目的，尽早使用抗炎药

A: 痛风性肾病治疗期

B: 首次发作期

C: 急性发作期

D: 发作间歇期

答案: C

63. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

- A: 药品习用名
- B: 药品通用名
- C: 药品商标名
- D: 药品化学名

答案：B

64. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

- A: 50 滴
- B: 15 滴
- C: 25 滴
- D: 7 滴

答案：C

65. 心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 美托洛尔
- D: 硝酸甘油

答案：C

66. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 甘精胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 阿卡波糖

答案: D

67. (2017 年真题) 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是 ()

- A: 氯己定含漱液
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 西地碘含片
- D: 替硝唑含漱液

答案: C

68. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 胃溃疡
- B: 慢性肾炎
- C: 中毒性肝炎
- D: 急性胰腺炎

答案: C

69. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 小柴碱
- B: 鞣酸蛋白
- C: 药用炭
- D: 洛哌丁胺

答案：D

70. 伪膜性肠炎

- A: 真菌
- B: 红细胞
- C: 上皮细胞
- D: 白细胞增多

答案：C

71. 吗啡的禁用范围是

- A: 新生儿
- B: 1 岁以下婴儿
- C: 3 岁以下幼儿
- D: 婴幼儿

答案：B

72. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 肺炎型

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 病毒型

C: 神经型

D: 胃肠型

答案：C

73. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

- A: 脂肪
- B: 食醋
- C: 食盐
- D: 酒

答案：B

74. 防心绞痛药物

- A: 去氨加压素
- B: 硝酸甘油
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 甘草合剂

答案：B

75. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是：

- A: 福辛普利
- B: 美托洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 地高辛

答案：C

76. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 嗜碱性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞减少

D: 嗜酸性粒细胞减少

答案: A

77. 由国家基本药物临床应用指南和处方集编委会主编的是

A: 《中国国家处方集》

B: 《国家基本药物处方集》

C: 《中国药典临床用药须知》

D: 《医师案头参考》

答案: B

78. 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年。近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 copies/ml，ALT122U/L。拟予以抗病毒治疗，首选的药物是

A: 阿糖腺苷

B: 泛昔洛韦

C: 利巴韦林

D: 恩替卡韦

答案: D

79. 具有留钾作用的利尿药是

A: 阿米洛利

B: 坦洛新

C: 非那雄胺

D: 乙酰唑胺

答案: A

80. 脑梗死的分期恢复期

A: 1~3 个月

B: 2 周

C: 1 个月内

D: 1~6 个月

答案: D

81. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

A: 呋塞米

B: 依那普利

C: 硝酸甘油

D: 阿奇霉素

答案: B

82. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

A: 胃蛋白酶？

B: 胰蛋白酶？

C: 凝血酶？

D: 门冬酰胺酶？

答案: B

83. 作用于核酸转录的药物是

A: 放线菌

B: 培美曲塞

C: 顺铂

D: 依托泊苷

答案: A

84. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mg tidpo，罗格列酮片 2mg bidpo，甲钴胺片 0.5mg tidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mg bidpo。

- A: 甲钴胺片 0.5mg tidpo
- B: 二甲双胍片 0.5gtidpo
- C: 格列美脲片 2mg tidpo
- D: 罗格列酮片 2mg bidpo

答案：C

85. 可在尿中结晶，送服药物时要喝约 250ml 水，服药后也要多喝水，保持高尿流量的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 头孢哌酮
- C: 卡马西平
- D: 特拉唑嗪

答案：A

86. 饮酒可使其吸收明显减少的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 维生素 B1、维生素 B2
- C: 利血平
- D: 卡马西平

答案：B

87. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 格列美脲片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿卡波糖片

C: 瑞格列奈片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/605331320132012033>