

2022年-2023年执业药师之西药学专业二高分通关题库 A4 可打印版

单选题（共 50 题）

1、用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

- A. 利福平
- B. 乙胺丁醇
- C. 异烟肼
- D. 链霉素
- E. 对氨基水杨酸钠

【答案】 A

2、可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物

- A. 碘解磷定
- B. 阿托品
- C. 匹鲁卡品
- D. 毒扁豆碱
- E. 新斯的明

【答案】 A

3、糖尿病选用

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 放射性碘
- C. 格列齐特
- D. 大剂量碘剂

E. 小剂量碘剂

【答案】 C

4、可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A. 环丙沙星

B. 克霉唑

C. 灰黄霉素

D. 咪康唑

E. 两性霉素 B

【答案】 A

5、铜绿假单胞菌性结膜炎常用

A. 金霉素眼膏

B. 夫西地酸滴眼剂

C. 多黏菌素 B 滴眼液

D. 1%泼尼松滴眼液

E. 两性霉素 B 滴眼剂

【答案】 C

6、用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

A. 瑞夷综合征

B. 青霉素脑病

C. 金鸡纳反应

D. 赫氏反应

E. StEvEns- Johnson 综合征

【答案】 D

7、服用后易出现呃逆、腹胀和暖气,甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是()

A. 奥美拉唑

B. 胶体果胶铋

C. 替普瑞酮

D. 复方碳酸钙

E. 法莫替丁

【答案】 D

8、下述不属于胃黏膜保护剂的是()

A. 硫糖铝

B. 谷氨酰胺

C. 枸橼酸铋钾

D. 前列腺素

E. 替普瑞酮

【答案】 B

9、(2018年真题)适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

A. 地西洋

B. 佐匹克隆

C. 苯巴比妥

D. 氟西汀

E. 咪达唑仑

【答案】 B

10、对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是()

A. 利福平

B. 卡替洛尔

C. 左氧氟沙星

D. 阿托品

E. 利巴韦林

【答案】 A

11、唑类抗真菌药()

A. 两性霉素

B. 氟康唑

C. 阿莫罗芬

D. 特比萘芬

E. 环吡酮胺

【答案】 B

12、患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超

检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

- A. 胰酶
- B. 甲氧氯普胺
- C. 多潘立酮
- D. 莫沙必利
- E. 伊托必利

【答案】 A

13、白女士，74岁。以“间断性腹胀1月余”之主诉入院。患者1个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史14年。诊断：肝硬化失代偿期、腹水(大量)。医嘱：螺内酯片20mg，口服，2次/日；注射用还原型谷胱甘肽1.2g，静脉滴注，1次/日；呋塞米片20mg，口服，1次/日；注射用胸腺肽120mg，静脉滴注，1次/日。长期服用螺内酯可导致()

- A. 高血钠
- B. 碱中毒
- C. 高血钾
- D. 高血镁
- E. 骨质疏松

【答案】 C

14、两性霉素B与()合用具有协同作用。

- A. 酮康唑
- B. 氟胞嘧啶
- C. 伊曲康唑
- D. 利福平

E. 氟康唑

【答案】 B

15、黏液性水肿选用

A. 甲状腺素

B. 丙硫氧嘧啶

C. 血管神经性水肿

D. 粒细胞下降

E. 甲状腺功能亢进症

【答案】 A

16、肝功能减退患者可按原治疗量应用而肾功能减退患者需减量使用的是查看材料

A. 青霉素

B. 红霉素

C. 异烟肼

D. 氟胞嘧啶

E. 两性霉素 B

【答案】 A

17、治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

A. 乙胺嗪

B. 酒石酸锑钾

C. 吡喹酮

D. 左旋咪唑

E. 喹诺酮

【答案】 C

18、下列关于胺碘酮的叙述，错误的是()

A. 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性

B. 对室上性和室性心律失常均有效

C. 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道

D. 对 α 、 β 受体有激动作用

E. 延长心房肌、心室肌、普肯耶纤维的 APD. ERP

【答案】 D

19、（2019 年真题）支气管哮喘急性发作时，宜使用的药物是（ ）

A. 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

B. 吸入用布地奈德混悬液

C. 孟鲁司特钠咀嚼片

D. 沙丁胺醇气雾剂

E. 噻托溴铵干粉吸入剂

【答案】 D

20、下述药物中用于拮抗肝素过量的是

A. 维生素 K1

B. 维生素

C. 鱼精蛋白

D. 氨甲苯酸

E. 氨甲环酸

【答案】 C

21、促进钙吸收()

A. 阿法骨化醇

B. 依降钙素

C. 葡萄糖酸钙

D. 阿仑膦酸钠

E. 帕米膦酸二钠

【答案】 A

22、(2017年真题)可用于治疗重度痤疮,但妊娠期妇女避免使用的药物是()

A. 克拉霉素

B. 特比萘芬

C. 异维 A 酸

D. 克罗米通

E. 环吡酮胺

【答案】 C

23、对抗香豆素过量引起出血可选用

A. 垂体后叶素

B. 维生素

- C. 鱼精蛋白
- D. 维生素 K1
- E. 氨甲苯酸

【答案】 D

24、可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A. 加替沙星
- B. 庆大霉素
- C. 甲砒霉素
- D. 多西环素
- E. 林可霉素

【答案】 B

25、（2015年真题）属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是（ ）。

- A. 阿司匹林
- B. 氯吡格雷
- C. 替罗非班
- D. 奥扎格雷
- E. 前列环素

【答案】 B

26、不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A. 阿糖胞苷
- B. 氟尿嘧啶

C. 甲氨蝶呤

D. 环磷酰胺

E. 巯嘌呤

【答案】 D

27、除非另外规定或根据能量需要而定外，建议中 / 长链脂肪乳注射液（C8～24）成人用量为按一天 1～2g 脂肪 / kg，相当于本品按一天

A. 1～3ml / kg

B. 0.25～0.5ml / kg

C. 0.75～1.0ml / kg

D. 5～10ml / kg

E. 15～20ml / kg

【答案】 D

28、属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

A. 骨质疏松症

B. Cushing 综合征体型

C. 青光眼

D. 胰腺炎

E. 消化性溃疡

【答案】 B

29、维生素 C 缺乏时引起

A. 角膜软化症

- B. 成人佝偻病
- C. 脚气病
- D. 坏血病
- E. 粗糙皮病

【答案】 D

30、患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

- A. 胰酶
- B. 甲氧氯普胺
- C. 多潘立酮
- D. 莫沙必利
- E. 伊托必利

【答案】 A

31、渗透性泻药（ ）

- A. 硫酸镁
- B. 地芬诺酯
- C. 乳果糖
- D. 甘油
- E. 胃蛋白酶

【答案】 C

32、洋地黄毒苷的半衰期是()

- A. 72 小时
- B. 7 天以上
- C. 5 天
- D. 48 小时
- E. 18 小时

【答案】 B

33、阵发性室上性心动过速首选

- A. 奎尼丁
- B. 维拉帕米
- C. 普罗帕酮
- D. 阿托品
- E. 利多卡因

【答案】 B

34、用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是()

- A. 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- B. 赖氨酸注射液
- C. 复方氨基酸注射液(20AA)
- D. 复方氨基酸注射液(18AA)
- E. 复方氨基酸注射液(9AA)

【答案】 B

35、临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

- A. 多巴酚丁胺
- B. 依那普利
- C. 米力农
- D. 地高辛
- E. 洋地黄毒苷

【答案】 D

36、治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物()

- A. 异维 A 酸
- B. 维 A 酸
- C. 阿达帕林
- D. 壬二酸
- E. 过氧苯甲酰

【答案】 B

37、刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

- A. 胰岛素
- B. 磺酰脲类
- C. 二甲双胍
- D. A 和 B 均无效
- E. A 和 B 均有效

【答案】 B

38、下列哪个药物没有散瞳作用

- A. 硫酸阿托品
- B. 托吡卡胺
- C. 毛果芸香碱
- D. 去氧肾上腺素
- E. 环喷托酯

【答案】 C

39、氢氯噻嗪的药理作用是()

- A. 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性
- B. 抑制远曲小管 Na
- C. 与醛固酮受体结合
- D. 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- E. 抑制髓袢升支粗段的 Na

【答案】 B

40、艾达司珠单抗可用来解救

- A. 阿哌沙班
- B. 华法林
- C. 达比加群
- D. 肝素
- E. 利伐沙班

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606014210032011003>