2024年云南省五华区《执业药师之西药学专业二》资格考试题库【典优】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.肝素过量所致出血的解救药物是()

A：酚磺乙胺

B：维生素K

C：鱼精蛋白

D：蛇毒血凝酶

答案：C

2.磺胺类药物的抗菌机制是

A：抑制二氢叶酸还原酶

B：改变细菌细胞膜通透性

C：抑制二氢叶酸合成酶

D：抑制四氢叶酸还原酶

答案：C

3.（2021年真题）属于5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是（）

A：吗氯贝胺

B：艾司西酞普兰

C：文拉法辛

D：马普替林

答案：C

4.利福平

A：禁用于18岁以下儿童及青少年

B：禁用于胆道阻塞患者

C：禁用于8岁以下儿童

D：禁用于早产儿、新生儿

答案：B

5.兼有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用的药物是

A：苯巴比妥

B：佐匹克隆

C：苯妥英钠

D：卡马西平

答案：A

6.可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

A：阿达帕林

B：维A酸

C：壬二酸

D：过氧苯甲酰

答案：C

7.焦虑型、夜间醒来次数较多者

A：夸西泮

B：氯美扎酮

C：氟西泮

D：谷维素

答案：C

8.人体内缺乏维生素E时会导致()

A：夜盲症

B：佝偻病

C：脚气病

D：不孕症

答案：D

9.关于地西泮的叙述，错误的是

A：抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一

B：在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

C：抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

D：是一种长效镇静催眠药物

答案：C

10.属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

A：精蛋白锌胰岛素

B：甘精胰岛素

C：普通胰岛素

D：门冬胰岛素

答案：B

11.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防MRSA感染,可选用()

A：万古霉素

B：氨曲南

C：头孢唑林

D：青霉素G

答案：A

12.可与抗菌药物联合应用的是

A：嗜热链球菌

B：地衣芽孢杆菌

C：保加利亚乳杆菌

D：嗜酸乳杆菌

答案：B

13.拓扑异构酶抑制剂

A：喜树碱类

B：环磷酰胺

C：丝裂霉素

D：顺铂

答案：A

14.以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌症

A：肝肾功能不全者

B：有子宫内膜癌症状和体征者

C：心力衰竭患者

D：正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

答案：C

15.对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A：抑制蛋白质合成

B：抑制DNA回旋酶

C：形成NAD的同系物，抑制结核菌生长

D：干扰叶酸合成

答案：C

16.羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶A的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶A还原酶（HMG—CoA还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

A: 20mg瑞舒伐他汀，每日1次

B: 10mg阿托伐他汀钙，每日1次

C: 40mg氟伐他汀，每日1次

D: 40mg各伐他汀，每日1次

答案：B

17.可用于治疗厌氧菌及产ESBL的革兰阴生杆菌感染的药物是()

A: 头孢他啶

B: 头孢米诺

C: 头孢唑林

D: 头孢呋辛

答案：B

18.急腹症、肠道失血、孕妇及经期妇女禁用()

A: 硫酸镁

B: 甘油

C: 聚乙二醇4000

D: 乳果糖

答案：A

19.属于α1受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是()

A: 度他雄胺

B：他达拉非

C：坦洛新

D：西地那非

答案：C

20.糖皮质激素隔日疗法用于()

A：湿疹

B：肾病综合征

C：变态反应性疾病

D：抑制器官移植急性排斥危象

答案：B

21.（2017年真题）患者,男,57岁,肾功能正常,既往有动脉粥样硬化,高血压合并2型糖尿病,服用下列药物后出现踝关节肿胀,到药房问询,药师提示有可能引起不良反应的药物是（）

A：阿司匹林肠溶片

B：赖诺普利片

C：格列吡嗪肠溶片

D：硝苯地平缓释片

答案：D

22.戒断症状是5-HT再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

A：长期服用致5-HT、NE、DA分解增加

B：长期服用脑内5-HT受体数目减少

C：长期服用使脑内5-HT受体敏感性下调

D：长期服用药物对5-HT受体无亲和力

答案：C

23.糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A：乳果糖

B：聚乙二醇4000

C：硫酸镁

D：甘油

答案：D

24.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A：作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

B：抗肿瘤作用比紫杉醇强

C：属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

D：多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案：D

25.广谱调血脂药物是

A：烟酸

B：吉非罗齐

C：氯贝丁酯

D：考来烯胺

答案：A

26.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A：纤维瘤

B：脑瘤

C：慢性淋巴细胞白血病

D: 恶性淋巴瘤

答案：B

27.高钠血症是指

A: 血钠＞135mmol/L

B: 血钠＞140mmol/L

C: 血钠＞130mmol/L

D: 血钠＞145mmol/L

答案：D

28.大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

A: 夫西地酸

B: 磷霉素

C: 小檗碱

D: 利奈唑胺

答案：A

29.大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿胆原呈假阳性

A: 维生素C

B: 维生素E

C: 维生素B2

D: 维生素B1

答案：D

30.不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

A: 铝碳酸镁

B: 碳酸钙

C: 氢氧化铝

D: 三硅酸镁

答案：A

31.下列哪种头孢菌素为口服剂型

A: 头孢哌酮

B: 头孢替安

C: 头孢克洛

D: 头孢吡肟

答案：C

32.关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 易引起直立性低血压

B: 小剂量可促进头发生长，用于治疗素源性胞发

C: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

D: 能降低血清前列腺特异性抗原（PS）水平

答案：A

33.患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

A: 餐前服用比餐后效果佳

B: 餐后服用比餐前效果佳

C: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等

D: 停药后复发率高

答案：A

34.与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

A: 红霉素

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 克林霉素

答案：C

35.庚酸炔诺酮()

A: 抗着床

B: 促进蛋白质合成

C: 减少精子数目

D: 抑制排卵作用

答案：D

36.控制哮喘急性发作的首选药是

A: β 受体激动剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: M胆碱受体阻断剂

D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

37.与青霉素相比，阿莫西林()

A: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强

B: 对革兰阴性杆菌作用强

C: 对 β-内酰胺酶稳定

D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：B

38.常用治疗胃肠道癌，是结直肠癌的首选药之一的药物是()

A: 丝裂霉素

B: 环磷酰胺

C: 塞替派

D: 奥沙利铂

答案：D

39.属于贝丁酸类调节血脂药的是

A: 阿昔莫司

B: 依折麦布

C: 阿托伐他汀

D: 非诺贝特

答案：D

40.选择性抑制COX-2的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 布洛芬

C: 吲哚美辛

D: 塞来昔布

答案：D

41.多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A: 增加肝毒性

B: 增加心脏毒性

C: 导致坏死性结肠炎

D: 易产生沉淀

答案：D

42.关于米力农使用的叙述，错误的是

A：长期使用可降低死亡率

B：不宜用于严重瓣膜狭窄病变，肥厚型梗阻性心肌痛

C：对心房扑动、心房颤动患者，宜先用强心苷制剂控制心室率

D：用药期间应监测心率、血压，必要时调整剂量

答案：A

43.不可与氟西汀合用的是

A：肝药酶抑制剂

B：核酸合成抑制剂

C：竞争性 β-内酰胺酶抑制剂

D：单胺氧化酶抑制剂

答案：D

44.属于5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是()。

A：特拉唑嗪

B：普适泰

C：酚妥拉明

D：度他雄胺

答案：D

45.主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A：拉米夫定

B：更昔洛韦

C：利巴韦林

D：阿德福韦酯

答案：C

46.患者，男，25岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上10点及下午4点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X线钡餐检查：十二指肠溃疡。

A: 兰索拉唑和阿莫西林

B: 哌仑西平和西咪替丁

C: 米索前列醇和四环素

D: 阿莫西林和四环素

答案：A

47.肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

A: 青霉素

B: 氟胞嘧啶

C: 异烟肼

D: 红霉素

答案：C

48.链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

A: 鱼精蛋白

B: 葡萄糖酸钙

C: 氨基己酸

D: 维生素K

答案：C

49.用于治疗水肿性疾病,当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时,可追加剂量,每日最大剂量可达600mg但一般应控制在100mg以内的利尿剂是（）

A：托拉塞米
B：布美他尼
C：依他尼酸
D：呋塞米
答案：D

50.关于地芬诺酯的叙述，不正确的是()
A：长期应用可产生依赖性
B：能提高肠张力，减少肠蠕动
C：用于急、慢性功能性腹泻
D：可吸附肠内的细菌及有毒气体
答案：D

51.用于治疗便秘，也可在结肠镜检查或X线检查时用作肠道清洁剂，与碳酸氢钠等碱性药物作用，能引起尿液变色的是
A：开塞露
B：乳果糖
C：酚酞
D：聚乙二醇4000
答案：C

52.硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()
A：肾脏排泄速度快
B：口服后吸收不完全
C：待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
D：肝内代谢转化快
答案：C

53.易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的是

A: 克拉霉素

B: 阿奇霉素

C: 红霉素

D: 氨曲南

答案：C

54.对爆发性或严重的组织胞浆菌感染首选的药物是

A: 两性霉素B

B: 灰黄霉素

C: 伏立康唑

D: 氟胞嘧啶

答案：A

55.减少房水生成，治疗青光眼可选用

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案：C

56.心律失常发生的机制是

A: 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常

B: 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

C: 心肌兴奋过度导致异常

D: 潜在起搏点搏动频率加快

答案：A

57.患者,女52岁,因“闭经1年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日1次,每次1mg,醋酸甲羟孕酮片每日1次,每次2mg。

A: 骨质疏松症

B: 血栓性静脉炎

C: 必尿系统感染四

D: 血脂异常

答案：B

58.用于白色念珠菌、隐球菌和球孢子菌等引起的感染的药物是

A: 益康唑

B: 咪康唑

C: 制霉菌素

D: 两性霉素B

答案：C

59.为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

A: 过氧乙酸

B: 聚维酮碘

C: 氯己定

D: 依沙吖啶

答案：D

60.以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 卡培他滨

C：表柔比星

D：培美曲塞

答案：C

61.大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A：肾病综合征

B：湿疹

C：抑制器官移植急性排斥危象

D：变态反应性疾病

答案：C

62.可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A：氟马西尼

B：纳洛酮

C：苯甲酸钠咖啡因

D：阿托品

答案：D

63.一日2次，早餐和晚餐前60分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

A：瑞格列奈

B：格列齐特

C：利拉鲁肽

D：艾塞那肽

答案：D

64.用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是()

A：赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 复方氨基酸注射液(20AA)

D: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

答案：A

65.影响毛细血管通透性的促凝血药是

A: 鱼精蛋白

B: 维生素 K

C: 卡巴克络

D: 血凝酶

答案：C

66.（2020 年真题）患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A: 赖诺普利

B: 吲达帕胺

C: 氨氯地平

D: 普萘洛尔

答案：D

67.关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法,正确的是

A: 通过阻断肺一胸膜的牵张感受器产生的质迷走神经反射而起到镇咳作用

B: 镇咳作用弱于可待因

C: 主要用于干咳但左旋右美沙芬有镇痛作用

D: 口服吸收缓慢,主要经肝脏代谢作用时间长

答案：C

68.（2016年真题）属于M胆碱受体激动剂的降低眼压药是

A：甘露醇

B：噻吗洛尔

C：乙酰唑胺

D：毛果芸香碱

答案：D

69.（2018年真题）关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是（）

A：乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

B：对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

C：乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类、四环素类药物的抗菌活性

D：乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

答案：B

70.根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A：晚餐前

B：中午12时左右

C：下午4时左右

D：上午8时左右

答案：D

71.（2018年真题）属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的调节血脂药是（）

A：依折麦布

B：辛伐他汀

C：非诺贝特

D：烟酸

答案：B

72.不良反应为刺激性干咳的药物是()

A：氨氯地平

B：硝酸甘油

C：依那普利

D：哌唑嗪

答案：C

73.临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

A：氯喹

B：伯氨喹

C：奎宁

D：甲硝唑

答案：B

74.适用于心功能比较稳定的Ⅱ～Ⅲ级心力衰竭患者的是

A：米力农

B：氢氯噻嗪

C：卡维地洛

D：氯沙坦

答案：C

75.典型不良反应为皮肤毒性,属于酪氨酸激酶抑制剂的药物是（）

A：奥沙利铂

B：氟尿嘧啶

C：吉非替尼

D：顺铂

答案：C

76.（2021年真题）属于细胞血凝索抑制剂的抗流感病毒药物是（）

A：阿比多尔

B：博洛昔韦

C：法匹拉书

D：奥司他韦

答案：A

77.对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

A：粉剂

B：乳膏剂

C：洗剂

D：油剂

答案：B

78.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A：柳氮磺吡啶

B：磺胺米隆

C：磺胺甲噁唑

D：磺胺嘧啶

答案：A

79.属于IB类钠通道阻滞剂的抗心律失常药是()

A：普鲁卡因胺

B：维拉帕米

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案：D

80.由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别神经毒性较严重的是

A: 卡铂

B: 亚叶酸钙

C: 奥沙利铂

D: 顺铂

答案：C

81.不属于抗代谢抗肿瘤药的是

A: 环磷酰胺

B: 氟尿嘧啶

C: 阿糖胞苷

D: 甲氨蝶呤

答案：A

82.治疗钙缺乏症可选用

A: 葡萄糖酸钙

B: 依降钙素

C: 阿伦膦酸钠

D: 阿法骨化醇

答案：A

83.与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 青霉素

B: 万古霉素

C: 四环素

D: 氯霉素

答案：C

84.可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

A: 多西环素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 四环素

答案：D

85.口角炎患者用选用的维生素是

A: 维生素B

B: 维生素A

C: 维生素B

D: 维生素D

答案：C

86.以上药物镇咳作用最弱的是

A: 喷托维林

B: 可待因

C: 右美沙芬

D: 吗啡

答案：A

87.顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A: 慢性淋巴细胞性白血病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/606055132230011030