

# 2023 年湖南省怀化市成考专升本医学综合 自考预测试题(含答案带解析)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(100 题)

1.老年人主动脉弹性降低时, 血压的变化是 ( )

- A. 收缩压升高, 脉压减小
- B. 收缩压升高, 脉压加大
- C. 收缩压降低, 脉压减小
- D. 收缩压变化不大, 脉压显著加大
- E. 收缩压与脉压均无变化

2. 正常成年人安静时, 通气/血流比值的正常值是 ( )

- A.0.48 B.0.64 C.0.84 D.1.4 E.0.58

3.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

- A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

4. 有关急性肾衰多尿期的描述, 不正确的是

- A.成人患者尿量突然或逐渐增多至 400 毫升/日以上
- B.持续约 7-14 天
- C.其早期水电解质紊乱和氮质血症仍很重
- D.后期可致缺水、低钾、低蛋白血症

E.少尿期后前两周称多尿早期

5. 男性，56岁，因胸痛3小时就诊。心电图检查示：Ⅰ、Ⅱ、aVF导联ST段弓背向上抬高，V2~V5导联ST段压低。该患者最可能的诊断是（ ）

A.急性前壁心肌梗死 B.急性前间壁心肌梗死 C.急性高侧壁心肌梗死  
D.急性下壁心肌梗死 E.急性正后壁心肌梗死

6. 输血的禁忌症应除哪项外

A.心力衰竭 B.肺水肿 C.红细胞增多症 D.严重感染 E.恶性高血压

7.最轻的意识障碍为【 】

A.嗜睡 B.谵妄 C.浅昏迷 D.昏 E.意识模糊

8.当心脏处于全心舒张期时( )

A.心室达到最大充盈

B.房室瓣关闭

C.心室容积不变

D.动脉瓣关闭

E.心室内压略高于心房内压

9. 脑桥内与脑神经相关的核团是（ ）

A.脑桥核 B.楔束核 C.上泌涎核 D.下泌涎核 E.下橄榄核

10. 大量腹水时，腹包块的触诊，下列哪种方法最适宜（ ）

A.滑行触诊法 B.深压触诊法 C.双手触诊法 D.冲击触诊法 E.浅部触诊法

11.高渗性缺水患者，输液治疗首选

A.生理盐水 B.5%葡萄糖注射液 C.10%葡萄糖注射液 D.5%碳酸氢钠  
E.复方氯化钠溶液

12. 具有很强吞噬功能的是（ ）

A.B 淋巴细胞 B.T 淋巴细胞 C.嗜酸性粒细胞 D.嗜碱性粒细胞 E.单核细胞

13. 膀胱三角的描述错误的是

A.位于膀胱底部  
B.位于两侧输尿管口和尿道内口之间  
C.膀胱充盈或空虚时，该区黏膜都有皱襞  
D.是膀胱疾病的好发部位  
E.两侧输尿管口之间有输尿管间襞

14.月经的发生与下列哪种因素有关（ ）。

A.血液中前列腺素的浓度降低  
B.血液中孕酮和雌二醇水平下降  
C.血液中孕酮水平升高，雌二醇水平下降

D.卵泡刺激素和黄体生成素水平升高

E.血中人绒毛膜促性腺激素浓度升高

15.急性肾衰无尿或少尿早期，发生水中毒的常见原因是（ ）。

A.低蛋白血症 B.内生水过多 C.抗利尿激素增加 D.钠潴留 E.不适当输入水分过多

16.心室肌细胞是否具有兴奋性的前提是  $\text{Na}^+$ 通道是否处于【 】

A.启动状态 B.备用状态 C.激活状态 D.失活状态 E.高能状态

17.激活胰液中胰蛋白酶原的是( )。

A.脂肪酸 B.胆盐 C.蛋白水解产物 D.肠致活酶 E.糜蛋白酶

18. 急性心肌梗塞病人多长时间内不施行择期手术

A.2 个月内 B.3 个月内 C.4 个月内 D.5 个月内 E.6 个月内

19.激活糜蛋白酶原的物质是( )。

A.酸 B.胰蛋白酶 C.组织液 D.肠致活酶 E.糜蛋白酶

20. 下列骨中，参与组成踝关节的是( )

A.内侧楔骨 B.外侧楔骨 C.足舟骨 D.距骨 E.股骨

21.下列哪一项不是孕激素的生理作用（ ）。

A.大量分泌可抑制卵泡刺激素和黄体生成素释放

- B.促进子宫内膜腺体分泌
- C.使子宫平滑肌兴奋性降低
- D.促进乳腺腺泡及导管发育
- E.使子宫颈黏液增多、变稀

22.代谢性酸中毒原发改变为( )。

- A. $[\text{HCO}_3^-]$ 增多
- B. $[\text{HCO}_3^-]$ 减少
- C. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 增多
- D. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 减少
- E. $\text{P}(\text{CO}_2)$ 增高

23. 在 40%的环境中，机体散热的方式是

- A.辐射 B.传导 C.对流 D.蒸发 E.扩散

24.十二指肠纵襞的位置多在 ( )

- A.十二指肠上部内侧 B.十二指肠降部外侧 C.十二指肠降部后内侧 D.十二指肠水平部内侧 E.十二指肠升部内侧

25. 第一心音减弱可见于 ( )

- A.二尖瓣狭窄 B.左心室肥大 C.发热 D.主动脉瓣关闭不全 E.以上都不对

26.临床用简便方法测定能量代谢率必须取得的数据是 【 】

- A.食物的热价 B.食物的氧热价 C.非蛋白呼吸商 D.一定时间内的耗氧量 E.一定时间内需要二氧化碳的量

27.牵涉痛是指（ ）。

- A.内脏痛引起体表特定部位的疼痛或痛觉过敏  
B.伤害性刺激作用于皮肤痛觉感受器  
C.伤害性刺激作用于内脏痛觉感受器  
D.肌肉和肌腱受牵拉时所产生的痛觉  
E.内脏及腹膜受牵拉时产生的感觉

28.关于胸内心脏按压的指征，不正确的是( )。

- A.胸廓严重畸形 B.张力性气胸 C.多发肋骨骨折 D.心脏压塞 E.年老体弱者

29. 心脏收缩力增强时，静脉回心血量增加，这是因为（ ）

- A.动脉血压升高 B.血流速度加快 C.心排出量增加 D.舒张期室内压低  
E.静脉压增高

30.阻塞性或肝细胞性黄疸（ ）。

- A.尿镜检红细胞满视野  
B.尿镜检白细胞满视野

C.尿外观正常，镜检可见各种管型

D.尿外观酱油色，隐血试验(+)

E.尿外观深黄色，含大量胆红素

31. 男性，34岁，晚餐后出现剧烈腹痛，6小时后来医院就诊。经检查诊断为消化道穿孔、急性腹膜炎。该患者最不可能出现的体征是（ ）

A.板状腹 B.肝浊音界缩小 C.腹部反跳痛阳性 D.移动性浊音阳性 E.肠鸣音亢进

32. 下列属于条件反射的是()

A.看到酸梅时引起唾液分泌 B.食物入口后，引起胃腺分泌 C.炎热环境下出汗 D.大量饮水后尿量增加 E.寒冷环境下皮肤血管收缩

33.下列出现输血反应后采取的措施中，错误的是()

A.A.碱化尿液

B.减慢输血速度

C.利尿、保护肾功能

D.重新做血型及交叉试验

E.重新核对供血者、受血者的姓名、性别、血型

34.阑尾动脉发自 【 】

A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动

脉

35. 骨骼肌细胞静息电位水平接近于 ( )

A.K<sup>+</sup>的平衡电位 B.Na<sup>+</sup>的平衡电位 C.Ca<sup>2+</sup>的平衡电位 D.Cl<sup>-</sup>的平衡电位 E.Mg<sup>2+</sup>的平衡电位

36. 第一心音到第二心音期间代表 ( )

A.A. 心室舒张期 B. 心室收缩期 C. 心房收缩期 D. 心房舒张期 E. 等容收缩期

37. 支配咀嚼肌的神经是 ( )。

A. 舌下神经 B. 下颌神经 C. 面神经 D. 动眼神经 E. 滑车神经

38. 预防休克的关键是

A. 消除病因 B. 保暖、防暑 C. 穿抗休克裤 D. 注意休息 E. 止痛剂早期应用

39. 气管起始处为

A.A. 第 4 颈椎下缘平面

B. 第 6 颈椎下缘平面

C. 第 1 胸椎下缘平面

D. 第 2 胸椎下缘平面

E. 第 4 胸椎下缘平面



40. 血浆晶体渗透压主要来自

A.葡萄糖 B.球蛋白 C.Na<sub>+</sub> D.K<sub>+</sub> E.白蛋白

41.下列关于输卵管的叙述，正确的是（ ）

A.位于子宫系膜内 B.其内侧端为子宫口，外侧端为卵巢口 C.峡部位于壶腹部的内侧 D.壶腹部边缘有输卵管伞 E.以上都不正确

42. 肾小球滤过的原尿流经下列哪一部分后，其成分将不再变化而成为终尿

A.近球小管 B.髓袢降支 C.髓袢升支 D.远曲小管 E.集合管

43.上呼吸道最狭窄的部位是

A.鼻后孔 B.喉口 C.前庭裂 D.声门裂 E.声门下腔

44. 肝脏扩张性搏动常见于

A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

45.关于水肿，下列说法不正确的是（ ）

A.心源性水肿常从身体的低位开始

B.肾源性水肿常发展迅速

C.肾源性水肿常伴高血压

D.肝源性水肿常以腹水为主要表现

E.甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿

46. 与婴儿神经系统发育密切相关的激素是

A.生长素 B.ACTH C.甲状腺素 D.胰岛素 E.催乳素

47. 同一骨骼肌细胞在接受其运动神经元的冲动刺激后产生的 2 次终板电位中，第 2 个终板电位的振幅发生了变化，幅度明显降低，这可能是因为（ ）

A.切断了运动神经元

B.在浸泡液中加了肾上腺素

C.在浸泡液中加了去甲肾上腺素

D.在浸泡液中加了箭毒

E.在浸泡液中加了钠离子

48.预防切口感染，下列叙述错误的是（ ）

A.遵守无菌技术 B.手术操作轻柔准确 C.严格止血，避免血肿形成 D.术后常规应用抗生素 7 天 E.切口缝合避免死腔形成

49. 下列选项中，不属于小脑中央核的是

A.齿状核 B.球状核 C.栓状核 D.顶核 E.基底核

50.臀大肌注射定位的十字法垂线的起点是( )。

A.髂前上棘 B.髂嵴 C.髂嵴最高点 D.脊柱

51.开口位置高于窦底的鼻旁窦是( )。

A.额窦 B.上颌窦 C.蝶窦 D.筛窦前中群 E.筛窦后群

52. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是()

A.0.48 B.0.58 C.0.64 D.0.84 E.0.94

53. 恶性肿瘤的诊断中，准确性最高的是()

A.症状与体征 B.肿瘤标志物检查 C.X 线检查 D.磁共振成像检查 E.病理检查

54. 脓性指头炎，切开引流应选用()

A.侧面横切口 B.侧面纵切口 C.指腹横切口 D.指腹纵切口 E.指腹 S 切口

55.对肺的非弹性阻力叙述，错误的是

- A.它主要是呼吸道阻力
- B.它与气道半径的 2 次方成反比
- C.它增大时，可出现呼吸困难
- D.它与气体流速呈正相关
- E.上呼吸道是产生呼吸道阻力的主要部位

56.心电图反映窦房结兴奋传至心室的波段是 【 】

A.P 波 B.PR 间期 C.QRS 波 D.S 段 E.T 波

57.确诊脓肿的主要依据是 ( )

A.波动感 B.发热 C.功能障碍 D.白细胞计数增加 E.全身乏力

58.面部开放性损伤后 12 小时就诊，应采取的措施是（ ）。

- A.换药，小清创
- B.清创后不缝合
- C.清创后一期缝合
- D.清创后延期缝合
- E.清创后放引流条

59.正常肘关节的功能位是( )。

- A.屈曲 90°
- B.伸直 90°
- C.屈曲 60°
- D.伸直 60°

60. 患者浅感觉障碍，可能出现异常的是（ ）

- A.关节觉
- B.痛温觉
- C.震动觉
- D.位置觉
- E.两点辨别觉

61.金黄色葡萄球菌感染脓液的特点是（ ）。

- A.脓液稀薄，淡红色
- B.脓液稠厚，黄色，不臭
- C.脓液稠厚，恶臭
- D.脓液淡绿色，甜腥臭
- E.脓液特殊的恶臭

62.舌的神经支配（ ）

- A. 舌的味觉由舌神经和舌咽神经传导
- B. 舌神经管理舌前 2/3 的一般黏膜感觉
- C. 舌肌的运动由舌神经控制
- D. 舌咽神经管理舌前 2/3 的味觉
- E. 舌的一般感觉由面神经和舌咽神经共同管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606100052112010043>