

## 2023-24 年河北省柏乡县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题内部题库带答案 AB 卷

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机磷中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K
- B: 氯解磷定
- C: 烯丙吗啡
- D: 乙酰胺

**答案：B**

2. 可透过胎盘屏障，可能引起胎儿甲状腺肿大及功能减退，在分娩时造成难产、窒息的药物是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 双氯芬酸
- C: 苯海拉明
- D: 左甲状腺素

**答案：A**

3. 抗类风湿关节炎药物中，至少服用 6 个月才能宣布无效，长期大剂量服用可出现肾损害和骨髓抑制的是

- A: 青霉胺
- B: 氯喹
- C: 来氟米特
- D: 柳氮磺吡啶

**答案：A**

4. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 胰岛素注射剂
- B: 氟西汀
- C: 米索前列醇
- D: 枸橼酸铋钾

**答案：D**

5. 非磺酰脲类促胰岛素分泌剂

- A: 伏格列波糖
- B: 瑞格列奈
- C: 格列吡嗪
- D: 罗格列酮

**答案：B**

6. 以下药物中，可引起白细胞计数降低的药物为

- A: 埃索美拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

**答案：D**

7. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 有机磷中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 汞中毒
- D: 三唑仑中毒

**答案：D**

8. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

- A: 甲硝唑 400mg, bid, po
- B: 替硝唑, 2g, qd, po
- C: 克林霉素 300mg, bid, po
- D: 氟康唑 150mg, 顿服

**答案：A**

9. 荨麻疹患者常出现()

- A: 血红蛋白减少
- B: 血小板计数增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

**答案：C**

10. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: 2.0~2.5
- B: 2.0~3.0
- C: >3.0
- D: <2.0

**答案：B**

11. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 乳酶生片

- B: 多潘立酮片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 酵母片

**答案：A**

12. 适用于有完整子宫、绝经后期仍希望有月经样出血的妇女()

- A: 雌孕激素连续联合用药
- B: 单纯孕激素补充治疗
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 单纯雌激素补充治疗

**答案：C**

13. 下列药物使用方式，正确的是

- A: 酵母片在餐后整片用水送服
- B: 维生素 C 泡腾片用 150ml 温开水浸泡溶解后服用
- C: 滴眼液打开使用后，可以连续使用 3 个月
- D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服

**答案：B**

14. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 帕罗西汀
- B: 氟伏沙明
- C: 丙咪嗪
- D: 阿米替林

**答案：B**

15. 艾滋病的传播途径不包括

- A: 消化道传播

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- B: 性途径传播
- C: 经血传播
- D: 经血制品传播

**答案：A**

16. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的兴奋剂是

- A: 人生长激素
- B: 可卡因
- C: 麻黄碱
- D: 普萘洛尔

**答案：C**

17. 不能受潮的药物是

- A: 碘化钾片
- B: 鱼肝油乳
- C: 叶酸
- D: 维生素 D

**答案：A**

18. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的

- A: B 级
- B: D 级
- C: E 级
- D: C 级

**答案：B**

19. (2017 年真题) 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为 ( )

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 血红蛋白减少
- B: 红细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：C**

20. 患者，女性，62 岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

- A: 75~150mg/d
- B: 300~500mg/d
- C: 200~300mg/d
- D: 300mg/d

**答案：A**

21. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品

- A: 归因性
- B: 新颖性
- C: 合理性
- D: 权威性

**答案：C**

22. 所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

- A: 坎地沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 地高辛
- D: 卡托普利

**答案：B**

23. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

- A: 维生素 A
- B: 维生素 C
- C: 复合维生素 B
- D: 维生素

**答案：C**

24. 服用他汀类血脂调节药可能导致

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: 血白细胞减少
- C: 血清总胆固醇升高
- D: 血清血红蛋白升高

**答案：A**

25. 婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是()

- A: 舌下含服
- B: 清晨服用
- C: 用温水调服
- D: 应同时碱化尿液

**答案：C**

26. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 钆贝葡胺
- B: 塞来昔布
- C: 替加色罗
- D: 培高利特

**答案：A**

27. (2016 年真题) 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ( )。

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

**答案: A**

28. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 29+6 周，血压 160/100mmHg，尿蛋白 (-)，该患者降压药应选用

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 厄贝沙坦
- D: 甲基多巴

**答案: D**

29. 抗结核化学药物治疗的主要适应证为

- A: 痰菌阴性，无明显结核毒性症状
- B: 肺结核病灶硬结已久
- C: 有活动性肺结核病灶
- D: 病灶部分硬结，痰菌阴性

**答案: C**

30. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 洋地黄毒苷
- D: 苯妥英钠

**答案：A**

31. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC $12.4 \times 10$

A: 半片 qd

B: 1 片 qd

C: 1 片半 qd

D: 首剂 1 片，此后每 24 小时半片

**答案：D**

32. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

A: 白血病

B: 再生障碍性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼细胞性贫血

**答案：D**

33. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

A: 头孢哌酮

B: 阿司匹林

C: 苯巴比妥

D: 布洛芬

**答案：C**

34. 主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

A: 药物分布

B: 药物代谢

C: 药物排泄

D: 药物吸收

**答案: B**

35. 胶囊剂的注意事项是

A: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

B: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

C: 用后应漱口

D: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

**答案: B**

36. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 吗啡

B: 氨溴索

C: 氨茶碱

D: 速尿

**答案: A**

37. 患者，女，25 岁，痛经，应选用的药物是()

A: 卡马西平

B: 麦角胺咖啡因

C: 山莨菪碱

D: 布洛芬

**答案: D**

38. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

- A: 四级证据
- B: 二级证据
- C: 三级证据
- D: 一级证据

**答案：D**

39. 属于  $5\alpha$ -还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

- A: 非那雄胺
- B: 黄酮哌酯
- C: 氟他胺
- D: 阿夫唑嗪

**答案：A**

40. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药的 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能
- C: 待评价
- D: 可能无关

**答案：D**

41. 规范处方行为与操作流程，归属于用药错误预防策略中的

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 管理规范到位
- C: 人员培训
- D: 科学发展

**答案：B**

42. 增加出血危险的配伍用药是

A: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸

B: 肝素钠联用阿司匹林

C: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶

D: 普萘洛尔联用硝酸酯类

**答案：B**

43. (2018 年真题) 患者, 女, 45 岁, 6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁, 在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗, 症状控制较好, 近 3 个月服用西咪替丁, 患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱, 该患者各地求医, 服用各种药物, 具体药物品种不详。围绕该病例, 医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 有条件的应测定药物血液浓度

B: 遵从联合治疗原则

C: 长期规律用药

D: 定期监测肝功能

**答案：B**

44. 患儿, 女, 4 岁半。身高 110cm, 体重 15kg。一天前发热 (39.1℃), 咽喉痛, 无咳嗽, 无吐泻, 家长在家选用退烧药对症治疗, 发病 20h 左右出现腹泻, 约 2~5h, 一次大便, 量少, 黄色粘液便, 呕吐 1 次。体格检查: T38.8℃, P118 次/分, R28 次/分。咽位充血, 出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清, 腹平软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。实验室检查: WBC $18.5 \times 10^9/L$  (参考值  $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ), 粪便镜检可见红、白细胞。

A: 若患儿腹泻加重, 可口服自制补液盐进行补液?

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？

C: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？

D: 应给予少量、多次、清淡饮食？

**答案：B**

45. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

A: 奥昔布宁

B: 非那雄胺

C: 坦索罗辛

D: 米多君

**答案：B**

46. 患者，男，50 岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者的用药指导，错误的是

A: 氟西汀应于睡前服用

B: 不得随意自行调整氟西汀剂量

C: 服用氟西汀期间不能饮酒

D: 不能突然停止服用氟西汀

**答案：A**

47. 舒筋活络酒不宜联用的是

A: 苯巴比妥

B: 阿托品

C: 氢氧化铝

D: 可待因

**答案：A**

48. 属于癌症第二阶梯止痛药物的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 二氢可待因
- C: 美沙酮
- D: 谷维素

**答案：B**

49. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A: 黄连素
- B: 抗生素
- C: 维生素
- D: 谷维素

**答案：A**

50. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是

- A: 缬沙坦
- B: 氨氯地平
- C: 氨苯蝶啶
- D: 维拉帕米

**答案：C**

51. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

- A: 交代药物的用量
- B: 交代用药注意事项
- C: 交代药品贮存条件与方法
- D: 交代用药途径及用药方法

**答案：D**

52. 溶栓治疗

- A: 阿替普酶
- B: 阿司匹林
- C: 巴曲酶
- D: 低分子肝素

**答案：A**

53. (血常规检查异常的病症)骨髓增生病

- A: 红细胞沉降率减慢
- B: 血小板增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

**答案：B**

54. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9$

- A: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林
- C: 首选针对革兰阳性菌的药物
- D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

**答案：C**

55. 属于时间依赖性抗菌药，且抗菌作用持续时间长，评估此类药物的 PK / PD 参数主要为 AUC<sub>0~24</sub> / MIC，一般推荐日剂量分 2 次给药方案的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 头孢克洛

C: 氨茶碱

D: 利奈唑胺

**答案: D**

56. 属于 HIV 整合酶抑制剂的是

A: 奈韦拉平

B: 阿巴卡韦

C: 雷特格韦

D: 洛匹那韦

**答案: C**

57. 耳、肾毒性大，肾功能不全患者不宜使用的药物是

A: 头孢哌酮

B: 阿米卡星

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

**答案: B**

58. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

A: 最大效果分析

B: 成本-效用分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效益分析

**答案: C**

59. 以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

A: 弱碱中和强酸

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 药用炭吸附
- C: 依地酸钙钠解救铅中毒
- D: 二巯丙醇解救汞中毒

**答案：B**

60. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

- A: 主要病种  $\geq 300$  例
- B: 常见病  $\geq 12000$  例
- C: 20~30 例
- D:  $\geq 300$  例

**答案：C**

61. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿酮体
- B: 尿血红蛋白
- C: 尿沉渣结晶
- D: 尿肌酐

**答案：B**

62. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

- A: 烟酸类
- B:  $\omega$ -3 脂肪酸制剂
- C: 他汀类
- D: 贝特类

**答案：D**

63. “主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

- A: 最小成本分析方法
- B: 成本一效用分析方法
- C: 成本一效益分析方法
- D: 最大效果分析方法

**答案：A**

64. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

**答案：B**

65. 下列有关荨麻疹的叙述，不正确的是

- A: 超过 2 周以上者称为慢性荨麻疹
- B: 人工荨麻疹好发于眼睑、口唇、外生殖器
- C: 多与变态(过敏)反应有关
- D: 热性荨麻疹多见于青年女性

**答案：B**

66. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是()

- A: 非洛地平片
- B: 维 A 酸片
- C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- D: 左旋多巴片

**答案：D**

67. “加至”的外文缩写为()。

A: Add

B: qod

C: Ad

D: gtt

**答案：A**

68. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

A: 氯霉素

B: 丙硫氧嘧啶

C: 维生素 A

D: 维生素 D

**答案：B**

69. 对于 ACEI 类药描述错误的是

A: 唯一抑制心肌及血管重构、心室重塑的药物

B: 明显降低全身血管阻力

C: 抑制血管紧张素转换酶 (ACE) 活性

D: 抑制交感神经活性作用

**答案：D**

70. 细菌感染患者可出现

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 红细胞/血红蛋白减少

C: 血小板增多

D: 中性粒细胞增多

**答案：D**

71. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 单硝酸异山梨酯

**答案：B**

72. 抗高血压药物中，非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的主要不良反应为()

。

- A: 血钾增高
- B: 直立性低血压
- C: 房室传导阻滞，心功能抑制
- D: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

**答案：C**

73. 评判为不规范处方的是

- A: 单张门诊处方超过 5 种药品
- B: 无适应证用药
- C: 黄连素用于细菌性腹泻
- D: 二甲双胍用于糖尿病人

**答案：A**

74. 患者女 27 岁确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果:HBV-DNA $2 \times 10^5$ opies/ml,ALT122U/L. 拟予以病毒治疗首选的药物是()

- A: 利巴韦林
- B: 泛昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 阿糖腺苷

**答案：C**

75. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 催吐、洗胃
- B: 导泻与洗肠
- C: 吸氧
- D: 静脉补液

**答案：A**

76. III期临床试验

- A: 以健康志愿者为给药对象
- B: 以患者为给药对象
- C: 以目标适应证患者为给药对象
- D: 以特殊人群为给药对象

**答案：C**

77. 双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为()。

- A: 利尿剂（袢利尿药）
- B: ACEI
- C: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- D: 利尿剂（噻嗪类）

**答案：B**

78. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是()

- A: 18

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 30.2

C: 20

D: 27.8

**答案：D**

79. 沟通技能在药学服务工作中最重要的作用是

A: 用药教育作用

B: 药品警戒作用

C: 应对投诉作用

D: 双向交流作用

**答案：D**

80. 患者，女，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，Bp108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 西地兰

B: 多索茶碱

C: 硝普钠

D: 硝苯地平

**答案：A**

81. 可引起驾驶员口渴、头晕的药物是

A: 阿米洛利

B: 抗过敏药

C: 双嘧达莫

D: 东莨菪碱

**答案：A**

82. 氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

- A: 酒
- B: 脂肪
- C: 食盐
- D: 食醋

**答案：A**

83. 各调剂部门每天下班（或交班）前，管理人员应核对药品和相关记录，实施的是

- A: 基数卡
- B: 五专管理
- C: 印鉴卡
- D: 防盗设施

**答案：B**

84. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- B: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙
- C: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- D: 福辛普利用于降压

**答案：C**

85. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是归属于查看材料

- A: 处方审核工作

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- B: 药学信息服务工作
- C: 处方点评工作
- D: 参与健康教育工作

**答案：B**

86. 属于  $\beta$  受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 美托洛尔
- C: 福莫特罗
- D: 乙酰胆碱

**答案：C**

87. 失神发作首选

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 拉莫三嗪
- D: 苯妥英钠

**答案：B**

88. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ( )

- A: 硫糖铝
- B: 碳酸镁
- C: 米索前列醇
- D: 雷贝拉唑

**答案：C**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

89. 阿司匹林可能引起

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/607053061056010024>