2024湖北省枣阳市《执业药师之西药学专业二》考试必背200题通关秘籍题库附答案（基础题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A：维生素D

B：铁剂

C：阿仑膦酸钠

D：钙剂

答案：C

2.稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

A：硝苯地平

B：地尔硫

C：维拉帕米

D：普萘洛尔

答案：C

3.糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

A：格列齐特

B：胰岛素

C：格列喹酮

D：格列吡嗪

答案：C

4.不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

A：酚甘油滴耳液

B：羟甲唑啉

C：赛洛唑啉

D：麻黄碱

答案：D

5.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：普罗帕酮

D：利多卡因

答案：A

6.属于磷酸二酯酶抑制剂的是

A：双嘧达莫

B：替罗非班

C：氯吡格雷

D：替格瑞洛

答案：A

7.对G

A：第三代头孢菌素

B：第四代头孢菌素

C：第一代头孢菌素

D：第二代头孢菌素

答案：B

8.低剂量可提供接近全效的降压作用的是

A：氢氯噻嗪

B：氨苯蝶啶

C：阿米洛利

D：螺内酯

答案：A

9.四环素联用抗凝药需要

A：调整抗凝血药的剂量

B：增加麦角中毒的风险

C：口服吸收减少

D：肝毒性增加

答案：A

10.可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是（）

A：赛洛多辛

B：多沙唑嗪

C：特拉唑嗪

D：非那雄胺

答案：D

11.主要用于预防静脉血栓的口服药物是

A：尿激酶

B：华法林

C：链激酶

D：低分子肝素

答案：B

12.关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

A: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

B: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

C: 对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

D: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

答案：C

13.可使前者作用加强或延长的是

A: 维生素C

B: 氯丙嗪

C: 他莫昔芬

D: 红霉素

答案：B

14.可使后者疗效显著下降的是

A: 他莫昔芬

B: 氯丙嗪

C: 红霉素

D: 维生素C

答案：D

15.在体外无抗凝作用，在体内有抗凝血作用的是

A: 华法林

B: 肝素

C: 尿激酶

D: 噻氯匹定

答案：A

16.下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是()

A: 应当先给予氟尿嘧啶，再用四氢叶酸

B: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

C: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药物

D: 与四氢叶酸合用时，可降低其毒性，提高其疗效

答案：A

17.曲妥珠单抗的适应证是

A: 晚期恶性黑色素瘤

B: 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

C: 人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌

D: 转移性结直肠癌

答案：C

18.新生儿出血宜选用

A: 维生素K

B: 低分子肝素

C: 氨甲环酸

D: 尿激酶

答案：A

19.（2016年真题）可抑制细菌的DNA依赖性RNA多聚酶的是

A: 舒巴坦

B: 替考拉宁

C: 利福平

D: 磷霉素

答案：C

20.（2021年真题）属于时间依赖型抗菌药物，抗菌谱窄，仅对需氧革兰阴性菌有（）

A: 氨苄西林

B: 头孢他啶

C: 氨曲南

D: 阿米卡星

答案：C

21.关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

A: 作用较甲巯咪唑弱

B: 长期应用反馈抑制TSH分泌

C: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高

D: 可抑制外周组织的T

答案：A

22.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A: 美托洛尔

B: 双氯芬酸

C: 氢氯噻嗪

D: 特拉唑嗪

答案：C

23.属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A：过氧化氢

B：酮替芬

C：克罗米通

D：麻黄碱

答案：D

24.大剂量可导致Q—T间期延长的是

A：多潘立酮

B：西沙必利

C：莫沙必利

D：甲氧氯普胺

答案：B

25.甲氧苄啶与磺胺甲

A：双重阻断敏感菌的叶酸代谢

B：促进分布

C：抗菌谱不相似

D：促进吸收

答案：A

26.有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A：维A酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

B：对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

C：过氧苯甲酰凝胶合用维A酸乳膏可加强疗效

D：维A酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

答案：C

27.使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

A: 血红蛋白

B: 血尿酸

C: 血小板计数

D: 白细胞计数

答案：B

28.用维生素B

A: 钙

B: 钠

C: 钾

D: 锂

答案：C

29.细胞膜的重要组分，协调磷脂和细胞膜功能的是

A: 双环醇

B: 异甘草酸镁

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 还原型谷胱甘肽

答案：C

30.阿托品引起便秘的原因是()

A: 松弛肠道平滑肌

B: 抑制胃肠道腺体分泌

C: 抑制排便反射

D: 使括约肌兴奋

答案：A

31.支气管哮喘急性发作气雾吸人

A: 去氧肾上腺素

B: 异丙肾上腺素

C: 去甲肾上腺素

D: 多巴胺

答案：B

32.有关维生素K的描述，错误的是

A: 参与凝血因子的合成

B: 天然维生素K为脂溶性

C: 对于应用链激酶所致出血有特效

D: 维生素K

答案：C

33.下列关于林旦的描述中，错误的是

A: 不应与铜制品接触

B: 不应与铁制品接触

C: 涂药前勿用热水和肥皂洗澡

D: 不应与碱性物质接触

答案：A

34.治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 氯喹

B: 二氯尼特

C: 依米丁

D: 甲硝唑

答案：D

35.下列关于铁剂的叙述错误的是

A：口服铁剂主要在十二指肠和空肠上段吸收

B：最容易吸收的铁剂为三价铁

C：儿童缺铁可能影响其行为和学习能力

D：脂肪泻患者不建议使用

答案：B

36.与50S亚基结合，阻断转肽作用的药物是

A：磺胺甲

B：青霉素

C：甲氧苄啶

D：红霉素

答案：D

37.属于短效口服避孕药的是

A：米非司酮

B：壬苯醇醚

C：氯地孕酮

D：左炔诺孕酮

答案：D

38.属于5-HT3受体阻断剂的止吐药物是

A：甲氧氯普胺

B：格雷司琼

C：甲地孕酮

D：阿瑞吡坦

答案：B

39.属于5-HT5受体阻断剂的止吐药是()。

A：托烷司琼

B：甲氧氯普胺

C：维生素B

D：阿瑞吡坦

答案：A

40.氯霉素的抗菌作用原理是

A：干扰叶酸合成

B：形成NAD的同系物，抑制结核菌生长

C：抑制DNA回旋酶

D：抑制蛋白质合成

答案：D

41.临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

A：米力农

B：依那普利

C：多巴酚丁胺

D：地高辛

答案：D

42.是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘9%～12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

A：聚维酮碘

B：依沙吖啶

C：过氧乙酸

D：氯己定

答案：A

43.以下药物肾结石患者禁用的是

A：苯溴马隆

B：秋水仙碱

C：别嘌醇

D：非布司他

答案：A

44.与DNA结合，进而抑制DNA和RNA合成

A：紫杉醇

B：高三尖杉酯碱

C：氟尿嘧啶

D：顺铂

答案：D

45.主要以降低三酰甘油为目标的首选药是

A：烟酸

B：辛伐他汀

C：阿托伐他汀

D：非诺贝特

答案：D

46.患者，男，45岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀2年，加重1周"之主诉入院。患者2年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A: 预防消化道出血
B: 缓解腹胀
C: 治疗胃溃疡
D: 治疗肝硬化
答案：C

47.抑制HIV的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是
A: 核苷类反转录酶抑制药
B: 蛋白酶抑制药
C: 非核苷类反转录酶抑制药
D: 整合酶抑制剂
答案：A

48.（2016年真题）可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是
A: 长春新碱
B: 博来霉素
C: 紫杉醇
D: 柔红霉素
答案：A

49.临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()
A: 阿米卡星
B: 异帕米星
C: 奈替米星
D: 链霉素
答案：D

50.适用于哺乳期妇女治疗甲亢的药物是

A：卡比马唑

B：碘剂

C：丙硫氧嘧啶

D：甲巯咪唑

答案：C

51.阿司匹林抗血栓形成的机制是

A：降低凝血酶活性

B：直接对抗血小板聚集

C：环氧酶失活，减少TXA2生成，产生抗血栓形成作用

D：激活抗凝血酶

答案：C

52.与氯霉素特点不符的是()

A：骨髓毒性明显

B：口服难吸收

C：易透过血脑屏障

D：适用于伤寒的治疗

答案：B

53.（2021年真题）能抑制外周（甲状腺外）T4转化为T3的抗甲状腺药物是（）

A：卡比马唑

B：丙硫氧嘧啶

C：美托洛尔

D：甲巯咪唑

答案：B

54.烷化剂中易诱发出血膀胱炎的药物是

A：氮芥

B：卡莫司汀

C：环磷酰胺

D：塞替派

答案：C

55.（2019年真题）与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是（）

A：甘草酸二铵

B：还原型谷胱甘肽

C：葡醛内酯

D：多烯磷脂酸胆碱

答案：B

56.（2017年真题）关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法,错误的是（）

A：面部、阴部和皱褶部位的湿疹,需长期使用强效制剂

B：可用于过敏性皮炎的治疗

C：若继发细菌或真菌感染,可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D：为控制的细菌或真菌感染不宜使用

答案：A

57.易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素B合用的抗真菌药物是

A：氟康唑

B: 氟胞嘧啶

C: 卡泊芬净

D: 特比萘芬

答案：B

58.以下关于5型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

A: 口服后生物利用度较高

B: 口服吸收迅速

C: 代谢产物不具有活性

D: 主要经过肾脏代谢

答案：B

59.喷托维林与水合氯醛合用会出现

A: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

B: 支气管平滑肌痉挛

C: 精神症状

D: 反射亢进，异常发热、昏睡

答案：A

60.关于减鼻充血药禁忌证的描述，错误的是()

A: 12岁以下儿童禁用

B: 萎缩性鼻炎患者禁用

C: 接受单胺氧化酶抑制剂治疗的患者

D: 相应药物过敏者禁用

答案：A

61.属于胃动力药的是

A: 山莨菪碱

B: 胶体果胶铋

C: 熊去氧胆酸

D: 多潘立酮

答案：D

62.西咪替丁的作用原理是()

A: 阻断 α 受体

B: 阻断 β 受体

C: 阻断 H

D: 阻断 H

答案：D

63.监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A: 乳酸脱氢酶

B: 碱性磷酸酶

C: 肌酸激酶

D: 尿淀粉酶

答案：C

64.洋地黄毒苷的半衰期是

A: 72h

B: 5天

C: 7天以上

D: 48h

答案：C

65.长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 白细胞减少

B：肝脏损害

C：眼部水肿

D：中枢神经系统毒性

答案：D

66.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸人、氨茶碱静脉滴注治疗。

A：心律失常

B：惊厥

C：血压下降

D：支气管痉挛

答案：A

67.关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

A：长期应用可产生依赖性

B：可吸附肠内细菌及有毒气体

C：能提高肠张力，减少肠蠕动

D：用于急、慢功能性腹泻

答案：B

68.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是()。

A：阿托伐他汀

B：非诺贝特

C：依折麦布

D：阿昔莫司

答案：A

69.以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

B: 急性前壁心肌梗死

C: 收缩压<90mmHg的严重低血压

D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案：B

70.患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 克林霉素

B: 万古霉素

C: 替考拉宁

D: 左氧氟沙星

答案：B

71.氯沙坦的降压作用机制是()

A: 阻断AT

B: 阻断 β 受体

C: 阻断 α 受体

D: 阻断AT

答案：D

72.无抗结核作用的是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 红霉素

答案：D

73.属于利胆类保肝药的是

A：还原型谷胱甘肽

B：多烯磷脂酰胆碱

C：熊去氧胆酸

D：甘草酸二铵

答案：C

74.以下关于胰高血糖素样肽-1受体激动剂使用的描述，错误的是

A：口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少1小时服用

B：存在发生胰腺炎的风险

C：不良反应主要发生于胃肠道

D：建议与DPP-4抑制剂联用

答案：D

75.金刚烷胺与多潘立酮合用

A：可增加抗胆碱不良反应的危险

B：增加肾毒性

C：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D：增加锥体外系不良反应的风险

答案：D

76.长春碱可用于治疗()。

A：晚期睾丸肿瘤

B：急性淋巴细胞白血病

C：绒毛膜上皮癌

D：晚期前列腺癌

答案：A

77.使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

A：氯化钾

B：果糖

C：氯化钙

D：硫酸镁

答案：C

78.恶心性祛痰药尤其适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰患者的药物是

A：氯化铵

B：溴己新

C：乙酰半胱氨酸

D：氨溴索

答案：A

79.（2015年真题）不属于抗乙型肝炎病毒的药品是（）。

A：泛昔洛韦

B：拉米夫定

C：恩替卡韦

D：干扰素

答案：A

80.（2016年真题）属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是

A：阿托伐他汀

B：非诺贝特

C：阿昔莫司

D：依折麦布

答案：A

81.雄激素可降低的体内物质是

A: 高密度脂蛋白（HDL）

B: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）

C: 低密度脂蛋白（LDL）

D: 乳酸脱氢酶（LDH）

答案：A

82.对G

A: 第四代头孢菌素

B: 第二代头孢菌素

C: 第一代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案：C

83.属于硝基呋喃类的是

A: 夫西地酸

B: 甲硝唑

C: 呋喃妥因

D: 磺胺甲

答案：C

84.抗炎作用较强，水钠潴留最强的激素是

A: 倍他米松

B: 地塞米松

C: 氢化可的松

D: 泼尼松

答案：C

85.对多巴胺描述正确的是()

A：对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效

B：是磷酸二酯酶抑制剂

C：对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

D：可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

答案：D

86.体内代谢迅速,严重过量导致出血时,可用鱼精蛋白拮抗的药物是

A：肝素

B：氯吡格雷

C：依诺肝素

D：阿司匹林

答案：A

87.林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

A：林旦

B：克罗米通

C：莫匹罗星

D：阿达帕林

答案：A

88.下列主要用于防治遗传性血管神经水肿的药物是

A：黄体酮

B：米非司酮

C：司坦唑醇

D：环孢素

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/607114044046010024