

2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版附答案（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 甲巯咪唑
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 放射性 ¹³¹I
- D: 碳酸锂

答案：B

2. 茶碱类支气管平滑肌松弛剂治疗慢阻肺疾病的主要不良反应是

- A: 失眠
- B: 水肿
- C: 口渴
- D: 尿频

答案：A

3. 容易造成溶血，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者禁用的药物是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 环丙沙星
- C: 亚胺培南
- D: 罗红霉素

答案：A

4. 高血压患者的降压目标老年高血压（）

A: <120 / 80mmHg

B: <130 / 80mmHg

C: <140 / 90mmHg

D: <150 / 90mmHg

答案：D

5. 疱疹性脑炎的致病原为

A: HCV

B: HSV-1

C: HSV-2

D: VZV

答案：B

6. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 利多卡因

B: 地高辛

C: 硝酸酯类

D: 普萘洛尔

答案：A

7. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

A: 扎西他滨

B: 恩夫韦替

C: 沙奎那韦

D: 奈韦拉平

答案：C

8. 服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

- A: 普萘洛尔
- B: 吲哚美辛
- C: 格列本脲
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

9. 阿糖腺苷属于

- A: 抗真菌药
- B: 抗过敏药
- C: 抗病毒药
- D: 抗肿瘤药

答案：C

10. 制定新药新知识培训制度，归属

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 管理规范到位
- C: 知识培训
- D: 科学发展

答案：C

11. 药物代谢酶系不成熟或分泌不足，2 周后肝功能趋于完备可影响

- A: 药物中毒
- B: 药物吸收
- C: 药物排泄
- D: 药物代谢

答案：D

12. 药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

- A: 替加色罗存在心绞痛风险
- B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C: 地高辛用于肾功能不全患者
- D: 利巴韦林可致畸与肿瘤

答案：C

13. 以下血浆中脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)高于同年龄正常值
- B: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)高于同年龄正常值
- C: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值
- D: 总胆固醇(TC)高于同年龄正常值

答案：B

14. 患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 心律失常
- B: 刺激性干咳
- C: 二重感染
- D: 水电解质失衡

答案：B

15. 服用西咪替丁等 H₂ 受体阻断剂、地西泮等苯二氮革类药物应该禁用的是

- A: 酒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 食醋

C: 烟

D: 浓茶

答案: C

16. 以保证正常起居（避免夜尿）的是

A: 利尿药

B: 抗忧郁药

C: 氨基糖苷类

D: 阿苯达唑

答案: A

17. 不宜与 5-羟色胺再摄取抑制剂合用的抗震颤麻痹药是

A: 金刚烷胺

B: 苯海索

C: 复方左旋多巴

D: 司来吉兰

答案: D

18. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

A: 氯氮平

B: 阿司匹林

C: 胰岛素

D: 苯妥英钠

答案: D

19. 用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是 ()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 氟马西尼
- B: 二巯丁二钠
- C: 乙酰胺
- D: 纳洛酮

答案：A

20. 由带状疱疹所致的严重后遗症神经痛，应选的药物是()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 芬太尼透皮贴剂
- C: 羟考酮缓释片
- D: 卡马西平片

答案：D

21. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

- A: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素
- B: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁
- C: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶
- D: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷

答案：B

22. 无水乙醇 5ml 加入 10%葡萄糖注射液 100ml 中静滴，用于解救

- A: 有机磷杀虫药中毒
- B: 氰化氢中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 氟乙酰胺中毒

答案：D

23. 服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

- A: 抗利尿药
- B: 抗尿结石药
- C: 苦味健胃药
- D: 利胆药

答案：C

24. 典型结核病的临床表现错误的是

- A: 食欲减退
- B: 高热
- C: 乏力
- D: 咳嗽

答案：B

25. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 维生素 E
- B: 呋塞米
- C: 硝酸甘油
- D: 阿司匹林

答案：D

26. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 地西洋
- C: 利血平
- D: 别嘌醇

答案：B

27. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体：体温 38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 1993U/L，血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性阑尾炎
- B: 急性胰腺炎
- C: 急性胃炎
- D: 急性胆囊炎

答案：B

28. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 $WBC 15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：C

29. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

- A: 包衣片
- B: 糖浆剂
- C: 粉剂
- D: 胶囊剂

答案：B

30. 查找药物信息的正确顺序是 ()。

- A: 二级信息源 → 三级信息源 → 一级信息源

B: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

C: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

D: 二级信息源→一级信息源→三级信息源

答案：C

31. 患者，男，28 岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 对氨基水杨酸

D: 利福平

答案：B

32. 一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 克仑特罗(瘦肉精)

B: 拟除虫菊酯类杀虫药

C: 磷化锌等灭鼠药

D: 香豆素类杀鼠药

答案：D

33. 高血压合并肾脏疾病，首选

A: β 受体阻滞药

B: 利尿药

C: 血管紧张素转化酶抑制药

D: α 受体阻滞药

答案：C

34. 过敏性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 碘苷
- B: 维生素 B2
- C: 色甘酸钠
- D: 磺胺醋酰钠

答案：C

35. 某患者，男，78 岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

- A: 泼尼松龙
- B: 丙酸睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 吲达帕胺

答案：C

36. 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 氯沙坦
- C: 螺内酯
- D: 美托洛尔

答案：B

37. 慢性肝炎尤其是肝硬化时，肝功能检查结果可能显示的是

- A: ALT 上升幅度大
- B: AST 上升幅度高于 ALT

C: AST、ALT 同时上升

D: AST 上升幅度大

答案：B

38. 患者，男，53 岁，季节性过敏性鼻炎病史 5 年，3 天前，受凉后出现流涕、鼻塞、咳嗽，咳痰，低热，头痛，无胸闷、气短等其他不适，已在医院发热门诊完成了鼻拭子检查，排除了甲型流感和 Z 型流感，诊断为普通感冒。

A: 含伪麻黄碱的复方抗感冒药

B: 神经氨酸酶抑制剂

C: 解热镇痛药

D: 鼻用减充血剂

答案：B

39. 下列分析方法中，不属于药物经济学评价方法的是()

A: 成本-效益分析法

B: 最小成本分析法

C: 成本-效用分析法

D: 成本-效应分析法

答案：D

40. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是()

A: 别嘌醇

B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 非布索坦

答案：C

41. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 糖皮质激素
- B: 阿司匹林
- C: 抗菌药物
- D: 布洛芬

答案：A

42. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 淡橙色
- B: 淡黄色
- C: 淡红色
- D: 淡绿色

答案：B

43. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

- A: 酚酞
- B: 莫沙必利
- C: 地芬诺酯
- D: 八面体蒙脱石

答案：C

44. 痛风时尿沉渣结晶为（）

- A: 草酸盐结晶？

- B: 酪氨酸?
- C: 尿酸盐结晶?
- D: 磷酸盐结晶?

答案: C

45. 肾衰竭者不能

- A: 洗胃
- B: 实施血液净化
- C: 强利尿
- D: 催吐

答案: C

46. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的叙述中，最正确的是

- A: 餐后服用非甾体类抗炎药?
- B: 清晨使用糖皮质激素?
- C: 清晨服用驱虫药?
- D: 餐前服用氢氧化铝凝胶?

答案: B

47. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 普伐他汀
- B: 哌唑嗪
- C: 左旋氨氯地平
- D: 曲美他嗪

答案: C

48. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 紫杉醇
- B: 氟尿嘧啶
- C: 环磷酰胺
- D: 阿霉素

答案：B

49. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法,错误的是()
- A: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
 - B: 抗抑郁药起效较快,使用 1 周后可判疗效
 - C: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
 - D: 应尽可能单一用药,足量、足疗程治疗

答案：B

50. 有关一级信息的特点描述, 错误的是
- A: 含有研究的具体细节
 - B: 内容比二、三级信息更新
 - C: 结论正确
 - D: 对读者专业水平要求高

答案：C

51. 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等"双硫仑反应"的药品是
- A: 甲硝唑
 - B: 庆大霉素
 - C: 青霉素钾
 - D: 克林霉素

答案：A

52. 仅用于解热、镇痛的非处方药是

- A: 氢化可的松
- B: 布洛芬
- C: 西咪替丁
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

53. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

- A: 心、肝、肾及胃肠等主要器官的功能在不断下降
- B: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长
- C: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒
- D: 与血浆蛋白的结合率增加，使游离型药物减少

答案：D

54. 抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄（）

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 维拉帕米
- D: 依那普利

答案：D

55. 不能受潮的药物是

- A: 维生素 D
- B: 鱼肝油乳
- C: 碘化钾片
- D: 叶酸

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

56. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 50A 两种浓度葡萄糖注射液混合配制，分别需要

- A: 85ml 和 415ml
- B: 56ml 和 444ml
- C: 94ml 和 406ml
- D: 72ml 和 428ml

答案：B

57. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 比索洛尔
- B: 雷米普利
- C: 氟伐他汀
- D: 左旋氨氯地平

答案：B

58. 应用格列本脲时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮茶
- B: 用药期间宜吃高蛋白食物
- C: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物
- D: 服药期间不宜饮酒

答案：D

59. 高血压病的治疗原则低危患者（）

- A: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- B: 立即进行抢救治疗
- C: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- D: 立即使用抗高血压药物

答案：A

60. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

- A: 60 例
- B: 40 例
- C: 80 例
- D: 20 例

答案：A

61. 下列有关焦虑症的叙述，错误的是

- A: 社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交，导致社交隔离
- B: 惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式
- C: 焦虑症有家族聚集性，女性焦虑症的患病率较高
- D: 大多数焦虑症起源于儿童或者青春期

答案：B

62. 人体贮存能量的形式为

- A: 糖化血红蛋白
- B: 高密度脂蛋白胆固醇
- C: 三酰甘油
- D: 胆固醇

答案：C

63. 无症状菌尿

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次幽现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10\text{scfu/ml}$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

D: 宜选用毒性小的抗菌药物

答案：B

64. 公众用药咨询的内容是

A: 抗菌药物的合理使用

B: 减肥、补钙、补充营养素

C: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法

D: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

答案：B

65. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

B: 规律性上腹痛

C: 突发上腹剧痛，继而至全腹

D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：D

66. 为避免重复用药，书写处方时，药品名称应采用

A: 商品名

B: 专利名

C: 化学名

D: 通用名

答案：D

67. 以“保证贮存和发出的药品质量合格”为职责的技能是

A: 沟通技能

- B: 自主学习能力
- C: 调剂技能
- D: 药品管理技能

答案：D

68. (2015 年真题) 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是 ()

- 。
- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 塞来昔布
- D: 双氯芬酸

答案：C

69. 出现粪便显黑色，粪隐血呈阳性症状时，首先考虑的疾病是

- A: 胃、十二指肠溃疡伴出血
- B: 痔疮，肛裂
- C: 过敏性肠炎
- D: 阿米巴痢疾

答案：A

70. 一般情况下，以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

- A: 中毒后 6~8 小时以内
- B: 中毒后 4~6 小时以内
- C: 毒物经口进入体内 4~6 小时以内
- D: 中毒后 2~4 小时以内

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

71. 患者治疗 3 天后，感染控制不佳，痰培养及药敏报告提示病原菌为对青霉素高水平耐药的肺炎链球菌，可将抗菌药物调整为（）

- A: 阿奇霉素
- B: 哌拉西林他唑巴坦
- C: 莫西沙星
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：C

72. 可促进肾小管对钠的重吸收，从而造成水钠潴留，易引起药源性高血压的药物是

- A: 地塞米松
- B: 阿司匹林
- C: 麻黄碱
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：A

73. 1 型糖尿病患者首选的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 二甲双胍
- C: 格列苯脲
- D: 胰岛素

答案：D

74. 抗利尿药

- A: 去氨加压素
- B: 硝酸甘油
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 甘草合剂

答案：A

75. 可主要引起淋巴细胞增多的疾病为

- A: 肾移植术后发生排斥反应
- B: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等
- C: 糖尿病
- D: 胃溃疡

答案：A

76. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素
- B: 糖皮质激素
- C: 伪麻黄碱
- D: 咖啡因

答案：C

77. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 头孢吡肟
- B: 莫西沙星
- C: 氨苄西林
- D: 阿莫西林

答案：B

78. 患者, 男, 56 岁, 慢性乙型肝炎患者, ALT120U/L。下列药物中可以使用的是

- A: 氟康唑
- B: 利福平
- C: 水飞蓟素
- D: 异烟肼

答案：C

79. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 复视
- B: 视物时症状加重
- C: 泪液减少
- D: 眼睑沉重、痉挛

答案：B

80. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

- A: 依那普利
- B: 美托洛尔
- C: 哌唑嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

81. 与甲氧苄啶组成复方制剂复方新诺明的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 替硝唑

D: 磺胺多辛

答案: B

82. 合用维生素 B12 与陈皮，可以达到的效果是

A: 促进维生素 B12 的吸收

B: 抑制维生素 B12 的代谢

C: 加快维生素 B12 的排泄

D: 减少维生素 B12 的氧化

答案: A

83. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

A: 喷托维林 25mg tid

B: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid

C: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid

D: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h

答案: D

84. “根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

A: 询问用药过敏史和家族史

B: 排除药物以外的因素

C: 流行病学的调查

D: 致病药物的确定

答案: D

85. 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- C: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
- D: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

答案: A

86. 患混合型高脂血症, 治疗时可与 ω -3 脂肪酸制剂联合应用的调脂药是

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸类
- C: 依折麦布
- D: 氯贝丁酯

答案: A

87. 患者, 男, 48 岁, 近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状, 就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 阿奇霉素
- B: 硝酸甘油
- C: 呋塞米
- D: 依那普利

答案: D

88. 药物相互作用是双向的, 既可能产生对患者有益的结果, 使疗效协同或毒性降低; 也可能产生对患者有害的结果, 使疗效降低和毒性增强, 有时会带来严重后果, 甚至危及生命。

- A: 协同作用
- B: 减少不良反应

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 竞争性拮抗作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/608007130047007022>