

# 神经系统疾病专项诊疗考核试题

## 一、选择题

1、患者，男，55岁，头痛3个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内肿瘤、颅内压增高，拟行开颅手术。入院后第3日，患者出现剧烈头痛呕吐频繁，烦躁不安，右侧瞳孔散大，左侧肢体肌力减退，病理征阳性。此时可能出现了（ ）[单选题]\*

- A、左侧颞叶疝
- B、大脑镰下疝
- C、枕骨大孔疝
- D、高血压危象
- E、右侧颞叶疝✓

2、患者，男，55岁，头痛3个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内肿瘤、颅内压增高，拟行开颅手术。行开颅手术后，医师在手术中放置了脑室引流，术后引流管护理，不妥的是（ ）[单选题]\*

- A、引流管开口高于侧脑室平面15cm
- B、妥善固定引流管
- C、每日引流量以不超过500ml为宜
- D、定时无菌生理盐水冲洗✓
- E、观察并记录引流液的颜色、性状和量

3、患者，男，14岁，因多饮多尿5年，双眼视物不清3年，头痛伴呕吐2个月入院。经检查诊断为颅咽管瘤。首选的治疗方法是（ ）[单选题]\*

A、手术治疗✓

B、化学治疗

C、放射治疗

D、免疫治疗

E、基因治疗

4、患者，男，14岁，因多饮多尿5年，双眼视物不清3年，头痛伴呕吐2个月入院。经检查诊断为颅咽管瘤。术后患者出现多尿，每日尿量大于4000ml，尿比重低于1.005。可能发生的并发症是（ ）[单选题]\*

A、尿失禁

B、颅内高压

C、泌尿系统感染

D、药物副作用

E、尿崩症✓

5、在静脉补钾时，假设200ml液体，最多可加入10%氯化钾的量是（ ）[单选题]\*

A、12ml

B、10ml

C、8ml

D、6ml✓

E、3ml

6、患者，男，23岁，因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷1小时，清醒后诉头痛，有呕吐，右上肢肌无力2级，脑脊液检查有红细胞，CT见左额顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。根据患者目前表现符合（ ）[单选题]\*

- A、脑震荡
- B、弥散性轴索损伤
- C、脑挫裂伤✓
- D、脑干损伤
- E、颅内血肿

7、患者，男，23岁，因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷1小时，清醒后诉头痛，有呕吐，右上肢肌无力2级，脑脊液检查有红细胞，CT扫描见左额顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。目前的关键处理措施是（ ）[单选题]\*

- A、静卧
- B、床头抬高15°-30°
- C、营养支持
- D、应用抗生素
- E、防止脑水肿✓

8、患者，男，23岁，因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷1小时，清醒后诉头痛，有呕吐，右上肢肌无力2级，脑脊液检查有红细胞，CT扫描见左额顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。目前患者病情观察的重点在于及时发现（ ）[单选题]\*

- A、呼吸道梗阻
- B、颅内压增高、脑疝✓
- C、压疮
- D、水、电解质紊乱
- E、感染

9、患者，男，24岁，头部外伤后持续头痛，呕吐数次，嗜睡，急诊入院，CT检查显示颅内占位，初

步诊断:颅内占位伴颅内压增高。下列哪项是颅内压增高的三主征表现之一 ( ) [单选题]\*

- A、呼吸慢而有力
- B、脉搏慢而有力
- C、视乳头水肿✓
- D、脉压增大
- E、血压升高

10、患者，男，24岁，头部外伤后持续头痛，呕吐数次，嗜睡，急诊入院，CT检查显示颅内占位，

初步诊断:颅内占位伴颅内压增高。当前首要的处理是 ( ) [单选题]\*

- A、给予镇痛处理，休息1周
- B、给予止呕处理，休息1周
- C、急诊行开颅减压术
- D、密切监测各项生命体征
- E、给予脱水利尿治疗，同时进一步检查✓

11、患者如果采用脱水治疗，下列描述不的是 ( ) [单选题]\*

- A、20%甘露醇 250ml，30分钟内快速静脉滴注
- B、1-2小时后甘露醇可重复使用✓
- C、同时使用利尿剂效果更好
- D、停用脱水剂时，应逐渐减量
- E、脱水治疗期间，应准确记录出入量

12、患者，男，24岁，头部外伤后持续头痛，呕吐数次，嗜睡，急诊入院，CT检查显示颅内占位，

初步诊断:颅内占位伴颅内压增高,如果采用脱水治疗，下列描述不的是 ( ) [单选题]\*

- A、20%甘露醇 250ml，30分钟内快速静脉滴注

- B、1-2 小时后甘露醇可重复使用✓
- C、同时使用利尿剂效果更好
- D、停用脱水剂时，应逐渐减量
- E、脱水治疗期间，应准确记录出入量

13、患者，男性，35 岁。脑挫裂伤致颅内高压。下列护理措施不是的是（ ）[单选题]\*

- A、密切观察病情变化
- B、便秘时高压灌肠✓
- C、应用脱水剂
- D、限制液体摄入量
- E、呼吸不畅可行气管切开

14、患者，男，20 岁。发作性意识丧失 2 年，每次发作均伴有全身不自主抽搐，尿失禁，口吐白沫，持续约 2 分钟。意识逐渐恢复后，对抽搐全无记忆。首先考虑的诊断是（ ）[单选题]\*

- A、癔病
- B、晕厥
- C、癫痫✓
- D、低血糖休克
- E、短暂性脑缺血发作

15、患者，男，20 岁。发作性意识丧失 2 年，每次发作均伴有全身不自主抽搐，尿失禁，口吐白沫，持续约 2 分钟。意识逐渐恢复后，对抽搐全无记忆。对该患者的护理措施中不妥的是（ ）[单选题]\*

- A、迅速扶患者就地躺下
- B、保持患者侧卧位
- C、放松患者领扣、裤带

D、用纱布包裹的压舌板塞入患者上下臼齿间

E、发作完全控制后尽快停药，以减轻药物副作用✓

16、患者，男性，26岁。昨晚9时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约30秒，患者仍神志不清，间隔20分钟后，再次出现此症状，持续约10秒，有小便失禁，约3小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。控制癫痫持续状态的首选药物是（ ）[单选题]\*

A、地西洋✓

B、丙戊酸钠

C、氯丙嗪

D、卡马西平

E、苯妥英钠

17、患者，男性，26岁。昨晚9时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约30秒，患者仍神志不清，间隔20分钟后，再次出现此症状，持续约10秒，有小便失禁，约3小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。本病最具特征性的检查是（ ）[单选题]\*

A、CT

B、脑电图✓

C、核磁共振

D、生化检查

E、抽脑脊液

18、患者，男性，65岁，高血压病史30年，糖尿病史10年。情绪激动后突然倒地，呼之不醒，即送医院急诊。检查发现，患者意识不清，瞳孔缩小，双眼凝视一侧，一侧肢体偏瘫，血压160/90mmHg，呼吸24次/分，心率98次/分，初步诊断为脑出血。要确定诊断，最有价值的检查是（ ）[单选题]\*

- A、脑部同位素扫描
- B、脑血管造影
- C、头颅 X 线检查
- D、头颅超声波检查
- E、头颅 CT 检查✓

19、患者，男，73 岁，因脑出血入院，体温 39℃，神志不清。该患者最容易发生压疮的部位是（ ）[单选题]\*

- A、枕后
- B、骶尾部✓
- C、肘关节
- D、膝关节
- E、足跟部

20、男性患者，58 岁，外出途中突然头痛，眩晕，伴呕吐，走路不稳，查血压 180/105mmHg，心率 62 次/分，双眼向右震颤，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。最可能的疾病是（ ）[单选题]\*

- A、脑桥出血
- B、基底节区出血
- C、小脑出血✓
- D、大脑中动脉梗死
- E、脑血栓形成

21、患者，男性，60 岁。原发性高血压近 20 年，与邻居发生口角后突然昏迷不醒，呕出咖啡样液体，急送医院。体格检查:T39℃，一侧肢体瘫痪、偏身感觉障碍，同向偏盲，初步诊断为脑出血，出血部位可能在（ ）。（ ）[单选题]\*

A、内囊✓

B、小脑

C、脑桥

D、脑室

E、蛛网膜下腔

22、患者，男性，78岁。高血压23年。因突发右侧肢体活动不便3小时入院。查体：神志清楚，呼吸21次/分，脉搏95次/分，血压175/105mmHg，右侧肢体可见肌肉收缩，但无肢体运动，肌力1级。医嘱要求进行CT检查，护士应首先（ ）[单选题]\*

A、先等患者用完餐后再送检查

B、确认CT检查是否收费

C、向家属解释CT与MRI的区别

D、安排用平车运送患者✓

E、为保证检查顺利进行，应携带氧气枕

23、患儿，男，6岁。发热、头痛、恶心，伴抽搐、意识障碍1天入院。入院后查体：T40.5℃，浅昏迷，病理征阳性，脑膜刺激征阳性。血常规：WBC $14 \times 10^9/L$ ，中性86%，尿常规未见异常。下列护理措施正确的是（ ）[单选题]\*

A、卧床休息，适当运动

B、采取仰卧位，头低脚高位，头偏向一侧

C、不可采用乙醇擦浴法降温

D、鼓励患者多饮水，给予低蛋白饮食

E、恢复期给以针灸、理疗、按摩、功能锻炼等促进康复✓

24、患者，男性，26岁。昨晚9时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双

下肢伸直，持续约 30 秒，患者仍神志不清，间隔 20 分钟后，再次出现此症状，持续约 10 秒，有小便失禁，约 3 小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。该患者应考虑为（ ）[单选题]\*

- A、失神发作
- B、肌阵挛发作
- C、癫痫持续发作
- D、强直发作✓
- E、阵挛性发作

25、患者，男性，26 岁。昨晚 9 时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约 30 秒，患者仍神志不清，间隔 20 分钟后，再次出现此症状，持续约 10 秒，有小便失禁，约 3 小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。癫痫发作时的治疗措施的是（ ）[单选题]\*

- A、当患者正处于意识丧失和全身抽搐时，原则上是预防外伤及其他并发症✓
- B、立即把患者抱到床上，平卧，保持呼吸道通畅，及时吸氧
- C、必要时可用约束带约束四肢防自伤
- D、立即口服抗癫痫药
- E、及时为患者进行心电监护

26、患者，男性，26 岁。昨晚 9 时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约 30 秒，患者仍神志不清，间隔 20 分钟后，再次出现此症状，持续约 10 秒，有小便失禁，约 3 小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。控制癫痫持续状态的首选药物是（ ）[单选题]\*

- A、地西洋✓
- B、丙戊酸钠
- C、氯丙嗪

D、卡马西平

E、苯妥英钠

27、患者，男性，26岁。昨晚9时突发两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握，双下肢伸直，持续约30秒，患者仍神志不清，间隔20分钟后，再次出现此症状，持续约10秒，有小便失禁，约3小时后，患者能唤醒，但有烦躁。为进一步诊治入院。本病最具特征性的检查是（ ）[单选题]\*

A、CT

B、脑电图✓

C、核磁共振

D、生化检查

E、抽脑脊液

28、患者，女，63岁。因“双侧肢体抖动、动作缓慢1年余，加重半年”入院，诊断为帕金森病收治入院。该病主要临床表现除外（ ）[单选题]\*

A、震颤

B、肌强直

C、动作过多✓

D、姿态步态异常

E、动作迟缓

29、患者，女，63岁。因“双侧肢体抖动、动作缓慢1年余，加重半年”入院，诊断为帕金森病收治入院。为保证森病患者安全，护士指导患者的内容不包括（ ） [单选题]\*

A、避免登高及操作高运转的器械

B、外出时应有人陪伴

C、随身携带标有患者姓名、住址、联系电话的“安全卡片”

D、一个人有空时进行适当体育锻炼✓

E、加强日常生活、平衡功能的康复训练

30、患者，女，63岁。因“双侧肢体抖动、动作缓慢1年余，加重半年”入院，诊断为帕金森病收治入院。患者进行行走训练时，护士应提醒患者避免（ ）[单选题]\*

A、思想尽量放松

B、尽量跨大步

C、将注意力集中于地面✓

D、双臂尽量摆动

E、脚步尽量抬高

31、患者，男，78岁，高血压30余年，因与他人争吵，突然出现头痛、呕吐、言语不清，跌倒在地，之后神志不清，大小便失禁。体检：昏迷，左侧瞳孔8mm，右侧3mm，血压180/100mmHg，呼吸16次/分，脉搏54次/分。头颅CT示一侧基底节内囊区高密度影。考虑患者出现上述病症的原因（ ）[单选题]\*

A、脑出血✓

B、脑梗死

C、短暂性脑缺血发作

D、蛛网膜下腔出血

E、脑肿瘤破裂

32、患者，男，78岁，高血压30余年，因与他人争吵，突然出现头痛、呕吐、言语不清，跌倒在地，之后神志不清，大小便失禁。体检：昏迷，左侧瞳孔8mm，右侧3mm，血压180/100mmHg，呼吸16次/分，脉搏54次/分。头颅CT示一侧基底节内囊区高密度影。目前首先应采取的措施是（ ）[单选题]\*

A、使用药物降血压

B、使用止血药物

C、脱水降颅压✓

D、立即手术

E、行脑室穿刺

33、脑干是指 ( ) [单选题]\*

A、延髓、脑桥和丘脑

B、延髓，脑桥和中脑✓

C、延髓，丘脑和中脑

D、脑桥、中脑和丘脑

E、延髓，脑桥和间脑

34、成人临床腰椎穿刺常选在 ( ) [单选题]\*

A、第 12 胸椎体下缘

B、第 1 腰椎体下缘

C、第 2 腰椎体下缘

D、第 3 腰椎体上缘

E、第 3~4 腰椎之间或第 4~5 腰椎之间✓

35、有关小儿大脑发育正确的是 ( ) [单选题]\*

A、小儿出生时大脑外观与成人有明显区别

B、髓鞘形成不全，对外来刺激反应迅速不易泛化

C、大脑皮质下中枢发育不成熟

D、大脑灰质与白质分界清楚

E、小儿的脑耗氧量在基础代谢状态下占总耗氧量的 50%✓

36、腰椎穿刺后的患者颅压过低引起头痛的机制是 ( ) [单选题]\*

- A、脑部血液循环障碍
- B、脑代谢障碍
- C、脑部缺血、缺氧
- D、牵张颅内静脉窦和脑膜✓
- E、脑膜受刺激

37、由脊髓发出的脊神经数量是 ( ) [单选题]\*

- A、28 对
- B、29 对
- C、30 对
- D、31 对✓
- E、32 对

38、颅内压增高的常见原因是 ( ) [单选题]\*

- A、脑水肿✓
- B、颅底凹陷性骨折
- C、颅内肿瘤
- D、颅内血肿
- E、狭颅征

39、不属于颅内压增高早期临床表现的是 ( ) [单选题]\*

- A、头痛
- B、呕吐
- C、脉搏增快✓

D、意识障碍

E、血压升高

40、引起枕骨大孔疝的是 ( ) [单选题]\*

A、小脑扁桃体的移位✓

B、颞叶钩回和海马回的移位

C、脑桥的移位

D、中脑的移位

E、脑干的移位

41、小脑幕切迹疝导致瞳孔的变化是由于疝入的脑组织压 ( ) [单选题]\*

A、动眼神经✓

B、滑车神经

C、展神经

D、视神经

E、三叉神经

42、小脑幕切迹疝时的瞳孔变化是 ( ) [单选题]\*

A、逐渐散大

B、逐渐缩小

C、先缩小后散大✓

D、先散大后缩小

E、无明显变化

43、小脑幕切迹疝与枕骨大孔疝的临床表现不同的是 ( ) [单选题]\*

A、头痛剧烈

- B、呕吐频繁
- C、意识障碍出现较早✓
- D、血压升高，脉缓有力
- E、呼吸骤停出现的时间不同

44、颅内压增高患者死亡的主要原因是（ ）[单选题]\*

- A、窒息
- B、猝死
- C、脑疝✓
- D、呼吸衰竭
- E、循环衰竭

45、颅内压明显增高时禁做腰椎穿刺是为了避免（ ）[单选题]\*

- A、颅内压继续增高
- B、脑脊液漏
- C、小脑幕切迹疝
- D、枕骨大孔疝✓
- E、颞叶为回疝

46、目前治疗脑水肿的脱水剂中，应用最广泛、疗效较好的是（ ）[单选题]\*

- A、呋塞米
- B、20%甘露醇✓
- C、25%山梨醇
- D、地塞米松
- E、50%葡萄糖

47、对颅内高压患者的处理错误的是（ ）[单选题]\*

- A、密切观察病情变化
- B、便秘时高压灌肠√
- C、应用脱水剂
- D、限制液体入量
- E、呼吸不畅可行气管切开

48、下列关于冬眠降温治疗期间的护理叙述，错误的是（ ）[单选题]\*

- A、通常体温降至 32~34℃
- B、降温前先给患者使用冬眠药物
- C、冬眠期间不宜翻身或移动体位
- D、收缩压低于 80mmHg 应停药
- E、复温时应先停止使用冬眠药物√

49、颅内压增高患者的护理措施，正确的是（ ）[单选题]\*

- A、平卧位
- B、不需要限制输液速度
- C、成人每日输液量控制在 1500ml 以内
- D、成人每日输入的等渗盐水不超过 1000ml
- E、成人保持每日尿量不少于 600ml√

50、患者男，37 岁。头部外伤后昏迷 2 小时，曾呕吐数次。入院测血压 150/75mmHg，脉搏 60 次/min，呼吸 12 次/min。考虑为“脑挫裂伤”，给予非手术治疗。为降低颅内压其体位应（ ）[单选题]\*

- A、床头抬高 15°~30°√
- B、半坐卧位

C、头低足高位

D、端坐卧位

E、平卧位

51、患者男，24岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT检查示颅骨线形骨折，3天后患者头痛加重，喷射性呕吐2次，昏迷，查右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高。此时患者最可能发生了（ ）[单选题]\*

A、脑震荡

B、脑挫裂伤

C、脑内血肿

D、枕骨大孔疝

E、小脑幕切迹疝✓

52、患者男，24岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT检查示颅骨线形骨折，3天后患者头痛加重，喷射性呕吐2次，昏迷，查右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高。此时患者的颅内压至少高于（ ）[单选题]\*

A、50mmH<sub>2</sub>O

B、70mmH<sub>2</sub>O

C、100mmH<sub>2</sub>O

D、150mmH<sub>2</sub>O

E、200mmH<sub>2</sub>O✓

53、患者男，24岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT检查示颅骨线形骨折，3天后患者头痛加重，喷射性呕吐2次，昏迷，查右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高。目前对该患者的护理，错误的是（ ）[单选题]\*

- A、吸氧
- B、静脉快速补液✓
- C、应用利尿剂和激素
- D、静脉快速输入脱水剂
- E、做好急症手术准备

54、患者女，29岁。枕部外伤后2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折，行CT检查时突然呼吸停止，昏迷，双侧瞳孔等大。护士应考虑患者最可能发生了（ ）[单选题]\*

- A、原发性脑干损伤
- B、小脑幕切迹疝
- C、枕骨大孔疝✓
- D、休克
- E、脑挫伤

55、患者女，29岁。枕部外伤后2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折，行CT检查时突然呼吸停止，昏迷，双侧瞳孔等大。患者经积极抢救治疗，病情恢复后出院。关于健康教育，下列叙述不正确的是（ ）[单选题]\*

- A、条件不允许的情况下可用电话和患者保持联系
- B、出院后教育可以是一次性的✓
- C、利用访视机会评价教育效果
- D、社区护士有责任对患者进行出院后的教育
- E、出院前应给患者制订出院指导计划

56、血肿较局限，触诊无波动感的是（ ）[单选题]\*

- A、皮下血肿✓

B、帽状腱膜下血肿

C、骨膜下血肿

D、硬膜外血肿

E、硬膜下血肿

57、最严重的头皮损伤是 ( ) [单选题]\*

A、头皮裂伤

B、皮下血肿

C、帽状腱膜下血肿

D、骨膜下血肿

E、头皮撕脱伤✓

58、头皮不完全撕脱患者进行清创缝合的时间应争取在伤后 ( ) [单选题]\*

A、2~4 小时

B、4~6 小时

C、6~8 小时✓

D、8~10 小时

E、10~12 小时

59、患者女，30 岁。左手腕受伤不慎离断。对断肢的保存方法正确的是 ( ) [单选题]\*

A、生理盐水浸泡

B、10%葡萄糖液浸泡

C、伤口外用抗生素

D、干燥包裹 4°C 左右冷藏✓

E、0°C 以下低温冷冻保存

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608113045023006035>