2024年广东省江海区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库大全（研优卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.酰胺醇类药的主要作用靶点是

A：核糖体的30S亚基

B：核糖体的50S亚基

C：细胞内膜PBP

D：细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：B

2.黄体酮治疗先兆流产，必须肌内注射给药的主要理由是()

A：口服吸收缓慢

B：口服用药排泄快

C：肌内注射吸收迅速

D：口服后在消化道和肝内被迅速破坏

答案：D

3.属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常药物的是()

A：胺碘酮

B：普鲁卡因胺

C：奎尼丁

D：普罗帕酮

答案：A

4.（2020年真题）与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A：柔红霉素

B：阿糖胞苷

C：甲氨蝶呤

D：右雷佐生

答案：A

5.下列对铜绿假单胞菌作用最强的抗菌药物是

A：头孢曲松

B：头孢哌酮

C：头孢噻肟

D：头孢甲肟

答案：B

6.袢利尿药发挥利尿的作用点是

A：磷酸二酯酶

B：Na^+-Cl^-共转运子

C：Na^+-K^+-2Cl^-同向转运子

D：碳酸酐酶

答案：C

7.属于保钾利尿药的是

A：螺内酯

B：呋塞米

C：甘露醇

D：氢氯噻嗪

答案：A

8.（2017年真题）导致视神经炎的抗结核药的是（）

A：吡嗪酰胺

B：利福喷丁

C：乙胺丁醇

D：利福平

答案：C

9.选择性舒张脑血管的药物是

A：维拉帕米

B：地尔硫革

C：硝苯地平

D：氟桂利嗪

答案：D

10.使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

A：氯化钙

B：果糖

C：硫酸镁

D：氯化钾

答案：D

11.治疗绦虫病的首选药品是()。

A：伯氨喹

B：哌嗪

C：伊维菌素

D：吡喹酮

答案：D

12.患者女,58岁血糖升高10年,口服二甲双胍治疗:高血压病史5年未规律治疗近期查体:血压158/95mmHg尿常规示蛋白尿（++）适宜该患者使用的降压药物是（）

A: 甲基多巴

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 依那普利

答案：D

13.下列不属于雌激素禁忌证的是

A: 乳腺癌

B: 儿童禁用

C: 急慢性肝功能不全

D: 生殖系统恶性肿瘤

答案：B

14.使用后可产生抗体，1年内不宜再次使用的药物是

A: 尿激酶

B: 瑞替普酶

C: 阿替普酶

D: 链激酶

答案：D

15.（2021年真题）患者，男，46岁。新诊断为高血压，最高血压155/95mmHg,心率100次1分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是（）

A: 氢氯噻嗪

B: 硝酸甘油

C：氯沙坦

D：美托洛尔

答案：D

16.利福平抗结核杆菌的作用原理是

A：抑制蛋白质合成

B：抑制RNA多聚酶

C：抑制结核杆菌叶酸的代谢

D：抑制分枝菌酸合成

答案：B

17.（2019年真题）患者，男，52岁，BMI28kg/m2，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是（）

A：别嘌醇

B：碳酸氢钠

C：秋水仙碱

D：非布司他

答案：C

18.（2019年真题）可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物（）

A：氨基糖苷类

B：大环内酯类

C：四环素类

D：氟喹诺酮类

答案：D

19.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 甲硝唑

B: 伯氨喹

C: 氯喹

D: 奎宁

答案：A

20.很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

A: 维生素B2

B: 维生素AD

C: 维生素C

D: 精氨酸

答案：A

21.易引起过敏性休克的药物是()

A: 青霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 四环素

D: 链霉素

答案：A

22.与肝素相比，华法林的作用特点不包括

A: 口服有效，应用方便

B: 起效快

C: 作用持久

D: 价格便宜

答案：B

23.患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是()。

A：性欲减退

B：心悸

C：脱发

D：体位性低血压

答案：A

24.（2015年真题）李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是（）。

A：辛伐他汀

B：米氮平

C：阿司匹林

D：二甲双胍

答案：B

25.（2020年真题）属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

A：异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

B：异烟肼、利福平、莫西沙星

C：莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

D：异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：A

26.以下药物中，不属于散瞳类药物的是

A：阿托品

B：复方托吡卡胺

C：去氧肾上腺素

D：卡波姆

答案：D

27.抑制碳酸酐酶的药物是

A：乙酰唑胺

B：呋塞米

C：氢氯噻嗪

D：氨苯蝶啶

答案：A

28.属于抗雌激素类的是()

A：睾酮

B：甲地孕酮

C：他莫昔芬

D：己烯雌酚

答案：C

29.（2020年真题）通过抑制A型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

A：阿米替林

B：舍曲林

C：吗氯贝胺

D：度洛西汀

答案：C

30.布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

A：100倍

B：40倍

C：15倍

D：25倍

答案：B

31.选择性抑制COX-2的是

A：阿司匹林

B：吲哚美辛

C：塞来昔布

D：对乙酰氨基酚

答案：C

32.易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

A：胰岛素

B：格列本脲

C：格列吡嗪

D：甲苯磺丁脲

答案：B

33.呋塞米的利尿作用机制主要是

A：抑制碳酸酐酶

B：特异性阻滞Na+通道

C：抑制Na+-K+-2Cl-同向转运子

D：抑制Na+-H+交换

答案：C

34.（2019年真题）患者，女，55岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是（）

A：氟胞嘧啶

B：卡泊芬净

C：氟康唑

D：特比萘芬

答案：D

35.具有较强的M受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

A：奥昔布宁

B：睾酮

C：A型肉毒毒素

D：西地那非

答案：A

36.已用指南推荐剂量或达到ACEI／ARB最大耐受剂量后，收缩压>95mmHg，NYHA心功能Ⅱ～Ⅲ级、仍有症状的HFrEF患者，可用

A：卡托普利

B：美托洛尔

C：伊伐布雷定

D：沙库巴曲缬沙坦

答案：D

37.与长春新碱合用可产生严重的周围神经病

A：非格司亭

B：替尼泊苷

C：铂类

D：异烟肼

答案：A

38.无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性,可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

A: 屈螺酮

B: 地屈孕酮

C: 环丙孕酮

D: 甲羟孕酮

答案：B

39.沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

A: 比索洛尔

B: 螺内酯

C: 贝那普利

D: 呋塞米

答案：C

40.治疗青光眼宜选用

A: 复方托吡卡胺滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：D

41.癫痫部分性发作首选()。

A: 苯妥英钠

B: 乙琥胺

C: 奥卡西平

D: 氯巴占

答案：C

42.甲氨蝶呤主要用于

A：慢性粒细胞性白血病

B：室管膜瘤

C：神经母细胞瘤

D：儿童急性白血病

答案：D

43.脓疱型痤疮可选用()

A：阿达帕林

B：林旦霜

C：维A酸

D：酮康唑

答案：A

44.抑制脱氧胸苷酸合成酶

A：甲氨蝶呤

B：羟基脲

C：阿糖胞苷

D：氟尿嘧啶

答案：D

45.与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

A：地芬诺酯

B：双八面体蒙脱石

C：酚酞

D：莫沙必利

答案：A

46.早产系指妊娠在多少周之间结束者

A：18~37周

B：25~37周

C：28~38周

D：28~37周

答案：D

47.属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

A：奎宁

B：吡喹酮

C：青蒿素

D：乙胺嘧啶

答案：D

48.体内缺乏维生素E会导致

A：孕育异常

B：佝偻病

C：夜盲症

D：脚气病

答案：A

49.使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是()

A：肌酐清除率低于30%的患者

B：肌酐清除率低于50%的患者

C：肌酐清除率低于60%的患者

D：肌酐清除率低于40%的患者

答案：B

50.属于多巴胺D2受体阻断剂的是

A：奥美拉唑

B：氯苯那敏

C：多潘立酮

D：法莫替丁

答案：C

51.作用于DNA拓扑异构酶Ⅱ的抗肿瘤药物是

A：顺铂

B：依托泊苷

C：紫杉醇

D：来曲唑

答案：B

52.由我国学者发现并用于抗疟的是

A：链霉素

B：二氯沙奈

C：青蒿素

D：甲硝唑

答案：C

53.螺内酯临床常用于()

A：醛固酮升高引起的水肿

B：脑水肿

C：急性肾衰竭

D：尿崩症

答案：A

54.以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

A：维生素

B：脂肪乳

C：葡萄糖

D：果糖

答案：A

55.可以防治夜盲症的是

A：维生素B

B：维生素D

C：维生素C

D：维生素A

答案：D

56.喷托维林为中枢性镇咳药。

A：喷托维林

B：噻托溴铵

C：氨溴索

D：沙丁胺醇

答案：A

57.（2016年真题）那于GLP-1受体激动剂的是

A：二甲双胍

B：艾塞那肽

C：阿卡波糖

D：那格列奈

答案：B

58.（2018年真题）关于莫西沙星作用特点的说法,错误的是（）

A: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

B: 莫西沙星抗菌谱广,对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

C: 莫西沙星组织分布广泛,但不能透过血脑屏障

D: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物

答案：C

59.不易透过血一脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性M受体阻断药是

A: 奥昔布宁

B: 索利那新

C: 托特罗定

D: 黄酮哌酯

答案：C

60.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A: 鼻衄

B: 血压下降

C: 心率加快

D: 流量

答案：C

61.成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日25～50μg，每2周增加

A: 5μg/kg

B: 25μg

C: 6μg/kg

D: 4μg/kg

答案：B

62.轻症糖尿病患者宜选用

A: 二甲双胍

B: 正规胰岛素

C: 珠蛋白锌胰岛素

D: 格列喹酮

答案：A

63.头孢哌酮的主要清除途径是

A: 主要经呼吸道排泄

B: 主要经肾脏排泄

C: 经肝、肾双途径清除

D: 主要经肝脏清除

答案：C

64.艾司奥美拉唑的活性形式是

A: 巴柳氮

B: 美沙拉嗪

C: 亚磺酰胺

D: 奥沙拉嗪

答案：C

65.与其他袢利尿药相比，不良反应更大，因此临床使用受到限制，主要用作对磺酰胺类药物过敏或不耐受患者替代药物的是

A：呋塞米
B：布美他尼
C：依他尼酸
D：托拉塞米
答案：C

66.不耐酸，口服剂型多制成酯化物，为肝药酶抑制剂的药物是
A：克拉霉素
B：氨曲南
C：红霉素
D：克林霉素
答案：C

67.仅在体内有抗凝血作用的药物是
A：肝素
B：华法林
C：尿激酶
D：噻氯匹定
答案：B

68.克拉霉素与环孢素合用()
A：不良反应叠加
B：后者血药浓度下降，药效降低
C：后者血药浓度升高，不良反应增加
D：药理作用拮抗
答案：C

69.代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性()

A: 巯嘌呤
B: 纳武利尤单抗
C: 氟尿嘧啶
D: 环磷酰胺
答案：D

70.下列不属于中效能利尿药的是
A: 氢氟噻嗪
B: 氢氯噻嗪
C: 吲哒帕胺
D: 氨苯蝶啶
答案：D

71.通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是
A: 乙胺嘧啶
B: 奎宁
C: 吡喹酮
D: 青蒿素
答案：D

72.患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6～8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8～10/HP，红细胞3～5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。
A: 肾功能
B: 电解质

C：肝功能

D：尿量

答案：B

73.（2019年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A：轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

B：从ACEI转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用ACEI36小时后方可转换

C：轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D：沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

答案：D

74.对羟甲基戊二酰辅酶A(HMC-CoA)还原酶抑制作用最强的是

A：普伐他汀

B：洛伐他汀

C：辛伐他汀

D：阿托伐他汀

答案：D

75.抑制胃酸分泌作用最强的是()

A：奥美拉唑

B：雷尼替丁

C：法莫替丁

D：西咪替丁

答案：A

76.肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

A: 青霉素

B: 异烟肼

C: 红霉素

D: 氟胞嘧啶

答案：B

77.冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

A: 25～50mg

B: 75～150mg

C: 10～25mg

D: 150～300mg

答案：A

78.服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 磺胺甲恶唑

B: 头孢呋辛

C: 左氧氟沙星

D: 克林霉素

答案：A

79.铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

A: 全血计数

B: 肾功能

C: 肝功能

D: 血钙

答案：A

80.索他洛尔最严重的不良反应是

A：呼吸困难

B：心动过缓

C：尖端扭转型室速

D：头晕

答案：C

81.可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后2小时内避免食用的是

A：高钙食品

B：萘普生

C：沙利度胺

D：抗血管生成药

答案：A

82.林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

A：肺炎支原体

B：厌氧菌

C：革兰阳性球菌

D：肺炎链球菌

答案：A

83.对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A：咯萘啶或甲氟喹

B：乙胺嘧啶+磺胺药

C：静脉滴注奎宁

D：氯喹+伯氨喹

答案：A

84.下列不属于糖皮质激素的药理作用的是

A：抗菌作用

B：抗炎作用

C：抗毒作用

D：免疫抑制

答案：A

85.地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

A：双歧杆菌

B：拟杆菌

C：葡萄球菌

D：乳酸杆菌

答案：C

86.患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A：肝功能不全者

B：老年人

C：推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在15~20μg/ml并且长疗程的患者

D：肾功能不全者

答案：A

87.紧急降低眼压首选的药物是

A：碳酸酐酶抑制剂

B：20%甘露醇

C: β-受体阻断剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/608116140045007022