

陕西省澄城县内部使用《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库含答案【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- B: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次
- C: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- D: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

答案：A

2. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐，宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：A

3. (2020 年真题) 对环氧化酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 塞来昔布

答案：D

4. 可使维生素 B

A: 雌激素

B: 丙磺舒

C: 异烟肼

D: 糖皮质激素

答案：A

5. 属于 Ia 类抗心律失常药的是

A: 利多卡因

B: 奎尼丁

C: 普罗帕酮

D: 胺碘酮

答案：B

6. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

A: 托拉塞米

B: 呋塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案：C

7. 顺铂

A: 干扰核酸生物合成

B: 干扰 RNA 转录

C: 影响蛋白质合成和功能

D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：D

8. 属于长效 β

A: 沙丁胺醇

B: 多索茶碱

C: 布地奈德

D: 沙美特罗

答案：D

9. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂，受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

A: 劳拉西泮

B: 甲氧氯普胺

C: 帕洛诺司琼

D: 氯丙嗪

答案：B

10. 退乳药溴隐亭的临床应用注意不包括

A: 口服后个体差异较大

B: 消化道溃疡患者慎用

C: 治疗期间禁止妊娠

D: 用于治疗闭经或乳溢，可产生短期疗效，但不宜久用

答案：C

11. 氨苄西林

A: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

B: 对支原体有效

C: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

D: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

答案：D

12. 通过增强 AT-III 的活性发挥抗凝作用的是

A: 香豆素类

B: 肝素

C: 维生素 B₁₂

D: 维生素 K₁

答案：B

13. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

A: 氨基己酸

B: 卡巴克络

C: 蛇毒血凝酶

D: 甲萘氢醌

答案：B

14. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

A: 格列齐特

B: 放射性碘

C: 丙硫氧嘧啶

D: 大剂量碘剂

答案：C

15. 有耳毒性的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案: C

16. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

A: 氨曲南

B: 拉氧头孢

C: 头孢氨苄

D: 头孢孟多

答案: B

17. 属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

A: 哌替啶

B: 布洛芬

C: 秋水仙碱

D: 吗啡

答案: A

18. 下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

A: 毛花苷丙

B: 毒毛花苷 K

C: 地高辛

D: 洋地黄毒苷

答案: D

19. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

A: 甲氧氯普胺

B: 氯丙嗪

C: 劳拉西泮

D: 帕洛诺司琼

答案: D

20. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 妊娠及哺乳期妇女

B: 骨髓功能抑制

C: 严重心脏病

D: 腰椎间盘突出

答案: D

21. 可减少神经元囊泡释放乙酰胆碱，使平滑肌或横纹肌暂时麻痹，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 西地那非

B: 睾酮

C: A 型肉毒毒素

D: 奥昔布宁

答案: C

22. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案: B

23. 易使牙齿变黑的是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 琥珀酸亚铁胶囊
- C: 硫酸亚铁缓释片
- D: 硫酸亚铁糖浆

答案：D

24. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

- A: 15 倍
- B: 40 倍
- C: 100 倍
- D: 25 倍

答案：B

25. （2016 年真题）具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 过氧苯甲酰
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 异维 A 酸

答案：A

26. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 膦甲酸钠
- C: 制霉菌素

D: 两性霉素 B

答案: D

27. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案: B

28. 下述不属于抗血小板类药物的是

A: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 非特异性纤溶酶原激活剂

D: 二磷酸腺苷 P₂Y₁₂ 受体激动剂

答案: C

29. 患者, 男性, 26 岁, 因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院, 查体: T38. 9℃, P90 次/分, R21 次/分, BP110 / 70mmHg, 血常规: 白细胞 16. 9×10⁹ / L, 中性粒细胞百分比 84. 6%; 胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”, 入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A: 化痰

B: 扩张支气管

C: 止咳

D: 抗菌

答案：A

30. 下列可用于治疗哮喘的是

- A: 氯雷他定
- B: 孟鲁司特
- C: 氯苯那敏
- D: 氮革斯汀

答案：B

31. 属于长效避孕药的是

- A: 氯地孕酮
- B: 左炔诺孕酮
- C: 米非司酮
- D: 壬苯醇醚

答案：A

32. 维生素 C 的主要适应证是

- A: 治疗佝偻病
- B: 治疗厌食症
- C: 治疗脂溢性皮炎
- D: 防治坏血病

答案：D

33. (2018 年真题) 普通感冒患者, 有打喷嚏、流鼻涕的症状, 宜选用的药物是 ()

- A: 氯苯那敏片
- B: 右美沙芬片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂

D: 茶碱缓释片

答案: A

34. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

A: 呋塞米

B: 硫酸镁

C: 克拉霉素

D: 胺碘酮

答案: D

35. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的药物是

A: 他克莫司

B: 青霉素

C: 环孢素

D: 华法林

答案: B

36. 干扰转录过程和阻止 RNA 合成的药物是()

A: 高三尖杉酯碱

B: 顺铂

C: 氟尿嘧啶

D: 多柔比星

答案: D

37. 氨苄西林()

A: 对 G

B: 对 G

C: 特别对铜绿假单胞菌有效

D: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

答案：B

38. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

A: 多柔比星

B: 紫杉醇

C: 长春碱类

D: 伊立替康

答案：D

39. 作用优于磺酰脲类，适用餐后血糖升高的治疗药是

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 格列本脲

D: 阿卡波糖

答案：D

40. 可引起锥体外系反应的药物是

A: 雷尼替丁

B: 甘草酸二铵

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 甲氧氯普胺

答案：D

41. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

A: G

B: S 期

C: M 期

D: G

答案: C

42. 属于第四代头孢菌素的药物是

A: 头孢吡肟

B: 头孢氨苄

C: 头孢哌酮

D: 头孢拉定

答案: A

43. 高血压合并痛风者不宜使用

A: 氢氯噻嗪

B: 硝苯地平

C: 依那普利

D: 阿替洛尔

答案: A

44. 口角炎患者用选用的维生素是

A: 维生素 A

B: 维生素 B

C: 维生素 B

D: 维生素 D

答案: C

45. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。缓释片一次 40mg，一日 2 次的药物是

A: 可待因

B: 苯丙哌林

C: 右美沙芬

D: 喷托维林

答案: B

46. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是()

A: 奎尼丁

B: 维拉帕米

C: 普鲁卡因胺

D: 苯妥英钠

答案: B

47. 阿司匹林预防血栓形成的机制是

A: 抑制 PABA 的合成

B: 促进 PG 的合成

C: 抑制 TXA₂ 的合成

D: 抑制 GABA 的合成

答案: C

48. 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

A: 葡萄糖

B: 三磷酸腺苷

C: 二磷酸果糖

D: 碳酸钙

答案: A

49. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

A: 抗生素溶液滴耳

B: 2%酚甘油滴耳

C: 抗生素加激素全身应用

D: 及早足量抗生素应用

答案: D

50. 长期大量服用维生素 K

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

C: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案: C

51. 戈那瑞林的禁忌不包括

A: 妊娠期妇女

B: 垂体腺瘤患者

C: 垂体相关性闭经者

D: 肝肾病患者

答案: D

52. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 双氯芬酸

D: 阿司匹林

答案: D

53. 华法林的抗凝血机制是

A: 促进纤维蛋白溶解

- B: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- C: 抑制血小板聚集
- D: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子

答案：D

54. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 午餐时
- B: 早餐前 1 小时
- C: 早餐时
- D: 午餐前 1 小时

答案：C

55. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 壬二酸
- D: 异维 A 酸

答案：B

56. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

- A: 麻黄碱滴鼻液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 赛洛唑啉滴鼻液
- D: 酚甘油滴耳液

答案：A

57. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 维拉帕米
- B: 阿托品
- C: 普萘洛尔
- D: 苯妥英钠

答案：B

58. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

- A: 磺胺甲噁唑（SMZ）
- B: 莫西沙星
- C: 甲氧苄啶（TMP）
- D: 替硝唑

答案：D

59. 用于肿瘤化疗引起的中性粒细胞减少症的药物是（）

- A: 非格司亭
- B: 沙格司亭
- C: 糖皮质激素
- D: 利可君

答案：A

60. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

- A: 哌唑嗪
- B: 地高辛

C: 氨氯地平

D: 卡托普利

答案: B

61. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

A: 雌激素

B: 短效口服避孕药

C: 孕激素

D: 长效避孕药

答案: B

62. 地西泮用于

A: 慢性脑功能不全

B: 早期帕金森病

C: 特发性震颤

D: 神经源性尿崩症

答案: C

63. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

A: 奥司他韦

B: 齐多夫定

C: 喷昔洛韦

D: 阿德福韦酯

答案: D

64. 属于头孢一代的是

A: 头孢曲松

B: 拉氧头孢

C: 头孢呋辛

D: 头孢唑林

答案：D

65. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：D

66. 主要用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的, 或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后 (包括自然绝经和人工绝经) 雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌, 该药物是

A: 依西美坦

B: 来曲唑

C: 他莫昔芬

D: 氟维司群

答案：D

67. 防止急性血栓的首选药物是

A: 香豆素类

B: 肝素

C: 维生素 B

D: 维生素 K

答案：B

68. 以下激素的关系错误的是

- A: 促皮质素促进糖皮质激素的分泌
- B: 糖皮质激素促进促皮质素释放激素的分泌
- C: 糖皮质激素抑制促皮质素的分泌
- D: 促皮质素释放激素促进促皮质素的分泌

答案：B

69. 神经毒性较严重的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 奥沙利铂
- C: 卡铂
- D: 顺铂

答案：B

70. 奥美拉唑主要用于治疗

- A: 胃溃疡
- B: 恶心、呕吐
- C: 消化不良
- D: 慢性便秘

答案：A

71. 对淋病、梅毒可作为首选的是

- A: 土霉素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素

D: 红霉素

答案：C

72. (2016 年真题) 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

A: 接触塑料制品

B: 饮用热饮

C: 冷水浴

D: 日光浴

答案：C

73. 急腹症、肠道失血、孕妇及经期妇女禁用()

A: 乳果糖

B: 硫酸镁

C: 聚乙二醇 4000

D: 甘油

答案：B

74. 不能减小前列腺的体积,也不能降低 PSA 水平但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是()

A: 他达拉非

B: 非那雄胺

C: 西地那非

D: 坦索罗辛

答案：D

75. 口沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- B: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- C: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

答案：B

76. 常用治疗胃肠道癌，是结直肠癌的首选药之一的药物是()

- A: 塞替派
- B: 环磷酰胺
- C: 丝裂霉素
- D: 奥沙利铂

答案：D

77. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

- A: 2
- B: 8
- C: 6
- D: 4

答案：C

78. 特比萘芬属于

- A: 吗啉类
- B: 唑类
- C: 抗生素类
- D: 丙烯胺类

答案：D

79. 利多卡因的电生理作用错误的是()

- A: 显著减慢传导
- B: 降低自律性
- C: 缩短 APD
- D: ERP 相对延长

答案：A

80. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 对非典型病原体无效
- B: 对厌氧菌有效
- C: 对链球菌感染疗效较好
- D: 属于氟喹诺酮类

答案：A

81. 阿奇霉素

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 肾毒性较大

答案：C

82. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 胰岛素
- C: 依替膦酸二钠
- D: 甲状腺素

答案：B

83.（2018 年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

- A: 布美他尼
- B: 依他尼酸
- C: 依托塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：B

84. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 苯妥英钠
- B: 利血平
- C: 哌替啶
- D: 阿托品

答案：A

85. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的药物是

- A: 氯沙坦
- B: 多巴酚丁胺
- C: 维拉帕米
- D: 卡维地洛

答案：D

86.（2019 年真题）注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是（）

- A: 氯化钠注射液稀释
- B: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/608125043056007024>