消化疾病专科护士（内外）课程考题

1.轻度胃黏膜萎缩的胃镜下表现 （）

A.粘膜下有细小的血管体现

B.有褪色的萎缩粘膜点状斑状存在(正确答案)

C.粘膜下网格状血管透见

D.胃壁皱襞异常明显

2.下列哪一个不是结合性胆红素升高的原因（）

A.胆道梗阻

B.原发性胆汁性肝硬化

C.胆红素来源增多(正确答案)

D.药物/毒素

3.下列哪一个不属于食管的生理狭窄（）

A.食管与咽的连接处

B.左主支气管跨越食管左前方处

C.右主支气管跨越食管左前方处(正确答案)

D.食管穿过膈肌处

4.反流性食管炎,内镜下的分级，哪一个是不正确的（）

A.粘膜破损局限于粘膜皱襞上，A.且长度小于 0.5cm

B.粘膜破损局限于粘膜皱襞上，其中至少一个粘膜破损长度大于 1.0cm(正确答案)

C.粘膜破损相互融合，但少于食管周径的 75％

D.粘膜破损相互融合，至少侵犯食管周径的 75％以上,存在 Barrett 食管或食管狭窄.

5.真菌性食道炎不常见于下列哪些人群（）

A.免疫抑制患者

B.体质虚弱患者

C.长期使用抗生素患者

D.喜食高温、烫的食物的患者(正确答案)

6.消化性溃疡分期的 A2 期的特点（）

A.底厚苔，可污秽，可超出溃疡边缘，可有出血点或血痂附着。

B.溃疡周边炎症水肿明显减轻，白苔清洁，边界鲜明，边缘开始呈现红色的再生上皮。(正确答案)

C.溃疡缩小、变浅，白苔边缘光滑，周边水肿消失，边缘再生上皮明显。

D.粘膜缺损已完全由再生上皮覆盖，再生上皮发红呈栅状，向心性发射排列皱襞平滑向中心集中。

7.下列哪一项不属于恶性胃溃疡的表现（）

A.圆形或椭圆形(正确答案)

B.直径常大于 2cm

C.边缘不整齐，隆起

D.底部凹凸不平，表面污秽

8.下列关于克罗恩病的说法，哪一项是不对的（）

A.长好发于右侧结肠

B.结肠表面，常见白苔

C.周围黏膜是正常的

D.伴有炎症，无正常黏膜(正确答案)

9.常见的上消化道功能紊乱的表现（）

A.吞咽障碍

B.胃食管反流疾

C.奥迪氏括约肌运动障碍或括约肌无能力

D.慢性便秘(正确答案)

10.下列哪一项不是腹腔穿刺患者的常见禁忌症（）

A.肝性脑病前期（相对禁忌症）及肝性脑病

B.广泛腹膜粘连

C.患者有腹胀、腹痛、胸闷、呼吸不畅等表现(正确答案)

D.严重电解质紊乱

11.下列哪项不是重症胰腺炎的症状 （）

A、上腹或全腹压痛明显

B、腹肌紧张

C、反跳痛

D、肝浊音界消失

E、肠鸣音减弱或消失(正确答案)

12.对于重症胰腺炎最具诊断价值的是 （）

A、血脂肪酶增高

B、血淀粉酶增高

C、血胆红素增高

D、彩超检查胰腺增大

E、腹部 CT 检查(正确答案)

13.男性，饮酒后上腹痛半天，呕吐、腹胀，血淀粉酶 750U/L,血压 80/50mmHg（）

A、急性肾功能衰竭

B、急性胰腺炎(正确答案)

C、急性心肌梗死

D、急性胃炎

E、急性肝炎

14.诊断急性胰腺炎血清淀粉酶须超过 （）

A、200U/L

B、300U/L(正确答案)

C、400UL

D、500UIL

E、 1000UL

15.以下哪项提示重症胰腺炎预后不良（）

A、代谢性酸中毒

B、代谢性碱中毒

C、低钾血症

D、低镁血症

E、低钙血症(正确答案)

16.重症胰腺炎的腹痛特点哪项除外 （）

A、突发性

B、持续性

C、解痉药可缓解(正确答案)

D、弯腰屈膝可减轻

E、束带状

17.重症胰腺炎的护理?（）

A、严密观察患者体温、脉搏、呼吸、血压、神志的变化

B、遵医嘱予解痉镇痛、抑酸、抑酶治疗

C、呕吐或胃肠减压时应观察呕吐液或引流液的颜色、内容物及量

D、准确记录出入量，观察尿量变化，补足血容量，纠正水电解质平衡

E、注意观察患患者有无出血倾向如脉速、出冷汗、血压下降等休克表现及患者有无腹胀、腹痛、肠鸣音等

F、观察白细胞、血尿淀粉酶、血糖、血钙变化

G、以上都是(正确答案)

18.在中国，急性胰腺炎最常见的诱发因素是（）

A、暴饮暴食(正确答案)

B、酗酒

C、胆管结石病

D、胃肠炎

E、甲状旁腺功能亢进

19.下列因素中，最有可能诱发急性胰腺炎的是（）

A、高血脂(正确答案)

B、高血糖

C、高尿酸

D、高血钾

E、高血钠

20.急性胰腺炎所致腹痛的常见放射痛部位是（）

A、左上臂内侧

B、左腰背部(正确答案)

C、下腰骶部

D、左下颌部

E、左肩部

21.下面哪一项不属于胃癌的相关危险因素（）

A、幽门螺杆菌

B、吸烟

C、长期高盐饮食、烟熏煎炸食品等不良的饮食习惯

D、高龄(正确答案)

22.下面哪一项是不符合胃癌高风险人群的条件（）

A、长期居住于胃癌高发地区

B、既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉等病史

C、二级亲属有胃癌病史(正确答案)

D、HP 感染

23.下面哪一项不是早期胃癌的临床症状（）

A、上腹部隐痛

B、反酸、嗳气

C、进食后有饱胀感

D、浮肿(正确答案)

24.下面哪一项不属于胃癌的转移性体征（）

A、上腹部深压痛(正确答案)

B、腹水症

C、锁骨上淋巴结转移

D、脐部肿物

25.胃癌术后出血一般发生在（）以内

A、术后 24 小时(正确答案)

B、术后 24~48 小时

C、术后 3~5 天

D、术后 5~7 天

26.下面哪一项不是洗胃的目的（）

A、利于引流胃液(正确答案)

B、清除胃内未消化的食物

C、减轻胃黏膜充血、水肿

D、以防术后发生吻合口漏

27.以下不属于恶性肿瘤是（）

A．软组织肉瘤

B.白血病

C.淋巴瘤

D.畸胎瘤(正确答案)

E.胃印戒细胞癌

28. 以下不属于全身系统药物治疗的是（）

A.化学治疗

B. 靶向治疗

C. 免疫节点抑制剂治疗

D. 生物调节剂治疗(正确答案)

E.放射治疗

29.晚期食管癌常见的临床表现，不包括（）

A.进行性吞咽困难

B.胸骨后痛

C. 呕吐粘液

D. 食管气管瘘(正确答案)

E.粘液血便

30.晚期胃癌常见的临床表现，不包括（）

A. 黑便

B. 上腹部肿块

C. 幽门梗阻

D.左锁骨上淋巴结肿大

E.大便变细(正确答案)

31.晚期直肠癌常用的治疗手段，不包括（）

A.手术切除

B.化学治疗

C.靶向治疗

D. 免疫节点抑制剂治疗

E.内镜下切除(正确答案)

32.胃癌的高危致病因素不包括（）

A. HP 感染

B.吸烟

C. 腌制食品

D.残胃

E.肥胖(正确答案)

33.可以用于消化系统肿瘤辅助诊断的肿瘤标志物，不包括（）

A.CEA

B.CA199

C.AFP

D.鳞癌细胞抗原

E.HCG(正确答案)

34.推荐用于胃癌分期诊断的影像学检查，不包括（）

A.胃镜(正确答案)

B. 超声内镜

C.CT

D. MRI

E.PET-CT

35.AFP 升高可能提示的疾病，除外下列哪一种（）

A.原发性肝癌

B. 生殖系统肿瘤

C. 胃癌

D. 活动性肝炎(正确答案)

E.前列腺癌

36.进展期胃癌 Borrmann 分型，不包括（）

A.结节蕈伞型

B. 膨胀生长型(正确答案)

C. 浸润溃疡型

D. 弥漫浸润型

E.局部溃疡长型

37.患者，男，63 岁，因“排便习惯改变 2 月”入院，诊断:乙状结肠恶性肿瘤。患者神志清楚，可自主活动。膳食调查:近半月内，食欲可，以普通软食为主，全天能量摄入约 1800kcal。体格检查:身高 178cm，体重 70kg，近 3 个月内体重下降 5kg，腹软，排便可。该患者使用 NRS2002 评估的最终得分?（）

A.2

B.3

C.4(正确答案)

D.5

38.以下哪项是肠内营养使用的禁忌症（）

A.严重吸收不良综合征及长期少食衰弱的患者

B.小肠缺乏足够吸收面积的肠瘘患者

C.严重代谢紊乱的患者

D.麻痹性肠梗阻(正确答案)

39.肠内营养管堵塞的预防和处理中下列哪项措施是错误的（）

A.使用专用制剂预防堵管

B.药物推注前后进行冲管

C.直接插入导丝疏通导管(正确答案)

D.疏通管路失败时，应拔除导管

40.下列哪项不属于肠外营养禁忌症（）

A.血流动力学不稳定

B.呼吸不稳定

C.高流量的小肠漏(正确答案)

D.患者一般情况良好，预计需要肠外营养时间少于 5 日者

41.下列关于 CVC 导管脉冲式冲管正确的描述是:（）

A.生理盐水 10 ml，每次推注 1 ml，分 10 次，间隔 0.4 s(正确答案)

B.肝素盐水 10 ml，每次推注 1 ml，分 10 次，间隔 0.4 s

C.生理盐水 5 ml，每次推注 1 ml，分 10 次，间隔 0.4 s

D.肝素盐水 5 ml，每次推注 1 ml，分 10 次，间隔 0.4 s

42.在急性腹膜炎的情况下，下列哪一类原因最常引起早期发热()

A 、胃、十二指肠溃疡穿孔

B 、急性阑尾炎，胆囊炎穿孔(正确答案)

C 、实质脏器破裂

D 、结肠破裂早期

E 、代谢性酸中毒

43、急性化脓性腹膜炎的常见病因，下列哪项是错误的()

A 、溃疡病急性穿孔

B 、急性阑尾炎穿孔

C 、肠管损伤破裂

D 、直肠下段损伤(正确答案)

E 、腹内脏器炎症的扩散

44、急性腹膜炎腹痛的特点()

A 、疼痛阵发加剧

B 、病人转侧不安

C 、指不出确切部位

D 、原发病灶处最著(正确答案)

E 、解大便后减轻

45．发生嵌顿最重要的原因是 （）

A．疝内容物大，疝囊小

B．疝环小，腹压剧增(正确答案)

C．疝内容物与疝囊粘连

D．疝囊颈部水肿

46．切口疝发病因素中最重要的是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608136035142006026