

中医执业医师-中医执业医第二单元真题汇编 5

单选题 (共 150 题, 共 150 分)

(1.) 高热、头痛、呕吐, 全身皮肤散在瘀点, 颈项强直, 最可能的诊断是()。

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性脑脊(江南博哥)髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 伤寒
- E. 中毒性细菌性痢疾

**正确答案: B**

**参考解析:** 高热、头痛、呕吐, 全身皮肤散在瘀点, 颈项强直, 为流行性脑脊髓膜炎的典型临床表现。A 项, 结核性脑膜炎一般表现为低热, 而不是高热。C 项, 流行性乙型脑炎皮肤一般无瘀点。D 项, 伤寒常有中毒性脑病的表现, 但无脑膜刺激征(颈项强直), 皮疹的典型特征为玫瑰疹。E 项, 中毒性细菌性痢疾一般无脑膜刺激征。

(2.) 石膏的性味是()。

- A. 辛苦大寒
- B. 辛咸大寒
- C. 辛酸大寒
- D. 辛甘大寒
- E. 甘淡大寒

**正确答案: D**

**参考解析:** 石膏的性味: 辛、甘, 大寒。归肺、胃经。石膏生用可清热泻火, 除烦止渴; 煅用可收湿, 生肌, 敛疮, 止血。主治: ①外感热病, 高热烦渴; ②肺热喘咳; ③胃火亢盛, 头痛牙痛, 内热消渴; ④湿疹瘙痒, 水火烫伤, 疮疡溃后不敛及创伤久不收口, 外伤出血。

(3.) 具有行气导滞、攻积泄热功用的方剂是()。

- A. 舟车丸
- B. 保和丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 木香槟榔丸
- E. 枳实导滞丸

**正确答案: D**

**参考解析:** 木香槟榔丸功用: 行气导滞, 攻积泄热。主治: 痢疾, 食积。症见: 脘腹痞满胀痛, 或赤白痢疾, 里急后重, 或大便秘结, 舌苔黄腻, 脉沉实。

(4.) 《突发公共卫生事件应急条例》规定: 突发事件应急工作应当遵循的原则是()。

- A. 完善并建立监测与预警手段

- B. 预防为主、常备不懈
- C. 积极预防、认真报告
- D. 及时调查、认真处理
- E. 监测分析、综合评价

**正确答案： B**

**参考解析：**《突发公共卫生事件应急条例》第五条规定：突发事件应急工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

(5.)腹痛、腹泻黏液脓血便，伴发热恶寒，最可能的诊断是()。

- A. 细菌性痢疾
- B. 阿米巴痢疾
- C. 急性胃肠炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 霍乱

**正确答案： A**

**参考解析：**A项，“腹痛、腹泻、黏液脓血便，伴发热恶寒”是细菌性痢疾的典型症状。B项，阿米巴痢疾多不发热，特征性粪便为暗红色果酱样大便。C项，急性胃肠炎无发热症状，粪便多为黄色水样便，不伴脓血。D项，流行性脑脊髓膜炎无典型的胃肠道症状。E项，霍乱一般无发热，多数不伴腹痛，特征性粪便为米泔水样便。

(6.)流行性出血热患者全身各组织器官都可有充血、出血、变性、坏死，表现最为明显的器官是()。

- A. 心
- B. 肺
- C. 肾
- D. 脑垂体
- E. 胃肠

**正确答案： C**

**参考解析：**流行性出血热又称肾综合征出血热，具有发热、出血、肾脏损害三大主要特征。肾脏病理表现有：①肉眼可见肾脂肪囊水肿、出血；②镜检肾小球充血，基底膜增厚，肾小管受压变窄或闭塞，间质有炎症细胞浸润。

(7.)下列有关伤寒肥达反应的描述，正确的是()。

- A. 只要阳性就有明确诊断价值
- B. 阴性结果即可除外伤寒
- C. 可根据“O”抗体效价的不同区别伤寒或副伤寒
- D. “H”抗体出现较早，消失快，更有利于诊断
- E. 检测Vi抗体可用于慢性带菌者的调查

**正确答案： E**

**参考解析：**A项，“O”抗体效价在1：80以上，“H”抗体效价在1：160以上，才有诊断价值。B项，有少数伤寒患者肥达反应始终呈阴性，所以阴性结果并不能除外伤寒。C项，伤寒与副伤寒有部分共同的“O”抗原，体内可产生相同的“O”抗体，故不能通过“O”抗体效价区别伤寒或副伤寒。D项，“H”抗体出现迟，可持续阳性数年。E项，Vi抗原的抗原性弱，当体内伤寒杆菌存在时可产生一定量Vi抗体；细菌被清除后，抗体也随之消失。故测定Vi抗体有助于对伤寒带菌者的检出。

(8.)下列中毒性细菌性痢疾的治疗措施，错误的是()。

- A. 抗菌治疗
- B. 扩充血容量
- C. 纠正代谢性酸中毒
- D. 血管活性药物的应用
- E. 纠正代谢性碱中毒

**正确答案： E**

**参考解析：**中毒性菌痢表现为代谢性酸中毒而非代谢性碱中毒。

(9.)发生霍乱时，对疫区接触者的检疫期是()。

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 9天
- E. 12天

**正确答案： B**

**参考解析：**患者和带菌者是霍乱的主要传染源，患者在发病期间可连续排菌，时间一般为5日。发生霍乱时，对疫区接触者应严密检疫5日，留粪培养并服药预防。

(10.)尊重患者知情同意权，其正确的做法是()。

- A. 婴幼儿可以由监护人决定其诊疗方案
- B. 家属无承诺，即使患者本人知情同意也不得给予手术
- C. 对特殊急诊患者的抢救都同样对待
- D. 无须做到患者完全知情
- E. 只经患者同意即可手术

**正确答案： A**

**参考解析：**B项，具有完全民事行为能力的患者是知情同意权的主体，经主体同意即可手术。C项，对于需要抢救的特殊急诊患者以抢救生命优先。D项，知情同意的知情是指完全知情。E项，对于精神病患者、未成年人等无完全民事行为能力的患者，知情同意权的主体是其配偶、父母、成年子女和其他近亲属等，只经患者同意不能进行手术。

(11.)在使用辅助检查手段时，不适宜的是()。

- A. 认真严格地掌握适应证
- B. 可以广泛积极地依赖各种辅助检查
- C. 有利于提高医生诊治疾病的能力
- D. 必要检查能尽早确定诊断和进行治疗
- E. 应从患者的利益出发决定该做的项目

**正确答案：** B

**参考解析：** B 项，广泛积极地依赖各种辅助检查不符合医德的要求，而是医师应该避免的行为。

(12.) 膀胱炎最易发生于()。

- A. 女性婴幼儿
- B. 50 岁以上男性
- C. 育龄妇女
- D. 老年妇女
- E. 青年男性

**正确答案：** C

**参考解析：** 女性尿道短而宽，尿道口接近肛门，常被临近阴道和肛门的内容物所感染，尤其在性交后更易上行感染而诱发膀胱炎。常见致病菌多为肠道革兰阴性菌。

(13.) 下列各项中属乙类传染病的是()。

- A. 霍乱
- B. 鼠疫
- C. 传染性非典型肺炎
- D. 风疹
- E. 流行性感冒

**正确答案：** C

**参考解析：** 根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则，将法定传染病分为三类：甲类、乙类和丙类。AB 两项，甲类传染病包括鼠疫和霍乱。C 项，传染性非典型肺炎属于乙类传染病，但需按照甲类传染病的管理方式管理。DE 两项，风疹和流行性感冒属于丙类传染病。

(14.) 下列不支持艾滋病诊断的是()。

- A. 口咽念珠菌感染
- B. 持续发热
- C. 头痛，进行性痴呆
- D. 皮肤黏膜出血
- E. 慢性腹泻

**正确答案：** D

**参考解析：** 艾滋病对皮肤黏膜造成的损害，主要表现为 Kaposi 肉瘤和感染，并不出现出血症状。

(15.) 普通型流脑临床特征性体征是皮肤()。

- A. 瘀点或瘀斑
- B. 水疱
- C. 黑痂
- D. 斑丘疹
- E. 脓肿

**正确答案： A**

**参考解析：**普通型流脑败血症期重要的体征是皮疹，其特征性皮疹是瘀点、瘀斑，可见于约70%的患者。

(16.) 下列各项，不符合道德要求的是()。

- A. 尽量为患者选择安全有效的药物
- B. 要严格遵守各种抗生素的用药规则，尽可能开患者要求的好药、贵重药物
- C. 在医疗过程中要为患者保守秘密
- D. 对婴幼儿、老年患者的用药应该谨慎，防止肾功能损害
- E. 钻研药理知识，防止粗疏和盲目用药

**正确答案： B**

**参考解析：**A项，尽量为患者选择安全有效的药物，属于道德要求中的义务。B项，严格遵守各种抗生素的用药规则符合医师道德要求，但尽可能开患者要求的好药、贵重药物不符合道德要求。C项，在医疗过程中要为患者保守秘密，属于道德要求中的保密原则。DE两项，婴幼儿、老年患者的用药应该谨慎，防止肾功能损害及钻研药理知识，防止粗疏和盲目用药，属于道德要求中的审慎原则。

(17.) 我国依法制定卫生行政法规的国家机构是()。

- A. 国务院
- B. 卫生行政部门
- C. 最高人民法院
- D. 全国人大及其常委会
- E. 地方人民政府

**正确答案： A**

**参考解析：**卫生行政法规是由国务院制定发布的有关卫生方面的专门行政法规，其法律效力低于卫生法律。

(18.) 患者，男，26岁。心悸，气促1年。查体：两颊暗红，颈静脉明显怒张，下肢浮肿，心浊音界向左扩大，心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音，肝右肋下4cm，质软，有压痛，肝颈静脉回流征阳性。应首先考虑的是()。

- A. 二尖瓣狭窄并发右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全后期所致右心衰竭
- C. 主动脉瓣狭窄并发左心衰竭
- D. 主动脉瓣关闭不全并发左心衰竭

E. 肺源性心脏病致右心衰竭

**正确答案： A**

**参考解析：**根据两颊暗红、心尖区舒张期隆隆样杂音可诊断为二尖瓣狭窄。颈静脉明显怒张，下肢浮肿，肝右肋下4cm，质软，有压痛，肝颈静脉回流征阳性等为体循环淤血表现，提示出现右心衰竭。

(19.)患者，女，30岁。10年前患风湿热，检查：心尖部听到舒张期隆隆样杂音，X线显示左心房增大。应首先考虑的是()。

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

**正确答案： B**

**参考解析：**患者有风湿热病史，并出现心脏杂音，考虑风湿性心脏瓣膜病。心尖部舒张期隆隆样杂音为二尖瓣狭窄的特征性杂音，且二尖瓣狭窄可导致左房血液瘀滞，增大。故该患者首先考虑诊断为风湿性心脏病二尖瓣狭窄。A项，二尖瓣关闭不全为心尖部收缩期吹风样杂音。C项，主动脉瓣关闭不全为胸骨左缘第3~4肋间舒张期杂音。D项，主动脉瓣狭窄为胸骨右缘第2肋间收缩期杂音。E项，肺动脉瓣狭窄为胸骨左缘第2肋间收缩期杂音。

(20.)患儿近日常感无力，精神萎靡，食欲不佳，并诉右上腹隐痛。检查：面色黄，肝于肋缘下3cm可触及，有压痛。实验室检查：尿胆红素(+)，尿胆原(+)。应首先考虑的是()。

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 胆结石

**正确答案： D**

**参考解析：**患儿出现全身症状，黄疸，肝大且有压痛，实验室检查示肝细胞性黄疸，则首先考虑诊断为急性病毒性肝炎。A项，蚕豆病是由于遗传因素和食用蚕豆所引起的，而患者并无食用蚕豆史。B项，胃炎不会引起黄疸。CE两项，均可造成胆道梗阻，疼痛剧烈。

(21.)主动脉瓣关闭不全，多表现为()。

- A. 脉搏短绌
- B. 水冲脉
- C. 奇脉
- D. 颈静脉搏动
- E. 交替脉

**正确答案： B**

**参考解析：**水冲脉主要见于主动脉瓣关闭不全，也可见于甲状腺功能亢进症、严重贫血、动脉导管未闭等。

(22.) 缩窄性心包炎，多表现为()。

- A. 脉搏短绌
- B. 水冲脉
- C. 奇脉
- D. 颈静脉搏动
- E. 交替脉

**正确答案： C**

**参考解析：**奇脉见于大量心包积液、缩窄性心包炎等。A项，脉搏短绌见于心房颤动、频发室性期前收缩等。D项，颈静脉搏动见于右心衰竭。E项，交替脉见于左心衰竭。

(23.) 正常人尿中可以偶见的管型是()。

- A. 红细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 上皮细胞管型
- D. 透明管型
- E. 蜡样管型

**正确答案： D**

**参考解析：**透明管型较细，为无色透明内部不含颗粒的圆柱状体，常见于肾炎、肾淤血、发热性疾病等，正常人晨尿中可有透明管型出现。

(24.) 主要见于肾盂肾炎的管型是()。

- A. 红细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 上皮细胞管型
- D. 透明管型
- E. 蜡样管型

**正确答案： B**

**参考解析：**肾盂肾炎为感染性疾病，常有白细胞浸润，故白细胞管型是肾盂肾炎的常见管型。A项，红细胞管型常见于急性肾炎。C项，上皮细胞管型主要见于肾小管坏死、肾淀粉样变性、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾病综合征、肾移植后排斥反应、金属及其他化学物质的中毒。E项，蜡样管型常提示严重的肾小管坏死，预后不良。也见于肾小球肾炎晚期、肾功能衰竭、肾淀粉样变性。

(25.) 慢性支气管炎喘息型的临床表现是()。

- A. 长期、反复咳嗽、咳痰
- B. 反复咳嗽、咳痰、喘息，并伴有哮鸣音
- C. 咳嗽、咳痰，伴长期午后低热、消瘦、盗汗

- D. 发作性带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E. 夜间熟睡后突然憋醒，伴咳嗽、咳痰

**正确答案： B**

**参考解析：**慢性支气管炎表现为长期、反复咳嗽、咳痰；慢支喘息型表现为反复咳嗽、咳痰、喘息，并伴有哮鸣音。

(26.)慢性粒细胞白血病的特点是()。

- A. 全血细胞减少
- B. 嗜碱性粒细胞增多
- C. 骨髓中原始细胞明显增多
- D. 酸溶血试验阳性
- E. 网织红细胞增多

**正确答案： B**

**参考解析：**慢性粒细胞白血病白细胞计数增高，主要为中性中、晚幼粒细胞和杆状核粒细胞，骨髓中原始细胞（I型+II型） $\leq 5\% \sim 10\%$ ，嗜酸、嗜碱性粒细胞增多，可有少量有核细胞。

(27.)急性白血病的特点是()。

- A. 全血细胞减少
- B. 嗜碱性粒细胞增多
- C. 骨髓中原始细胞明显增多
- D. 酸溶血试验阳性
- E. 网织红细胞增多

**正确答案： C**

**参考解析：**原始细胞占全部骨髓有核细胞的30%以上为诊断急性白血病的必要条件。

(28.)有机磷农药中毒的瞳孔变化是()。

- A. 瞳孔扩大
- B. 瞳孔缩小
- C. 瞳孔呈白色
- D. 两瞳孔大小不等
- E. 瞳孔形状不规则

**正确答案： B**

**参考解析：**有机磷农药不可逆的抑制胆碱酯酶，使得乙酰胆碱在体内集聚，乙酰胆碱可以兴奋瞳孔括约肌的M受体，引起瞳孔括约肌收缩，瞳孔变小。

(29.)阿托品中毒的瞳孔变化是()。

- A. 瞳孔扩大
- B. 瞳孔缩小
- C. 瞳孔呈白色
- D. 两瞳孔大小不等

E. 瞳孔形状不规则

**正确答案： A**

**参考解析：**阿托品为 M 受体阻滞剂，可以阻断乙酰胆碱对瞳孔括约肌的兴奋作用，使瞳孔括约肌舒张，瞳孔变大。阿托品可用来治疗有机磷农药中毒所致的 M 样症状。

(30.) 医疗事故赔偿确定具体赔偿数额，应当考虑的因素是()。

- A. 医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系
- B. 患者的经济状况
- C. 患者亲友在纠纷处理过程中的态度
- D. 无过错输血感染造成的不良后果
- E. 医患双方协商解决

**正确答案： A**

**参考解析：**医疗事故赔偿时应当考虑的因素包括：①医疗事故等级；②医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度；③医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系；④患者所在地区的平均生活水平。

(31.) 对发生医疗事故的赔偿等民事责任争议问题处理时，可以考虑的方式是()。

- A. 医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系
- B. 患者的经济状况
- C. 患者亲友在纠纷处理过程中的态度
- D. 无过错输血感染造成的不良后果
- E. 医患双方协商解决

**正确答案： E**

**参考解析：**发生医疗事故的赔偿等民事责任争议时，医患双方可以协商解决；不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

(32.) 属于丙类传染病的病种是()。

- A. 艾滋病
- B. 肺结核
- C. 传染性非典型肺炎
- D. 人感染高致病性禽流感
- E. 流行性和地方性斑疹伤寒

**正确答案： E**

**参考解析：**《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的传染病分甲、乙、丙三类。丙类传染病包括流行性感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。ABCD 四项，均属于乙类传染病。

(33.)患者，男，45岁。咳嗽、咳痰5年，近3年每年持续咳嗽、咳痰3~4个月。肺部X线检查仅见肺纹理增粗。其诊断是()。

- A. 肺结核
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性支气管炎
- D. 肺脓肿
- E. 支气管扩张

**正确答案： C**

**参考解析：**中老年男性患者咳嗽、咳痰5年，胸部X线仅见肺纹理增粗，首选考虑诊断为慢性支气管炎。A项，肺结核患者多有低热等表现。B项，支气管哮喘患者主要表现为气急。D项，肺脓肿多急性起病，且有大量脓痰。E项，支气管扩张应有大量脓痰，X线表现为双轨影。

(34.)我国卫生法律是由哪一级机构制定和颁布的？()

- A. 卫生部
- B. 国务院
- C. 最高人民法院
- D. 全国人大及其常委会
- E. 地方人民政府

**正确答案： D**

**参考解析：**全国人大及其常委会是宪法和基本法律的制定和颁布机构。卫生法属于基本法律。

(35.)目前，我国卫生法规中所涉及的民事责任的主要承担方式是()。

- A. 恢复原状
- B. 赔偿损失
- C. 停止侵害
- D. 消除危险
- E. 支付违约金

**正确答案： B**

**参考解析：**民事责任的承担方式有停止侵害、排除障碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理、重做、更换、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。其中最主要的是赔偿损失。

(36.)国家实行医师资格考试制度，目的是检查评价申请医师资格者是否具备()。

- A. 医学专业学历
- B. 取得医学专业技术职务的条件
- C. 从事医学专业教学、科研的资格
- D. 开办医疗机构的条件
- E. 从事医学实践必需的基本专业知识与能力

**正确答案： E**

(37.)慢性支气管炎与肺结核的主要鉴别依据是()。

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 咯血
- D. 肺部啰音
- E. 痰液检查

**正确答案： E**

**参考解析：**慢性支气管炎患者临床表现为咳嗽、咳痰，为白色黏痰，偶有痰中带血，几乎不发生咯血。肺结核患者的肺部病变侵犯支气管静脉，常有咯血。

(38.)慢性支气管炎与肺癌的主要鉴别依据是()。

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 咯血
- D. 肺部啰音
- E. 痰液检查

**正确答案： E**

**参考解析：**慢性支气管炎、肺癌、肺结核均为呼吸系统常见疾病，临床上均可见咳嗽、咳痰、发热、咯血、肺部啰音等症状体征，肺结核痰培养中可见结核杆菌，慢性支气管炎合并感染时可见其致病菌，肺癌的痰检或可见癌细胞，故痰液检查可作为重要鉴别依据。

(39.)支气管哮喘的临床表现是()。

- A. 长期、反复咳嗽、咳痰
- B. 反复咳嗽、咳痰、喘息，并伴有哮鸣音
- C. 咳嗽、咳痰，伴长期午后低热、消瘦、盗汗
- D. 发作性带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E. 夜间熟睡后突然憋醒，伴咳嗽、咳痰

**正确答案： D**

**参考解析：**支气管哮喘的典型临床表现为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作性胸闷和咳嗽。

(40.)脂瘤独有的特征是()。

- A. 数目不等，大小不一，肿形如馒，推之可移
- B. 青筋垒垒，盘曲成团，质地柔软，表面青蓝
- C. 瘤中心有粗大毛囊孔，可挤出臭味脂浆
- D. 瘤体单发，质地硬韧，界限清楚，推之可移
- E. 瘤体深隐，质地坚硬，境界清楚，推之不移

**正确答案： C**

**参考解析：**

脂瘤又称粉瘤，是以皮肤间出现圆形质软的肿块，溃破后可见粉渣样物溢出为主要表现的肿瘤性疾病，相当于西医的皮脂腺囊肿。其肿块表面皮肤常可见粗大毛孔，略带黑色，可挤出有臭味的粉渣样分泌物。

(41.)患者，男，27岁。左眉上出现一坚硬肿块，约1cm×1cm，中有一粟粒样脓头，坚硬根深，如钉丁之状，疼痛剧烈，左上眼睑肿胀明显，不能睁眼，伴发热头痛。其诊断是()。

- A. 痈
- B. 发
- C. 疔
- D. 疔疮
- E. 有头疽

**正确答案： D**

**参考解析：**疔疮是一种发病迅速，易于变化而危险性较大的急性化脓性疾病，多发生于颜面和手足等处。其特征是疮形如粟，坚硬根深，状如钉丁。A项，痈的特点是局部光软无头，红肿疼痛，肿胀范围多在6~9cm，发病迅速，易脓，易溃，易敛，多伴有恶寒、发热、口渴等全身症状；B项，“痈之大者名发”，一般把来势迅猛而病变范围较痈大的急性化脓性疾病称为发；C项，疔的特点是突起根浅，肿势局限，焮红疼痛，范围多在3cm左右，易脓，易溃，易敛；E项，有头疽的特点是初起局部皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿疼痛，易向深部及周围发生扩散，脓头亦相继增多，溃烂之后状如蜂窝。

(42.)地机穴位于()。

- A. 胫骨内侧面后缘，内踝尖上5寸
- B. 胫骨内侧面下方凹陷处
- C. 胫骨内侧面中央，内踝尖上5寸
- D. 胫骨内侧面中央，内踝尖上7寸
- E. 内踝尖与阴陵泉穴的连线上，阴陵泉下3寸

**正确答案： E**

**参考解析：**地机穴为足太阴脾经的郄穴。定位在小腿内侧，阴陵泉直下3寸，当阴陵泉与三阴交的连线上，胫骨内侧面后际。

(43.)疟疾患者，热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘，溲赤，舌红苔黄，脉弦数。其治法是()。

- A. 和解表里，温阳达邪
- B. 祛邪截疟，和解表里
- C. 解毒除瘴，清热保津
- D. 益气养血，扶正祛邪
- E. 清热解表，和解祛邪

**正确答案： E**

**参考解析：**

四诊合参，辨病为温症。治当清热解表、和解祛邪。方用白虎加桂枝汤或白虎加人参汤加减。A项，和解表里、温阳达邪用于寒症；B项，祛邪截疟，和解表里用于正疟；C项，解毒除瘴，清热保津用于热瘴；D项，益气养血，扶正祛邪用于劳疟。

(44.)患者，女，50岁。精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常。舌质淡，脉弦。治疗应首选()。

- A. 丹栀逍遥丸
- B. 半夏厚朴汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 归脾汤
- E. 天王补心丹合六味地黄丸

**正确答案： C**

**参考解析：**根据患者症状及体征辨证为郁证之心神失养证。证机概要为营阴暗耗，心神失养。治宜甘润缓急，养心安神。代表方为甘麦大枣汤加减。

(45.)患者，女，38岁。月经来潮，量多、色淡，肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚。治疗应选用()。

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 当归补血汤
- D. 温经汤
- E. 黄土汤

**正确答案： C**

**参考解析：**根据患者症状及体征辨证为血虚阳浮发热证。C项，当归补血汤功用为补气生血，主治血虚发热证。症见肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力；或妇人经期、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后，久不愈合者。

(46.)患者，女，40岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，伴有月经不调，腰酸乏力，舌质淡红，苔白，脉细。治疗应首选()。

- A. 左归丸
- B. 开郁散
- C. 逍遥萸贝散
- D. 二仙汤合四物汤
- E. 六味地黄汤

**正确答案： D**

**参考解析：**根据患者症状可诊断为乳癖之冲任失调证，治宜调摄冲任，方选二仙汤合四物汤加减。

(47.)患者，女，45岁。月经不规律8个月，现阴道出血40天，量时多时少，近3天量极多，色淡、质稀，伴气短神疲，面浮肢肿，舌淡苔薄白，脉缓弱。治疗应首选()。

- A. 举元煎
- B. 补中益气汤

- C. 固本止崩汤
- D. 清热固经汤
- E. 保阴煎

**正确答案： C**

**参考解析：**根据患者月经周期紊乱，行经时间超过半月以上，量时多时少，近3天量极多即可诊断为崩漏；气短神疲，面浮肢肿，为脾虚不运，水液停聚所致；舌淡苔薄白，脉缓弱为脾虚表现。故诊断为崩漏之脾虚证。治宜补气摄血，固冲止崩。方用固本止崩汤或固冲汤。

(48.) 止带方主要治疗()。

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 脾虚
- D. 湿热
- E. 湿毒

**正确答案： D**

**参考解析：**止带方专用于治疗湿热下注所致带下病。治法：清利湿热止带，佐以解毒杀虫。药物组成：猪苓、茯苓、车前子、泽泻、茵陈、赤芍、丹皮、黄柏、栀子、牛膝。方中猪苓、茯苓、车前子、泽泻利水渗湿止带；赤芍、丹皮清热，凉血活血；黄柏、栀子、茵陈泻热解毒，燥湿止带；牛膝利水通淋，引诸药下行，使热清湿除则带自止。

(49.) 治疗气瘕应首选()。

- A. 海藻玉壶汤
- B. 四海舒郁丸
- C. 开郁散
- D. 逍遥散
- E. 桃红四物汤

**正确答案： B**

**参考解析：**气瘕是瘕病的一种，因其患处肿块柔软无痛，可随喜怒而消长，故称气瘕。临床多以肝郁气滞证多见。治疗一般采用内治法，以疏肝解郁、化痰软坚为主。方选四海舒郁丸加减，怀孕期或哺乳期，加菟丝子、首乌、补骨脂。

(50.) 患者，女，23岁，已婚。孕后心烦少寐，渴喜冷饮，腰酸腹痛，伴阴道少量出血，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选()。

- A. 清热固经汤
- B. 保阴煎
- C. 加味阿胶汤
- D. 加味圣愈汤
- E. 以上均非

**正确答案： B**

**参考解析：**根据患者症状及舌脉可诊断为胎动不安，血热证。治宜清热凉血，养血安胎。方用保阴煎。

(51.) 下列关于感染过程的描述，错误的是()。

- A. 病原体与人体相互作用，相互斗争的过程称为感染过程
- B. 感染过程的构成必须具备病原体、人体和外环境三个因素
- C. 病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性
- D. 病原体侵入的数量越大，出现显性感染的危险也越大
- E. 病原体侵入人体，只要发病就意味着感染过程的开始

**正确答案： E**

**参考解析：**感染过程可出现五种表现形式：①病原体被清除；②隐性感染；③显性感染；④病原携带状态；⑤潜伏性感染。隐性感染是指病原体侵入人体后，仅诱导机体产生特异性免疫应答，而不引起或只引起轻微的组织损伤，因而在临床上不显示任何症状、体征甚至生化改变，只有通过免疫学检查才能发现。E项，与隐性感染矛盾。

(52.) 治疗喘证痰热郁肺证，应首选()。

- A. 桑白皮汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 苏子降气汤
- D. 定喘汤
- E. 泻白散

**正确答案： A**

**参考解析：**A项，桑白皮汤清肺降气，化痰止咳，适用于喘证痰热郁肺证；B项，麻杏石甘汤解表清里，宣肺平喘，适用于喘证表寒肺热证；C项，苏子降气汤多用于上实下虚之喘证；D项，定喘汤清热宣肺，化痰定喘，用于热哮证；E项，泻白散清泻肺热，止咳平喘，用于肺热咳喘证。

(53.) 患者泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选()。

- A. 藿香正气散
- B. 不换金正气散
- C. 葛根芩连汤
- D. 白头翁汤
- E. 芍药汤

**正确答案： C**

**参考解析：**根据患者症状可诊断为泄泻，湿热壅滞证。治宜清热利湿。方予葛根芩连汤加减。

(54.) 治疗胃痛脾胃虚寒证，应首选()。

- A. 小建中汤

- B. 理中丸
- C. 附子理中丸
- D. 良附丸
- E. 黄芪建中汤

**正确答案： E**

**参考解析：**胃痛脾胃虚寒证的病机为中焦虚寒，胃失温养。治宜温中健脾，和胃止痛。方用黄芪建中汤加减。

(55.) 下列各项，不属于流行性出血热发热期治疗原则的是()。

- A. 控制感染
- B. 减轻外渗
- C. 透析疗法
- D. 改善中毒症状
- E. 预防 DIC

**正确答案： C**

**参考解析：**早发现，早休息，早治疗和少搬动是流行性出血热治疗的关键。治疗以综合疗法为主，各期治疗原则为：①早期：可应用抗病毒治疗，治疗中要注意防治休克、出血、肾衰竭和继发感染；②发热期：控制感染，减轻外渗，改善中毒症状和预防 DIC；③低血压休克期：积极补充血容量，注意纠正酸中毒和改善微循环功能；④少尿期：“稳、促、导、透”，即稳定机体内环境，促进利尿，导泻和透析治疗；⑤多尿期：移行期和多尿期的治疗同少尿期，多尿后期主要是维持水和电解质平衡，防治继发感染。

(56.) 丁型肝炎的潜伏期是()。

- A. 2~6 周
- B. 4~24 周
- C. 4~20 周
- D. 2~9 周
- E. 2~26 周

**正确答案： C**

**参考解析：**各型肝炎的潜伏期长短不一：①甲型肝炎为 15~45 天，平均为 30 天左右；②乙型肝炎为 6 周~6 个月，平均为 3 个月左右；③丙型肝炎为 2~26 周；④丁型肝炎为 4~20 周，常见于 HBV 与 HDV 同时感染者；⑤戊型肝炎为 2~9 周。

(57.) 治疗咳嗽迁延不愈或愈而复发，应首选()。

- A. 止嗽散
- B. 三拗汤
- C. 桑杏汤
- D. 泻白散
- E. 华盖散

**正确答案： A**

**参考解析：**止嗽散功用为疏风宣肺，止咳化痰，主治风邪犯肺之咳嗽迁延不愈或愈而复发者。

(58.)五行中具有“曲直”特性的是()。

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

**正确答案： A**

**参考解析：**五行的特性为：木曰曲直，火曰炎上，土爰稼穡，金曰从革，水曰润下。

(59.)患者，女，40岁。呕吐痰涎，伴头晕，胸痞，心悸，舌苔白，脉滑。治疗除取主穴外，还应加()。

- A. 列缺、尺泽
- B. 膻中、丰隆
- C. 曲池、外关
- D. 风池、尺泽
- E. 列缺、合谷

**正确答案： B**

**参考解析：**根据患者症状及舌脉，可辨证为呕吐之痰饮内停证，治疗当以中脘、胃俞、内关、足三里为主穴，配伍止吐之要穴膻中、化痰之要穴丰隆。

(60.)下列哪项是感染HBV后最早出现的血清学标志?()

- A. 抗-HBc
- B. HBcAg
- C. 抗-HBs
- D. HBeAg
- E. HBsAg

**正确答案： E**

**参考解析：**乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)是感染HBV后最早出现的血清学标志，感染后4~7周血清中开始出现，而后出现ALT升高及相应的症状、体征等。

(61.)不属医院感染的是()。

- A. 本次感染直接与上次住院有关
- B. 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现
- C. 新生儿在分娩过程中获得的感染
- D. 医务人员在医院工作期间获得的感染
- E. 由于诊疗措施激活的潜在性感染

**正确答案： B**

**参考解析：**由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现不属于感染，更不属于医院感染。

(62.)影响医患关系的主要因素不包括()。

- A. 医生方面
- B. 病人方面
- C. 管理方面
- D. 道德方面
- E. 社会方面

**正确答案： D**

**参考解析：**影响医患关系的因素主要包括医务人员、患者及其家属、医疗体制以及法律等方面。A项，医生方面包括：医生的医疗观、道德修养、服务态度和责任感等。B项，病人方面主要表现为不遵守就医道德、对医务人员不信任等。CE两项，管理、社会方面包括：医院管理制度上的缺陷、国家对卫生事业的资金投入不足、社会上的不正之风仍然严重存在、卫生法规不够健全等。

(63.)不属于临床诊疗道德原则的是()。

- A. 生命价值原则
- B. 最优化原则
- C. 身心统一原则
- D. 保密原则
- E. 知情同意原则

**正确答案： C**

**参考解析：**临床诊疗的道德原则包括：①最优化原则；②知情同意原则；③保密原则；④生命价值原则。

(64.)医学道德评价的方式为()。

- A. 社会舆论、媒体介入、传统习俗
- B. 自我认识、媒体介入、传统习俗
- C. 社会舆论、内心信念、传统习俗
- D. 社会舆论、内心信念、媒体介入
- E. 内心信念、传统习俗、自我认识

**正确答案： C**

**参考解析：**医学道德评价的方式包括：①内心信念是医德品质构成的基本要素，也是医德评价的重要方式。②社会舆论是医德评价中最普遍、最具有影响力的方式，在医德评价中起着重要作用。③传统习俗是指人们在长期的社会生活中逐步积累和形成的一种普遍的、稳定的、世代相传的行为方式、行为规范和道德风尚，是医德评价的重要方式。

(65.)关于人类胚胎干细胞研究的伦理原则不正确的是()。

- A. 安全和有效原则

- B. 防止商品化原则
- C. 知情同意原则
- D. 尊重原则
- E. 效用原则

**正确答案： E**

**参考解析：**人类胚胎干细胞研究和应用的伦理原则包括：①尊重原则；②知情同意原则；③安全和有效原则；④防止商品化原则。

(66.) 某药店经营者为贪图利益而违法销售超过有效期的药品。依据《中华人民共和国药品管理法》第 75 条的规定，其所在地的药品监督管理行政执法机构应给予的处罚是，没收违法销售药品和违法所得并()。

- A. 处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款
- B. 处以违法所得二倍以上五倍以下的罚款
- C. 处以二千元以上五千元以下的罚款
- D. 处以违法销售药品货值金额两倍以上五倍以下的罚款
- E. 处以违法销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款

**正确答案： A**

(67.) 疫情责任报告人发现乙类传染病患者、病原携带者或疑似传染病患者时，向发病地卫生防疫机构报告传染病。报告的时限为()。

- A. 城镇于 3 小时内，农村于 6 小时内
- B. 城镇于 6 小时内，农村于 10 小时内
- C. 城镇于 6 小时内，农村于 12 小时内
- D. 城镇于 6 小时内，农村于 24 小时内
- E. 城镇于 12 小时内，农村于 24 小时内

**正确答案： E**

**参考解析：**疫情责任报告人发现乙类传染病患者、病原携带者和疑似传染病患者时，城镇于 12 小时内，农村于 24 小时内，以最快的通讯方式向发病地的卫生防疫机构报告，并同时报出传染病报告卡。

(68.) 必须按照国务院卫生行政部门的有关规定，严格执行消毒隔离制度，防止发生医院内感染和医源性感染的机构是()。

- A. 疾病控制中心
- B. 卫生监督所
- C. 预防保健机构
- D. 医疗保健机构
- E. 卫生行政管理机构

**正确答案： D**

**参考解析：**《中华人民共和国传染病防治法实施办法》第十四条规定：医疗保健机构必须按照国务院卫生行政部门的有关规定，严格执行消毒隔离制度，防止医院内感染和医源性感染。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608140124100007047>