

2020年10月份实习生出科理论考试试题

实习同学

姓名: [填空题] *

学校年级 [填空题] *

1. 1 牵引患者的护理不正确的是() [单选题] *

- A 严格交接班、每班严密观察患肢血液循环及肢体活动情况
- B 定期为病人做清洁护理, 利于血液循环
- C 对不良的心态及时给予疏导
- D 牵引重量可随意调节(正确答案)

2. 2 石膏固定的患者都应观察那些内容() [单选题] *

- A 肢端血运
- B 肢体颜色
- C 肿胀程度
- D 以上都是(正确答案)

3. 3、观察肢端血液循环正确的是() [单选题] *

- A 如肢端皮肤颜色变深、温度下降, 动脉搏动减弱、肢体麻木说明血液循环障碍
- B 如肢端皮肤颜色变白、温度下降, 动脉搏动减弱、肢体疼痛说明血液循环障碍(正确答案)
- C 如肢端皮肤颜色变深、皮温增高, 动脉搏动减弱、肢体麻木说明血液循环障碍
- D 如肢端皮肤颜色变白、皮温增高, 动脉搏动减弱、肢体麻木说明血液循环障碍

4.4 骨科便秘患者饮食指导哪项正确() [单选题] *

- A 鼓励患者多饮水
- B 多吃粗纤维食物
- C 指导病人腹部按摩
- D 以上都是(正确答案)

5.5、下列哪项不是骨折早期并发症() [单选题] *

- A 休克
- B 脂肪栓塞综合征
- C 重要内脏损伤
- D 褥疮(正确答案)

6.6、下肢骨折长期卧床的病人，在足部放一护架作用() [单选题] *

- A 用于足部运动
- B 避免发生褥疮
- C 用于观察血运
- D 避免长期受压，形成足下垂(正确答案)

7.7、骨折病人发生关节僵硬的主要原因() [单选题] *

- A 关节面骨折
- B 合并神经损伤
- C 合并血管损伤
- D 缺乏功能锻炼(正确答案)

8.8、开放性骨折的重要并发症是() [单选题] *

- A 大量出血
- B 发生感染(正确答案)

C 致残

D 畸形愈合

9. 9、骨折专有体征不包括 () [单选题] *

A、畸形

B、反常活动

C、骨擦音和骨擦感

D、疼痛(正确答案)

10. 10、股骨头置换术后, 下肢最佳摆放体位为 () [单选题] *

A、外展外旋位

B、外展内旋位

C、外展中立位(正确答案)

D、内收中立位

E、内收外旋位

11. 11、如果骨折过度牵引, 有可能造成 () [单选题] *

A、拉开碎骨片

B、产生肌萎缩

C、引起脱钙(正确答案)

D、增加疼痛

E、有利于康复

12. 12、下列哪一项是骨折的早期并发症。 () [单选题] *

A、脂肪栓塞(正确答案)

B、坠积性肺炎

C、创伤性关节炎

D、关节僵直

E、压疮

13. 13、股骨颈骨折好发于（） [单选题] *

A、儿童

B、青年人

C、成年人

D、老年人(正确答案)

E、无年龄差别

14. 14、有一患者车祸致右下肢开放性骨折，大量出血，送来时在医生未到之前，当班护士应立即（） [单选题] *

A、询问发生车祸的原因

B、给患者注射镇静剂

C、劝患者耐心等待医生

D、给患者测血压，建立静脉通路(正确答案)

E、询问患者既往史和过敏史

15. 15、患者女，50岁。因外伤入院。病人不能控制排便，多次将大便排在床上，此时护理的重点是 [单选题] *

A.定时开窗通风，消除不良气味

B.保护肛周皮肤，防止压疮

C.尊重病人，消除心理压力(正确答案)

D.观察粪便性质、颜色与量

E.保证每天摄入足量的液体

16. 16、皮牵引的重量一般不超过（）KG [单选题] *

A : 3

B : 5(正确答案)

C : 6

D : 10

17. 17、骨筋膜室综合征的临床表现有 *

A:有疼痛转为无痛(正确答案)

B:苍白或紫绀；大理石花纹等(正确答案)

C:感觉异常(正确答案)

D:肌肉瘫痪(正确答案)

E:无脉(正确答案)

F：进行性低氧血症

18. 18、DVT 的物理预防措施有 *

A:足底静脉泵(正确答案)

B: 间隙充气加压装置(正确答案)

C:梯度弹力袜(正确答案)

D:鼓励患者早期功能锻炼

19. 19、髌关节置换术后功能锻炼正确的有 *

A:术后 1-3 天进行股四头肌训练(正确答案)

B:术后 4-7 天进行直腿抬高运动(正确答案)

C:术后 4-7 天抬臀运动(正确答案)

D:非骨水泥型患者术后第 8 天开始离床训练

20. 20、骨科手术前准备错误的是 [单选题] *

A:术前完成各项检查

B:教会患者床上大小便

C:术前一天备皮后手术部位 PVP 碘消毒后用棉垫包扎(正确答案)

D:术晨取下非固定义齿。

21. 如有休克的患者应 () [单选题] *

A 先处理骨折后处理休克

B 先处理休克后处理骨折(正确答案)

C 两者同时进行

22. 骨折的急救处理不包括： [单选题] *

A.抢救休克

B.包扎伤口

C.手术复位(正确答案)

D.迅速转运

23. 骨折早期并发症是：() [单选题] *

A、压疮

B、感染

C、缺血性骨坏死

D、神经损伤(正确答案)

24. 青壮年腰痛的常见原因 () [单选题] *

A、劳损，椎间盘突出(正确答案)

B、结核

C、肿瘤

D、畸形

25. 病人诉石膏型内肢体疼痛，错误的处理是 () [单选题] *

A、向疼痛处填塞棉花(正确答案)

B、抬高肢体

C、疼痛处石膏型开窗

D、调整肢体体位

26. 病室内温度一般控制在：（） [单选题] *

A.12 ~ 16℃

B.18 ~ 22℃(正确答案)

C.23 ~ 25℃

D.26℃ ~ 28℃

27. 病人自身无变换卧位的能力，卧于他人安置的卧位是：（） [单选题] *

A.被动卧位(正确答案)

B.被迫卧位

C.主动卧位

D.端坐位

28. 以下哪类病人需处于被迫卧位：（） [单选题] *

A.昏迷病人

B.瘫痪病人

C.支气管哮喘急性发作病人(正确答案)

D.极度衰弱病人

29. 不需要采取去枕仰卧位的病人是：（） [单选题] *

A.胸膜炎病人(正确答案)

B.全身麻醉未清醒的病人

C.昏迷病人

D.行椎管内麻醉术后病人

30. 应采取中凹卧位的病人是：（） [单选题] *

A.胸部手术后病人

B.胃切除术后病人

C.休克病人(正确答案)

D.十二指肠引流后病人

31. 使用约束具时，不恰当的护理措施是：（） [单选题] *

A.使用前向病人和家属解释使用目的

B.扎紧约束具，防止滑脱(正确答案)

C.安置病人的肢体处于功能位

D.记录约束具使用的原因

32. 导致压疮发生的最主要的原因是：（） [单选题] *

A.年老、体弱

B.局部组织长期受压(正确答案)

C.营养不良

D.石膏夹板使用不当

33. 孙先生，60岁.因骨折卧床已3周，体质虚弱，近日骶尾部皮肤出现水疱并有破溃，上面附有少量黄色渗出液，护士观察后认为是压疮.该病人的压疮属于哪一期：（） [单选题] *

A.淤血红润期

B.炎性浸润期

C.浅度溃疡期(正确答案)

D.坏死溃疡期

34. 以下哪一种饮食有利于压疮的预防：（） [单选题] *

A.高蛋白，高维生素(正确答案)

B.低盐，低蛋白

C.高脂肪，低维生素

D.高脂肪，低蛋白

35. 以下哪项不是影响疼痛的因素：（） [单选题] *

A.个人经历

B.肥胖(正确答案)

C.疲乏

D.社会文化背景

36. 使用药物止痛时，错误的护理措施为：（） [单选题] *

A.根据药物的半衰期“按时给药

B.药物剂量应个体化

C.提倡尽早静脉给药途径(正确答案)

D.控制止痛剂的用量，缩短给药间隔

37. 有关睡眠型呼吸暂停的叙述，错误的一项是：（） [单选题] *

A.中枢性呼吸暂停是由于药物中毒引起的(正确答案)

B.睡眠型呼吸暂停分为中枢性和阻塞性两种

C.睡眠型呼吸暂停是一种在睡眠中发生自我抑制、没有呼吸的现象

D.肥胖者可发生睡眠型呼吸暂停

38. 李先生，60岁，因“脑血栓形成”后3周，右侧上下肢能在床面上平移，但不能抬起，判断其肌力为：（） [单选题] *

A.0级

B.1 级

C.2 级(正确答案)

D.3 级

39. 评价机体活动能力时，以下哪项不是主要观察内容：（） [单选题] *

A.行走

B.书写(正确答案)

C.穿衣

D.洗漱口

40. 脉搏短绌多见于：（） [单选题] *

A.心房颤动病人(正确答案)

B.心室颤动病人

C.阵发性室性心动过速病人

D.房室传导阻滞病人

41. 低氧血症伴有二氧化碳潴留病人，应选择何种类型的氧疗方式：（） [单选题]

*

A.高压氧疗

B.高浓度氧疗

C.中等浓度氧疗

D.低浓度氧疗(正确答案)

42. 长期使用缓泻剂会导致：（） [单选题] *

A.腹泻

B.水、电解质紊乱

C.慢性便秘(正确答案)

D.腹痛

43. 少尿是指 24 小时尿量少于：（） [单选题] *

A.100ml

B.200ml

C.300ml

D.400ml(正确答案)

44. 张女士，40 岁，患者主诉下腹部胀痛，排尿困难，体检见耻骨上膨隆，可扪及囊样包块，叩诊呈实音，有压痛.对该患者实施的护理措施中不正确的一项是：

（） [单选题] *

A.让患者听流水声

B.口服利尿剂(正确答案)

C.用温水冲洗会阴部

D.行导尿术

45. 以下对留置导尿管病人实施的护理措施中正确的一项是：（） [单选题] *

A.每日更换导尿管

B.每周用消毒液清洗尿道口两次

C.鼓励患者喝水(正确答案)

D.倾倒尿液时导尿管须高于耻骨联合

46. 遇热后易破坏的药物是：（） [单选题] *

A.酵母片(正确答案)

B.黄连素

C.青霉素

D.盐酸肾上腺素

47. 抢救青霉素过敏性休克的首选药物是：（） [单选题] *

- A. 葡萄糖酸钙
- B. 氯化钙
- C. 盐酸肾上腺素(正确答案)
- D. 去甲肾上腺素

48. 静脉输液时造成病人急性肺水肿发生的原因是：（） [单选题] *

- A. 输入致热物质
- B. 输液速度过快(正确答案)
- C. 长时间输入高浓度药液
- D. 输液过程中无人守护

49. 造成输血前红细胞破坏引起溶血反应的原因不包括：（） [单选题] *

- A. 血液储存时间过久
- B. 血液被剧烈震荡
- C. 血液中加入高渗或低渗性溶液
- D. 输入异型血(正确答案)

50. 输血过程中最严重的反应是：（） [单选题] *

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应(正确答案)
- D. 肺水肿反应

51. 王某下楼时不慎致踝关节扭伤，2小时后来医院就诊，正确的处理方法（） [单选题] *

- A. 局部用热水袋

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616130131031010045>