

2024 年广西壮族自治区天等县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整版含答案 【名师推荐】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 原发性失眠首选

- A: 氯氮
- B: 阿戈美拉汀
- C: 米氮平
- D: 唑吡坦

答案：D

2. 特别适用于碘中毒的是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 1%硫酸镁溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 淀粉溶液

答案：D

3. （2017 年真题）半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择（ ）

- A: 2~3 个半衰期给药 1 次
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 静脉滴注给药
- D: 每日给药 1 次

答案：C

4. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2~3 次的药物是 ()。

- A: 甲硝唑口腔粘贴片
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 冰硼咽喉散
- D: 西地碘含片

答案：C

5. 血尿酸升高的相关疾病是

- A: 痛风
- B: 过敏性鼻炎
- C: 湿疹
- D: 流感

答案：A

6. 患者，男，62 岁，糖尿病病史 7 年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 卡托普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 洛伐他汀

答案：A

7. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 医疗机构从业人员
- B: 60 岁上的老人
- C: 慢性病患者及体弱多病者
- D: 3 岁以上儿童

答案：D

8. 药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

- A: 卡托普利
- B: 铋制剂
- C: 氟西汀
- D: 氯苯那敏

答案：C

9. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 11.2mmol / L，糖化血红蛋白 8.7%。

- A: 口服 Gt - 葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 饮食干预及运动治疗
- C: 口服磺酰脲类降糖药
- D: 口服二甲双胍

答案：D

10. 高血压病的治疗原则低危患者（）

- A: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- B: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- C: 立即使用抗高血压药物
- D: 立即进行抢救治疗

答案：B

11. 解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量导致中毒，应立刻给予（）

- A: 毛果芸香碱
- B: 东莨菪碱
- C: 麻黄碱
- D: 山莨菪碱

答案：A

12. 尿中白细胞增多见于

- A: 慢性肾盂肾炎
- B: 服用磺胺药
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 肝硬化

答案：A

13. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

- A: 一级证据
- B: 三级证据
- C: 四级证据
- D: 二级证据

答案：A

14. 患者，女，85岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近Et频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 电复律
- B: 胺碘酮

C: 阿托品

D: 苯海拉明

答案: B

15. 药师应对"患者投诉", 下列说法不正确的是

A: 接待者应举止大方, 行为端庄

B: 当事人需要亲自接待

C: 尽快将投诉人带离现场

D: 保存有形证据

答案: B

16. 可用于对乙酰氨基酚过量所致中毒的药物是

A: 乙酰胺

B: 乙酰半胱氨酸

C: 纳洛酮

D: 亚硝酸钠

答案: B

17. 患者男, 73 岁, 胃溃疡病史 2 年, 半年前出现静止性震颤搓丸样运动迟缓, 面具脸, 慌张步态该患者应使用的药物是 ()

A: 司来吉兰

B: 多奈哌齐

C: 多巴丝肼 (苄丝肼左旋多巴)

D: 甲基多巴

答案: C

18. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上, 致病菌多为

A: 白假丝酵母菌

- B: 淋病奈瑟菌
- C: 大肠埃希菌
- D: 金黄色葡萄球菌

答案：C

19. 口服氯化铵用于解救

- A: 硝西泮中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 氯丙嗪中毒
- D: 瘦肉精中毒

答案：B

20. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 阿米洛利
- C: 氯苯那敏
- D: 东莨菪碱

答案：A

21. (2018 年真题) 干眼症可选用 ()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

答案：C

22. 服用左旋多巴不宜同食

- A: 食醋

B: 高蛋白食物

C: 葡萄柚汁

D: 咖啡

答案：B

23. 与对氨基苯甲酸（PAPB）化学结构相似，可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

A: 青霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 链霉素

D: 四环素

答案：B

24. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物代谢速度的是

A: 茶叶中的鞣酸

B: 食盐中的氯化钠

C: 酒中的乙醇

D: 食醋中的醋酸

答案：C

25. 焦虑症最常见的表现形式为（）

A: 社交焦虑障碍

B: 惊恐发作

C: 广泛性焦虑

D: 急性焦虑

答案：C

26. 宜用常量短期治疗，以免产生依赖性，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A: 地芬诺酯
- B: 蒙脱石散
- C: 环孢素 A
- D: 匹维溴铵

答案：A

27. 应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

- A: 长效复方口服避孕药
- B: 口服低剂量孕激素避孕药
- C: 甲地孕酮硅胶环
- D: 探亲避孕药

答案：B

28. 服药期间饮茶可降低疗效的药品是

- A: 格列本脲
- B: 西咪替丁
- C: 硫酸亚铁
- D: 维生素

答案：C

29. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

- A: 卡马西平
- B: 阿托品
- C: 乙酰胺
- D: 毒扁豆碱

答案：C

30. 归属专业学术机构网站的是

A: www.merck.com

B: www.cmt.tom.cn

C: www.ashp.org

D: [www.google](http://www.google.com)

答案：C

31. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A: 链霉素

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案：D

32. 第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

A: 淡橙色

B: 淡红色

C: 淡黄色

D: 淡绿色

答案：B

33. 成本-效果分析

A: 成本和治疗结果均用货币表示

B: 药物利用指数(DUI)

C: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

D: 是成本-效果分析的一种特例

答案：C

34. 穿孔（消化性溃疡并发症）

A: 突发上腹剧痛，继而至全腹

B: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

C: 规律性上腹痛

D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：A

35. 重量比重量百分浓度系指 100g 溶液中所含溶质的克数，以符号

A: %(g/ml) 表示

B: %(ml/ml) 表示

C: %(ml/g) 表示

D: %(g/g) 表示

答案：D

36. 患者，女，45 岁，6 个月前出现口吐白沫、意识丧失、二便失禁。在神经专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好。近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱。该患者在全国各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药物的安全用药和用药注意事项进行讨论。

A: 遵循多药联合治疗原则

B: 有条件者应监测血药浓度

C: 定期监测肝功能

D: 长期规律用药

答案：A

37. (2017 年真题) 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是 ()

- A: 氯己定含漱液
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 替硝唑含漱液
- D: 西地碘含片

答案: B

38. 具有吸附力，对氰化物无效的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 1: 5000 高锰酸钾
- D: 淀粉溶液

答案: A

39. (新生儿期的药动学特点) 肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

- A: 药物代谢
- B: 药物中毒
- C: 药物排泄
- D: 药物吸收

答案: C

40. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查 (X 线、淋巴摄影) 后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 干扰核酸生物合成
- B: 破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰蛋白质合成

D: 嵌入 DNA 干扰核酸合成

答案：B

41. 艾滋病的传播途径不包括

A: 经血制品传播

B: 消化道传播

C: 性途径传播

D: 经血传播

答案：B

42. 患者女 29 岁孕 25+6 周近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是（）

A: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量

B: 口服，每次 5ml，一日 3 次

C: 快速静脉注射

D: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量

答案：A

43. 上消化道出血(>50ml)可呈现

A: 鲜血便

B: 白陶土便

C: 柏油黑便

D: 乳凝块便

答案：C

44. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 磺胺药
- B: 华法林
- C: 氯霉素
- D: 四环素

答案：B

45. 流行性出血性结膜炎可选用

- A: 0.1%羟苄唑滴眼剂
- B: 四环素眼膏
- C: 2%色甘酸钠滴眼剂
- D: 0.1%碘苷滴眼剂

答案：A

46. 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的

- A: 老年人的症状和体征往往表现不典型
- B: 老年人的各种器官功能减退，机体适应能力下降，故一旦发病，病情常迅速恶化
- C: 老年人由于组织器官老化和生理功能减退，容易罹患多种慢性疾病
- D: 老年人患多种疾病，若治疗上存在矛盾时，应忽略不良反应，保证药物治疗的全面性

答案：D

47. (2015 年真题) 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是 ()。

- A: 阿奇霉素

B: 磺胺甲噁唑

C: 红霉素

D: 头孢呋辛

答案: B

48. 一些权威性较高的二次文献中，记载应做皮肤敏感试验的药品中，维生素 B1 注射剂的皮试药液浓度是

A: 5mg/ml

B: 2mg / ml

C: 3mg / ml

D: 1mg / ml

答案: A

49. 某患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75kg，临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L，糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 胰岛素+二甲双胍

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案: C

50. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

B: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

D: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：A

51. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

A: 地西泮

B: 利血平

C: 别嘌醇

D: 苯妥英钠

答案：A

52. 需要用 10%酒精或植物油冲洗是清除（）

A: 眼内污染毒物

B: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

C: 皮肤污染酚类毒物

D: 毛发被毒物污染

答案：C

53. 需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

A: 维 A 酸

B: 口服短效避孕药

C: 米诺环素

D: 过氧化苯甲酰

答案：A

54. 属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是（）

A: 依非韦伦

B: 齐多夫定

C: 利巴韦林

D: 利托那韦

答案: B

55. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

A: RBC

B: INR

C: APTT

D: ALT

答案: C

56. 患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

答案: D

57. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了3倍；此例体现了药物警戒的作用包括

A: 药品上市后风险评估

B: 发现与规避假、劣药流入市场

C: 发现药品说明书问题

D: 药品上市前风险评估

答案：A

58. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。根据该患者临床表现，最可能的诊断为

A: 急性左心衰竭

B: 大叶性肺炎

C: 支气管肺炎

D: 急性心肌炎

答案：A

59. 对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳的药物是

A: 苯妥英钠

B: 阿托品

C: 普萘洛尔

D: 普鲁卡因胺

答案：A

60. 人的体重指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高的平方 (m²)，中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

A: ≥ 28

B: 18.5~23.9

C: < 18.5

D: ≥ 26

答案：A

61. 适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 单纯孕激素补充治疗

D: 雌孕激素序贯用药

答案：A

62. 在药物经济学研究方法中，可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

A: 成本-效用分析

B: 成本-效益分析

C: 最小成本分析

D: 最大效果分析

答案：C

63. 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸，减少尿酸的生成

A: 丙磺舒

B: 阿司匹林

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案：C

64. 促动力药

A: 法莫替丁

- B: 铝碳酸镁
- C: 多潘立酮
- D: 埃索美拉唑

答案：C

65. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 苜丝肝
- B: 克拉维酸钾
- C: 奥美拉唑
- D: 叶酸

答案：C

66. 下列为二级信息源的药学文献

- A: 药物信息手册
- B: 中国药学文摘
- C: 中国国家处方集
- D: 药学杂志

答案：B

67. 下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经-肌肉阻滞作用而显效的是

- A: 甲苯咪唑
- B: 噻苯达唑
- C: 阿苯达唑
- D: 噻嘧啶

答案：D

68. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

- A: 250 μ g/ml
- B: 100 μ g / ml
- C: 750 μ /ml
- D: 500 μ g/ml

答案：D

69. 肾上腺皮质激素可能引起

- A: 尿胆红素
- B: 尿葡萄糖
- C: 尿液隐血
- D: 尿蛋白

答案：B

70. 患者女,56 岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周,伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡,幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑)、枸橼酸铋钾
- B: 阿莫西林、克拉霉素
- C: 枸橼酸铋钾、左氧氟沙星
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑)、克拉霉素

答案：A

71. 适用于早期、轻度症状者的是

- A: 左旋多巴
- B: 恩托卡朋
- C: 苯海索

D: 司来吉兰

答案: D

72. 由服用利尿剂所引起的尿失禁属于 ()

A: 压力性尿失禁

B: 急迫性尿失禁

C: 真性尿失禁

D: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

答案: D

73. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 控制体重

B: 餐中多饮水

C: 戒烟酒

D: 避免高脂饮食

答案: B

74. 可单独用于轻度、早期高血压的是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 甘露醇

D: 阿米洛利

答案: B

75. 仅用于解热、镇痛的非处方药是

- A: 氢化可的松
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 布洛芬
- D: 西咪替丁

答案：B

76. 湿疹患者的实验室检查结果常会出现（）

- A: 淋巴细胞增多
- B: 中性粒细胞减少
- C: 淋巴细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

77. 归属公共网络资源的是

- A: www.ashp.org
- B: www.cmt.com.cn
- C: www.googl
- D: www.merck.com

答案：C

78. 影响肝药酶活性，药物疗效降低

- A: 呋塞米
- B: 氨茶碱
- C: 胰岛素
- D: 地西泮

答案：D

79. 维生素 D3 用于

- A: 习惯性流产的辅助治疗
- B: 防治夜盲症
- C: 防治坏血病
- D: 防治佝偻病

答案：D

80. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

- A: 凝血功能
- B: 血压
- C: 血脂
- D: 血糖

答案：A

81. 解救铅中毒的是（）

- A: 单价抗毒血清
- B: 二巯丙醇
- C: 依地酸钙钠
- D: 盐酸戊乙奎醚

答案：C

82. 氯喹与伯氨喹合用

- A: 根治间日疟
- B: 加重神经肌肉接头抑制作用
- C: 诱发癫痫
- D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：A

83. 患者计划口服避孕药避孕，可能增加避孕失败风险的药物是（）

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：A

84. 能客观地反映过去 3 个月内平均血糖水平的指标是 ()

- A: LDL-C
- B: HDL-C
- C: TG
- D: HbA1c

答案：D

85. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 溴己新

答案：B

86. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 每 3~5 天调整 1 次
- B: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须冷藏保存

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/616145211101011030>