

1.口腔门诊患者接诊流程正确的是：（ ）

- A.导诊咨询→各科分诊（挂号）→候诊或转诊→诊室接诊→预约复诊或随诊
- B.导诊咨询→各科分诊（挂号）→诊室接诊→候诊或转诊→预约复诊或随诊
- C.导诊咨询→诊室接诊→候诊或转诊→科分诊（挂号）→预约复诊或随诊
- D.导诊咨询→诊室接诊→候诊或转诊→各科分诊（挂号）→预约复诊或随诊

答案：A

2.接诊时如诊疗牙位为上颌牙，椅位调节标准为（ ）

- A.上颌 面与地面成 45°
- B.下颌 面与地面平行
- C.上颌 面与地面成 90°
- D.任意角度均可

答案：C

3.临床上最常用的器械传递方法是（ ）

- A.平行器械传递法
- B.旋转器械传递法
- C.握笔式直接传递法
- D.掌-拇指握式传递法

答案：C

4.在实施四手操作技术时，医师，护士有其各自的互不干扰的工作区域，护士的工作区域是（ ）

- A.位于时钟 7-12 时
- B.位于时钟 12-2 时
- C.位于时钟 2-4 时
- D.位于时钟 4-7 时

答案：C

5.在实施四手操作技术时，医师，护士有其各自的互不干扰的工作区域，医师的工作区域是（ ）

- A.位于时钟 7-12 时
- B.位于时钟 12-2 时
- C.位于时钟 2-4 时
- D.位于时钟 4-7 时

答案：A

6.医师在治疗下颌牙时多选时钟（ ）时位置。

- A.位于时钟 7-9 时
- B.位于时钟 9-11 时
- C.位于时钟 2-4 时
- D.位于时钟 4-7 时

答案：A

7.治疗上颌牙时多选用时钟（ ）时位置。

- A.位于时钟 7-9 时
- B.位于时钟 9-12 时
- C.位于时钟 2-4 时
- D.位于时钟 4-7 时

答案：B

8.当镊子夹持棉球时，采用（ ）传递法。

- A.掌式握持传递法
- B.掌-拇握式传递法
- C.握笔式直接传递法
- D.旋转器械传递法

答案：B

9.磨牙后压吸唾时，吸引器头放置在翼下颌舌骨嵴的舌侧约（3mm）处，勿触及软腭，以免诱发恶心。

- A.2mm
- B.3mm
- C.5mm
- D.7mm

答案：B

10.取用牙线的长度一般为（ ）

- A.5-15cm
- B.15-20cm
- C.20-25cm
- D.25-30cm

答案：C

11.建议每（ ）个月换一次牙刷。

- A.1
- B.1-2
- C.2-3
- D.4

答案：C

12.建议每天有效刷牙至少（ ）次，尤其重视睡前刷牙，每次刷牙持续（ ）分钟。

- A.2； 1-2
- B.2； 2-3
- C.3； 2-3
- D.3； 3-4

答案：B

13.高度危险口腔器械应达到（ ）水平。

- A.消毒
- B.低水平消毒
- C.高水平消毒
- D.灭菌

答案：D

14.口腔重复使用器械的消毒灭菌流程正确的是（ ）

- A.回收→消毒→清洗→干燥→检查与保养→包装→灭菌→监测
- B.回收→清洗→干燥→消毒→检查与保养→包装→灭菌→监测
- C.回收→清洗→消毒→干燥→检查与保养→包装→灭菌→监测
- D.回收→清洗→消毒→干燥→检查与保养→灭菌→包装→监测

答案：C

15.口腔器械消毒纸塑包装的密封宽度应（ ）

- A.大于等于 3mm
- B.大于等于 4mm
- C.大于等于 6mm
- D.大于等于 8mm

答案：C

16.护士发生锐器伤后，立即用健侧手在伤口旁（ ）轻轻挤压。

- A.由近心端向远心端
- B.由远心端向近心端
- C.在近心端
- D.在远心端

答案：A

17.一般玻璃离子水门汀填充用比例为（ ），粘接用时为（ ）

- A.1：2； 1：2
- B.1：1； 1：2
- C.2：1； 1：2
- D.1：2； 2：1

答案：B

18.树脂类根管封闭剂调拌好的糊剂应呈奶油状，细腻均匀，可拉起（ ）的丝。

- A.1-2cm
- B.0.5-1cm
- C.2-3cm
- D.1-1.5cm

答案：A

19.人工牙龈材料注射的高度约为（ ）

- A.2mm
- B.1mm
- C.2.5mm
- D.5mm

答案：D

20.人工牙龈材料注射时，除注意高度外，还需注意修整（ ）

- A.牙颈近龈缘处
- B.转移杆周围
- C.替代体周围
- D.流入邻间隙或邻牙区的多余材料

答案：D

21.正畸双组分化学固化托槽粘接剂的调拌应在（ ）内完成。

- A.10 秒
- B.20 秒
- C.30 秒
- D.40 秒

答案：B

22.石膏模型灌注的操作步骤正确的是（ ）

- A.核对→调拌石膏→灌注模型→形成底座→脱模→托盘分离→模型修整→操作后处理→送出制作→模型消毒

B.核对→调拌石膏→灌注模型→形成底座→脱模→模型修整→模型消毒→送出制作→操作后处理→托盘分离

C.核对→调拌石膏→灌注模型→形成底座→脱模→模型消毒→模型修整→操作后处理→送出制作→托盘分离

D.核对→调拌石膏→灌注模型→形成底座→模型消毒→脱模→模型修整→操作后处理→送出制作→托盘分离

答案：C

23.通常临床中固定义齿终印模的灌注选择（ ）活动义齿的终印模灌注选择（ ），研究模型可选择（ ）进行灌注。

A.超硬石膏；普通石膏；硬石膏

B.超硬石膏；硬石膏；普通石膏

C.硬石膏；超硬石膏；普通石膏

D.普通石膏；超硬石膏；硬石膏

答案：B

24.石膏灌注过程中应不断添加石膏直至牙列颈缘至底座的厚度为（ ）。

A.0.5~1cm

B.1~1.5cm

C.1.5~2cm

D.2~2.5cm

答案：B

25.石膏模型灌注过程中，应选择印模的（ ）处，放入少量调拌均匀的石膏，使石膏材料从高处流向四周。

A.高而开阔

B.狭窄处

C.低平处

D.低而开阔

正确答案：A

26.橡皮障的安装方法最常见的是：（ ）

A.牙线结扎或楔线法

B.翼法

C.橡皮障夹优先法

D.弓法

答案：B

27.上颌牙约在橡皮布上缘以下（ ）

A.2.5cm

B.4cm

C.1cm

D.5cm

答案：A

28.局部麻醉的操作流程正确的是：（ ）

A.安装麻醉药物→消毒→麻醉注射→观察→注射完毕

B.安装麻醉药物→麻醉注射→消毒→注射完毕→观察

C.安装麻醉药物→消毒→麻醉注射→注射完毕→观察

D.消毒→安装麻醉药物→麻醉注射→注射完毕→观察

答案：C

29.口腔局部麻醉的阻滞麻醉方法不包括（ ）

- A.上颌神经阻滞麻醉
- B.鼻腭神经阻滞麻醉
- C.牙周膜注射麻醉
- D.眶下神经阻滞麻醉

答案：C

30.患者，女性，26岁。主诉右下后牙疼痛，冷热敏感，牙龈反复疼痛肿胀。检查：右下颌第二磨牙远中龋损，第三磨牙近中埋伏阻生。经与患者沟通，医师采取先按除第三磨牙，再进行第二磨牙牙体治疗的方案。在按除第三磨牙前，需对患者进行局部麻醉，麻醉后可能出现的并发症中，不需要任何处理，能够自然恢复的是（ ）

- A.血肿
- B.晕厥
- C.过敏
- D.暂时性面瘫

答案：D

31.以下对于可见光固化复合树脂修复术后应告知患者的不包括（ ）

- A.24小时后再进食
- B.勿咬硬物
- C.1周内勿使用粗硬牙刷
- D.少饮浓茶、少吸烟

答案：A

32.以下对于可见光固化树脂充填修复术治疗流程说法正确的是（ ）

- A.牙体预备→清洗窝洞、隔湿消毒→酸蚀→粘接→充填固化→调恰抛光
- B.牙体预备→酸蚀→清洗窝洞、隔湿消毒→粘接→充填固化→调恰抛光
- C.牙体预备→清洗窝洞、隔湿消毒→粘接→酸蚀→充填固化→调恰抛光
- D.牙体预备→清洗窝洞、隔湿消毒→酸蚀→充填固化→粘接→调恰抛光

答案：A

33.患者，男性，58岁。自诉8个月前鼻咽癌放疗后，多数牙同时患龋且进展迅速就诊。检查：全口前牙唇面、邻面多有大小不一的深1-1.5mm的龋损，全口后牙的 面、邻面和颊面多有深2-3mm的形态不规则的隔损，所有龋损探诊软感明显，潮湿易于挖除。经与患者沟通，采取可见光固化复合树脂粘接修复。对此患者治疗的护理配合不正确的是（ ）

- A.使用酸蚀剂后，用高压喷水冲洗时，护士持吸唾器及时吸净冲洗液
- B.垫底材料需要调拌时，应严格按照材料说明书的粉液比例进行调拌，在规定时间内完成材料调拌
- C.为保证粘接效果，复合树脂应一次充填完成
- D.光固化机使用前最好套一次性防护膜，以避免医院感染的发生

答案：C

34.根管治疗术的基本治疗步骤正确的是（ ）

- A.开髓→根管预备→根管充填→牙冠修复
- B.开髓→根管预备→根管封药→牙冠修复
- C.根管预备→根管封药→根管充填→牙冠修复
- D.根管预备→根管消毒→根管封药→根管充填
- E 根带清毒→根管封药→根管充填→牙冠修复

答案：D

35.医师为复诊患者进行热牙胶校修充填，责任护士为其准备的用物中不应包括（ ）

- A.热熔充填仪携热器
- B.螺放充填器
- C.牙胶尖
- D.酒精灯

答案：D

36.关于根管充填术中护理人员进行的操作配合，描述正确的为（ ）

- A.货断牙胶时会产生烟雾，应使用弱力吸的器吸除洒雾
- B.护士夹取主牙胶尖后应立即传通给医师
- C.充填过程中应注意保护软组织，防止烫伤
- D.热熔充填仪注射枪无须预热，可随时使用

答案：C

37.显微根管外科手术的操作步骤正确的是：

- A.局部麻醉→翻瓣→去骨→根尖周刮治→根尖切除→根尖倒预备→倒充填→关瓣缝合
- B.局部麻醉→翻瓣→去骨→根尖切除→根尖周刮治→根尖倒预备→倒充填→关瓣缝合
- C.局部麻醉→翻瓣→去骨→根尖周刮治→根尖切除→根尖倒预备→关瓣缝合→倒充填
- D.局部麻醉→翻瓣→去骨→根尖倒预备→倒充填→根尖切除→根尖周刮治→关瓣缝合

答案：C

38.保持口镜清晰，可使用气枪轻吹口镜，并用纱布蘸（ ）间歇擦拭口镜表面。

- A.65%乙醇
- B.75%乙醇
- C.85%乙醇
- D.90%乙醇

答案：B

39.术前评估患者全身情况时不包括以下哪项内容（ ）

- A.女性患者是否处于月经期
- B.血压情况
- C.出凝血时间
- D.家属或配偶既往史

答案：D

40.患者术前准备正确的是（ ）

- A.指导患者使用清水进行口腔含漱
- B.患者术前无须进食
- C.提醒患者术前去卫生间
- D.口内活动义齿无须取出

答案：C

41.口周消毒时应使用（ ）碘伏。

- A.1%
- B.0.5%
- C.1.5%
- D.2%

答案：D

42.超声波龈上洁治术后应告知患者的内容不包括（ ）

A.可能出现暂时的过敏现象.

B.24 小时后方可进食

C.勿食过热食物

D.术后 1 周用漱口液含漱

正确答案：B

43.患者，男性，30 岁。牙龈红肿、出血就诊。自诉平时刷牙出血，咬食物出血，漱口后出血停止。检查：口腔卫生不良，牙石(++~+++)，牙龈色红，质软。已行超声波龈上洁治术，今日行龈下刮治术。对此患者治疗的护理配合不正确的是（ ）

A.准备安尔碘，协助消毒术区

B.超声波龈下刮治时，护士持吸唾管及时吸净水及碎屑

C.根面平整术时根据牙位依次传递刮治器

D.准备低速手机及抛光杯进行抛光

正确答案：D

44.超声波龈上洁治术治疗前的健康教育错误的是（ ）

A.根据治疗计划向患者介绍本次治疗的步骤和配合方

B.指导患者在治疗过程中不要用口呼吸

C.治疗中如有不适，要举左手示意

D.进行有效的口腔保健知识指导

答案：D

45.超声波龈上洁治术治疗中的健康教育错误的是（ ）

A.嘱患者如有不适要举左手示意

B.嘱患者治疗过程中会有少量出血

C.嘱患者治疗过程中如有不同程度的酸胀感属不正常现象，要及时举左手示意

D.嘱患者治疗过程中，酸胀感属正常现象

答案：C

46.以下不是超声波龈上洁治术治疗范围的是（ ）

A.去除龈上牙石

B.去除牙菌斑

C.可将牙齿表面磨光

D.防止牙石再沉积

答案：D

47.显微根管外科手术治疗前的健康教育错误的是（ ）

A.向患者介绍治疗的步骤和配合方法

B.指导患者在治疗过程中不要口呼吸

C.嘱患者 24 小时内勿进食过热食物

D.治疗过程中如有不适要举左手示意

答案：C

48.显微根管外科手术治疗中的健康教育错误的是（ ）

A.如有不适不要随意摆动头部

B.如有唾液可举左手示意，护士及时用吸唾器吸出

C.治疗中应使用温和的语言及时讲解治疗的情况以安抚患者

D.术后 30 分钟内不要漱口

答案：D

49.显微根管外科手术治疗后的健康教育错误的是（ ）

- A.术后创口会有少量渗血
- B.术后出血一般在 2-3 小时自行停止
- C.术后面部肿胀时每次冷敷 20 分钟，两次冷敷之间间隔 30 分钟
- D.术后第一天不要刷牙

答案：B

50.显微根管外科手术临床要点不包括（ ）

- A.保持术野清晰
- B.严格无菌操作
- C.吸唾时，要保证吸净患者口腔中的唾液、血液等液体，医师应耐心等待
- D.随时评估患者状况

答案：C

51.显微根管外科手术口外消毒范围为口腔周围（ ）

- A.5cm
- B.8cm
- C.10cm
- D.15cm

答案：C

52.根管治疗术的术前健康教育错误的是（ ）

- A.提示患者治疗过程中切勿用右手碰触医师
- B.指导患者鼻吸气，以避免误吸
- C.向患者介绍治疗步骤
- D.如有不适可举右手示意

答案：D

53.根管治疗术治疗中的健康教育错误的是（ ）

- A.术中避免移动头部误伤软组织
- B.如有不适可举右手示意
- C.治疗过程中及时告知患者操作过程，缓解患者紧张程序
- D.护士要及时进行橡皮布下口内吸唾

答案：B

54.根管治疗术治疗后的健康教育错误的是（ ）

- A.根管治疗后几天会产生轻度不适
- B.治疗后 2 小时内避免使用患侧咀嚼
- C.注意口腔卫生，保持口腔清洁
- D.2 个月后可正常进食硬物

答案：D

55.以下不属于根管预备流程部分的是（ ）

- A.开髓
- B.拔出牙髓
- C.窝洞暂封
- D.疏通根管

答案：C

56.以下不属于根管消毒流程的是（ ）

- A.使用初尖锉预备根管
- B.窝洞暂封

C.拆除橡皮障

D.荡洗根管

答案：A

57.以下不属于根管充填流程的是（ ）

A.根管充填前准备

B.消毒主牙胶尖

C.烫炖煮牙胶尖

D.冲洗根管

答案：D

58.光固化树脂照射时的注意事项错误的是（ ）

A.使用前应检查光固化灯光的导头

B.使用时为患者佩戴防护镜

C.照射时间 10 至 20 秒即可

D.如需长时间光照，每照射 10 到 20 秒停顿 5 秒

答案：D

59.龋损达牙本质中层，窝洞垫底保护牙髓使用的垫底材料一般为：（ ）

A.玻璃离子水门汀

B.氢氧化钙制剂

C.聚羧酸锌水门汀

D.磷酸锌水门汀

答案：A

60.光固化复合树脂连接修复术中操作流程错误的是（ ）

A.术区隔离

B.对口腔综合治疗台进行清洁消毒

C.酸蚀

D.窝洞垫底

答案：B

61.光固化复合树脂粘结修复术粘结面酸蚀的时间正确的是（ ）

A.10-15s

B.20-35s

C.15-30s

D.40s 以上

答案：C

62.复合树脂按照填料大小分类的是（ ）

A.可塑性复合树脂

B.前牙复合树脂

C.小填料复合树脂

D.流体树脂

答案：C

63.复合树脂按照填料流变性分类的是（ ）

A.可塑性复合树脂

B.前牙复合树脂

C.小填料复合树脂

D.微填料复合树脂

64.复合树脂按照适应症分类的是（ ）

- A.可塑性复合树脂
- B.前牙复合树脂
- C.小填料复合树脂
- D.微填料复合树脂

答案：B

65.口腔局部麻醉治疗后的健康教育错误的是（ ）

- A.治疗后出现局部血肿，需局部压迫止血
- B.告知患者如出现暂时性面瘫，不必紧张
- C.可正常饮食，无需忌口
- D.治疗后发生不适随时就诊

答案：C

66.以下不是局麻后出现的全身并发症的是：（ ）

- A.暂时性面瘫
- B.过敏反应
- C.中毒
- D.晕厥

答案：A

67.以下是局麻后出现的局部并发症的是：（ ）

- A.中毒
- B.过敏反应
- C.暂时性面瘫
- D.晕厥

答案：C

68.以下属于酰胺类局部麻醉药的是（ ）

- A.普鲁卡因
- B.丁卡因
- C.利多卡因
- D.以上都不是

答案：C

69.以下局部麻醉药物能引起过敏的是（ ）

- A.盐酸丁哌卡因
- B.丁卡因
- C.利多卡因
- D.甲哌卡因

答案：B

70.以下不是口腔科临床的局麻方的是（ ）

- A.表面麻醉
- B.浸润麻醉
- C.椎管内麻醉
- D.阻滞麻醉

答案：C

71.橡皮障隔离术上颌牙约在橡皮布上缘以下（ ）cm。

B.2.5

C.3.5

D.4.5

B

72.橡皮障隔离术下颌牙约在橡皮布下缘以上（ ）cm。

A.5

B.7

C.3

D.4

答案：A

73.橡皮布打孔器一般孔径最小的用于（ ）

A.下颌切牙

B.上颌切牙

C.尖牙及前磨牙

D.磨牙

答案：A

74.橡皮布打孔器一般第二个孔用于（ ）

A.下颌切牙

B.上颌切牙

C.尖牙及前磨牙

D.磨牙

答案：B

75.橡皮布打孔器一般第三个孔用于（ ）

A.下颌切牙

B.上颌切牙

C.尖牙及前磨牙

D.磨牙

答案：C

76.橡皮布打孔器一般第四个孔用于（ ）

A.下颌切牙

B.上颌切牙

C.尖牙及前磨牙

D.磨牙

答案：D

77.以下不是橡皮障隔离术优点的是：（ ）

A.提供良好操作空间

B.保护牙龈

C.隔湿效果明显

D.有利于减轻患者心理负担

答案：D

78.用翼法安装橡皮障时的缺点是（ ）

A.操作困难

B.操作效率下降

D.给患者造成较重的心理负担

答案：C

79.通常临床中固定义齿终印膜的灌注选择（ ）

A.硬石膏

B.超硬石膏

C.普通石膏

D.以上都不是

答案：B

80.通常临床中活动义齿终印膜的灌注选择（ ）

A.硬石膏

B.超硬石膏

C.普通石膏

D.以上都不是

答案：A

81.通常临床中研究模型印膜的灌注选择（ ）

A.硬石膏

B.超硬石膏

C.普通石膏

D.以上都不是

答案：C

82.无牙颌印模灌注时，上颌后缘要达到上颌结节后方（ ）

A.1cm

B.2cm

C.3cm

D.4cm

答案：A

83.无牙颌印模灌注时，下颌后缘要磨牙后垫后（ ）

A.1cm

B.2cm

C.3cm

D.4cm

答案：A

84.在托盘分离操作中，脱模后的印膜用 500 毫克每升含氯消毒液浸泡（ ）分钟。

A.20

B.30

C.40

D.50

答案：B

85.用真空调拌机调拌石膏材料时，调拌的时间为（ ）

A.30-50s

B.30-60s

C.1min 以上

D.2min 以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617000160011006160>