2024湖北省来凤县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题完整题库及答案【历年真题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.现代临床药物治疗更多依赖于循证医学的支持。循证医学证据分为几种，下列证据级别和推荐强度最高的是

A：同质病例对照研究的系统评价

B：单个大样本随机对照试验

C：大样本病案系列

D：同质随机对照试验的系统评价

答案：D

2.发病急剧，常累及双眼（或间隔1～2天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

A：过敏性结膜炎

B：流行性结膜炎

C：急性卡他性结膜炎

D：流行性出血性结膜炎

答案：C

3.患者，男，56岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A：阿米替林

B：普瑞巴林

C：卡马西平

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

4.与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 异丙托溴铵气雾剂

C: 茶碱片

D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：C

5.处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要用颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡黄色

B: 淡橙色

C: 淡红色

D: 淡绿色

答案：A

6.可能导致癫痫发作的药物是

A: 氟哌啶醇

B: 利血平

C: 白消安

D: 麻黄碱

答案：D

7.对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A: 雌二醇一屈螺酮片

B: 雌二醇／雌二醇-地屈孕酮片

C: 17β 一雌二醇

D: 戊酸雌二醇／雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：B

8.（2016年真题）用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（）。

A: 氟马西尼

B: 纳洛酮

C: 青霉胺

D: 乙酰胺

答案：C

9.患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 双氯芬酸钠

B: 对乙酰氨基酚

C: 尼美舒利

D: 美洛昔康

答案：B

10.属于润滑性泻药的是

A: 开塞露

B: 乳果糖

C: 番泻叶

D: 硫酸镁

答案：A

11.下列药物中不按兴奋剂管理的是

A: 钙通道阻滞剂

B: 精神刺激剂

C: 蛋白同化激素

D: 利尿剂

答案：A

12.单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的2型糖尿病患者首选

A: 阿卡波糖

B: 格列喹酮

C: 比格列酮

D: 二甲双胍

答案：A

13.冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

A: 150～300mg / d

B: 25～75mg / d

C: 25～50mg / d

D: 75～150mg / d

答案：D

14.轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

B：不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
C：休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30次/分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120次/分，奇脉，PaO
D：稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
答案：A

15.归属公共网络资源的是
A：www.ashp.org
B：www.googl
C：www.cmt.com.cn
D：www.merck.com
答案：B

16.沙眼的病原体为
A：细菌
B：支原体
C：病毒
D：衣原体
答案：D

17.患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。
A：高血压
B：2型糖尿病
C：高血脂

D: 1型糖尿病

答案：B

18.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 哌拉西林一他唑巴坦

C: 莫西沙星

D: 氨苄西林～舒巴坦

答案：C

19.（2015年真题）冠状动脉粥样硬化心脏病的患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为二级预防，最佳剂量范围是（）。

A: 75～150mg/d

B: 25～50mg/d

C: 150～300mg/d

D: 25～75mg/d

答案：A

20.服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

A: 螺内酯

B: 缬沙坦

C: 氢氯噻嗪

D: 硝苯地平

答案：C

21.促动力药

A: 铝碳酸镁

B: 多潘立酮

C: 埃索美拉唑

D: 法莫替丁

答案：B

22.若需要70%的乙醇1000ml，现有95%的乙醇应如何配制

A: 取736.8ml95%的乙醇，加1000ml水

B: 取263.2ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

C: 取263.2ml95%的乙醇，加1000ml水

D: 取736.8ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

答案：D

23.可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是()

A: 阿莫西林

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 头孢克洛

D: 诺氟沙星

答案：B

24.儿童2型糖尿病患者宜选用的药物是

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 格列喹酮

D: 阿卡波糖

答案：B

25.肖爷爷家的保姆来社区药店咨询购买治疗腹泻药品。询问后得知：肖爷爷72岁，独居，平日由保姆照顾起居。2天前开始腹泻，水样便，患者看上去虚弱乏力，身上长了红疹，但能正常饮食。有心衰和背痛病史，平常服用的药品有地高辛、呋塞米、对乙酰氨基酚；5天前因“咽炎”，医生处方“阿莫西林胶囊，500mgtid，连续服用7天”，还未吃完。药师应给予的正确建议是

A: 停用呋塞米

B: 停用地高辛

C: 继续服用原有药物

D: 停用阿莫西林，并立即就医

答案：D

26.（2019年真题）患者，男，64岁，因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果:血尿酸588.1μmol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片25mgqd、美托洛尔缓释47.5mgqd、赖诺普利片20mgqd、辛伐他汀片10mgqd、阿司匹林肠溶片100mgqd。

A: 美托洛尔和赖诺普利

B: 美托洛尔和辛伐他汀

C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

答案：D

27.患者，女，45岁，6个月前出现口吐白沫、意识丧失、二便失禁。在神经专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好。近3个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱。该患者在全国各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药物的安全用药和用药注意事项进行讨论。

A: 苯巴比妥

B: 地西泮

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：C

28.患者,女,75岁,近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状,入睡困难,多梦易惊醒,诊断为焦虑症、核查其用药记录,患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

A: 极度烦躁不安的自伤和伤人行为

B: 体重增加

C: 可致宿醉现象,容易跌倒

D: 心悸、震颤

答案：C

29.（2017年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

A: 仔细核对药品

B: 严格审核处方

C: 进行用药指导

D: 自行修改错误处方

答案：D

30.下列抗感冒药中，归属于处方药的是

A：对乙酰氨基酚片

B: 奥司他韦片

C: 含伪麻黄碱的复方制剂

D: 含金刚烷胺的复方制剂

答案：B

31.人体健康参数：肥胖的腰围标准是

A: 男性>85cm，女性>80cm

B: 男性>90cm，女性>85cm

C: 男性>90cm，女性>80cm

D: 男性>95cm，女性>85cm

答案：B

32.ADR报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其ADR因果关系可评价为

A: 很可能

B: 可能无关

C: 可能

D: 待评价

答案：D

33.适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 茶碱片

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

34.（2018年真题）患者，男，65岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括（）

A：胺碘酮可以显著抑制CYP2D6，减慢美托洛尔的代谢，应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

B：患者在复律成功后，尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

C：因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用，建议换成氨氯地平等CCB降压药

D：胺碘酮能增加华法林的抗凝活性，在逐渐降低胺碘酮剂量的时候，注意随时根据INR值调整华法林的剂量

答案：C

35.高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

A：痛风患者

B：双侧肾动脉狭窄患者

C：胃溃疡患者

D：心力衰竭患者

答案：A

36.急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低LDL-C的目标值为

A：<60mg/dl

B：<70mg/dl

C：<50mg/dl

D：<40mg/dl

答案：B

37.香豆素类抗凝血药

A：肝素

B：华法林

C：氯吡格雷

D：利伐沙班

答案：B

38.可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

A：左氧氟沙星

B：卡马西平

C：特拉唑嗪

D：头孢哌酮

答案：C

39.抑制细菌叶酸合成的药物是

A：磺胺嘧啶

B：利福喷汀

C：头孢哌酮

D：头孢米诺

答案：A

40.（2019年真题）患儿，男，1岁4个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿服用维生素D5000IU，3个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状，化验结果：血钙18mg/dl，25-OH-D3水平632ng/ml。诊断为维生素D中毒，下列处理措施错误的是

A：停饮牛奶

B：增加日晒

C：停用维生素D及强化食品

D：停用钙剂

答案：B

41.关于HBV，下列说法正确的为

A：乙型肝炎一般为自限性疾病?

B：加热100℃一分钟就可使乙肝病毒失去活性?

C：治疗HBV的抗病毒药包括α-干扰素和核苷酸类似物两大类?

D：HBV是一种经肠道传播的RNA病毒?

答案：C

42.（2016年真题）患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是（）。

A：肺纤维化

B：肝脏毒性

C：肾脏毒性

D：心脏毒性

答案：C

43.同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是

A：预混胰岛素

B：甘精胰岛素

C：普通胰岛素

D：低精蛋白锌胰岛素

答案：A

44.可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A：克拉霉素

B: 阿莫西林

C: 替考拉宁

D: 头孢洛林

答案：A

45.患者，女，58岁，罹患肺癌，术后化疗3次，半年后复发，决定使用安罗替尼12mgqd靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

A: Q—T间期延长

B: 腹泻

C: 乙型肝炎复发

D: 出血

答案：D

46.归属"用药记录"项下的是

A: 联合用药

B: 临床诊断

C: 主要实验室检查数据

D: 医保和费用支付情况

答案：A

47.患者，女，45岁，既往有扩张型心肌病，近1年出现劳累性呼吸困难，1天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。根据该患者临床表现，最可能的诊断为

A: 支气管肺炎

B: 急性左心衰竭

C：大叶性肺炎

D：急性心肌炎

答案：B

48.“隔日1次”的外文缩写为()。

A：Ad

B：qod

C：gtt

D：Add

答案：B

49.患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该ADR的因果关系评价结果是

A：可能无关

B：肯定

C：可能

D：很可能

答案：D

50.为了减少胃黏膜刺激、适宜餐中服用的是

A：二甲双胍

B：维生素C

C：多潘立酮

D：普伐他汀

答案：A

51.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

A: 磷酸可待因糖浆

B: 聚乙二醇粉剂

C: 吲哚美辛胶囊

D: 非洛地平缓释片

答案：B

52.（2015年真题）患者，男，50岁，高血压病史3年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

A: 控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用

B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同

C: 控释片比普通片剂含量相同，与普通片给药次数相同

D: 控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压

答案：D

53.可抑制血小板聚集和释放的药物是

A: 链激酶

B: 噻氯匹定

C: 华法林

D: 肝素

答案：B

54.（2015年真题）氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是（）。

A: 肝病

B: 神经系统疾病

C: 胃肠类疾病

D: 血液系统疾病

答案：B

55.沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是()

A: 甲硝唑栓

B: 莫匹罗星软膏

C: 吲哚美辛栓

D: 伏立康唑片

答案：A

56.哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是（）

A: 胰岛素

B: 依那普利

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 复方炔诺酮

答案：C

57.根据英国Cochrane中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准，同质病例对照研究的系统评价在循证医学评价中的证据级别属于

A: Ⅴ级

B: Ⅰa级

C: Ⅲa级

D: Ⅱa级

答案：C

58.下列临床试验分期中，上市后药品临床评价阶段属于

A: Ⅰ期临床试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅱa期临床试验

D: Ⅳ期临床试验

答案：D

59.已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次400mg。一个体重为10kg的11个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

A: 90mg

B: 75mg

C: 100mg

D: 50mg

答案：C

60.提供信息不全面，一般需同时使用几种检索工具是指

A: 一级信息源

B: 三级信息源

C: 二级信息源

D: 四级信息源

答案：C

61.饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

A: 红色

B: 暗绿色

C: 黑褐色

D: 酱色

答案：A

62.患者,男,69岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是()

A: 非洛地平

B: 普萘洛尔
C: 多沙唑嗪
D: 卡托普利
答案：A

63.（2015年真题）上市后药品临床再评价阶段是（）。
A: Ⅲ期临床试验
B: Ⅳ期临床试验
C: Ⅰ期临床试验
D: Ⅱ期临床试验
答案：B

64.微粒型非诺贝特的用量是（）
A: 0.6g，bid
B: 0.1g，tid
C: 0.2g，qd
D: 0.2g，tid
答案：C

65.氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。
A: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
B: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
C: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
D: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
答案：B

66.支气管扩张的临床表现是

A: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达2～3个月

C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：D

67.用于用药错误分级的是（）

A: NCEMERP标准

B: CLHD公式

C: CoChrAnE分级

D: CoCkroft-GAut公式

答案：A

68.高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛，提示可能是

A: 脑血管意外

B: 脑肿瘤

C: 脑膜炎

D: 动脉瘤

答案：A

69.属于5α还原酶抑制剂的是（）

A: 雌三醇

B: 普适泰

C: 度他雄胺

D: 氟他胺

答案：C

70.（2019年真题）患者，女，35岁，复杂部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A：4～12μg/ml

B：10～40μg/ml

C：10～20μg/ml

D：50～150μg/ml

答案：D

71.静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

A：5%葡萄糖注射液

B：50%葡萄糖注射液

C：复方氯化钠注射液

D：0.9%氯化钠注射液

答案：A

72.一位巨幼细胞性贫血患儿肌内注射维生素B

A：0.049～0.20ml

B：0.05～0.10ml

C：0.15～0.30ml

D：0.25～0.40ml

答案：B

73.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×109/L，中性粒细胞百分比85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 急性膀胱炎

B: 急性肾小球肾炎

C: 慢性肾盂肾炎

D: 急性肾盂肾炎

答案：D

74.2～3度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: 利尿剂（袢利尿药）

C: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

D: ACEI

答案：C

75.评判为不规范处方的是

A: 黄连素用于细菌性腹泻

B: 二甲双胍用于糖尿病人

C: 无适应证用药

D: 单张门急诊处方超过5种药品

答案：D

76.查询药物质量检验标准可首选的书籍是

A: 《新编药物学》

B: 《药物治疗学》

C: 《药物流行病学》

D: 《中华人民共和国药典》

答案：D

77.服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

A：服药期间不宜饮茶

B：用药期间不宜食用富含组胺类的食物

C：服药期间不宜饮酒

D：用药期间宜吃高蛋白食物

答案：B

78.含有右美沙芬的抗感冒药禁用于

A：疲劳和生活规律紊乱者

B：有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者

C：患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

D：妊娠初期及哺乳期妇女

答案：D

79.新生儿白细胞计数的正常范围值

A：（15.0～20.0）×109/L

B：（10.0～20.0）×109/L

C：（3.5～10.0）×109/L

D：（11.0～12.0）×109/L

答案：A

80.不宜与葡萄柚汁合用的药物是

A：磺胺类药物

B：左旋多巴

C：硫酸亚铁

D: 辛伐他汀

答案：D

81.能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

A: 直接观察

B: 病历审查

C: 计算机检测方法

D: 岗位工作问责

答案：C

82.患者男性，30岁，确诊哮喘入院治疗3周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

A: H1受体阻断剂

B: β2受体激动剂

C: β 受体阻断剂

D: 抗胆碱药物

答案：C

83.某患者，女性，28岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示Hb＜90g/L。

A: 睡前

B: 餐后

C: 清晨

D: 餐前

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/617114106046010024