

2024 年安徽省枞阳县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题加下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

- A: 抑制胃酸分泌作用
- B: 局部止血作用
- C: 主要是抑制 H^+, K^+-ATP 酶
- D: 可以中和胃酸

答案：D

2. （2017 年真题）眼部病毒感染宜选用（）

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 氯霉素滴眼剂

答案：B

3. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 不孕症
- B: 贫血
- C: 脂溢性皮炎
- D: 脚气病

答案：D

4. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 硝苯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 氯沙坦
- D: 卡托普利

答案：C

5. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 预期性恶心呕吐
- B: 爆发性恶心呕吐
- C: 延迟性恶心呕吐
- D: 急性恶心呕吐

答案：D

6. 局部外用于皮肤黏膜感染者的是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 磺胺米隆
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

7. 老年人对苯二氮革类药物较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

- A: 老年期痴呆
- B: 戒断综合征
- C: 震颤麻痹综合征
- D: “宿醉”现象

答案：D

8. 四环素联用麦角生物碱

- A: 肝毒性增加
- B: 口服吸收减少
- C: 调整抗凝血药的剂量
- D: 增加麦角中毒的风险

答案：D

9. 可增加肝毒性的药物是

- A: 利福平
- B: β 受体阻断剂
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：A

10. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 单硝酸异山梨酯
- B: 戊四醇酯
- C: 硝酸甘油
- D: 硝酸异山梨酯

答案：C

11. 主要经胆汁排泄的抗生素是

- A: 美洛西林
- B: 青霉素
- C: 头孢甲肟
- D: 头孢哌酮

答案：D

12. 用药过程中需注意监护心脏毒性的是()

- A: 多柔比星
- B: 丝裂霉素
- C: 甲氨蝶呤
- D: 伊立替康

答案：A

13. 口服避孕药的禁忌证不包括()

- A: 不明原因阴道出血
- B: 激素依赖性肿瘤
- C: 重度肝功能不全
- D: 甲状腺功能减退

答案：D

14. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

- A: 氢氧化镁
- B: 氢氧化铝
- C: 三硅酸镁
- D: 碳酸钙

答案：B

15. 巴比妥类急性中毒时，导致死亡的主要原因是

- A: 肾损害
- B: 呼吸循环衰竭
- C: 心搏骤停
- D: 肝损害

答案：B

16. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

- A: 麻黄碱滴鼻液
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 赛洛唑啉滴鼻液
- D: 羟甲唑啉滴鼻液

答案：A

17. 从植物中提取，具有促进白细胞增生、抗炎、降血压、抗肿瘤、抗心肌缺氧缺血、抗心律失常等作用的是

- A: 鲨肝醇
- B: 小檗胺
- C: 维生素 B4
- D: 丙酸诺龙

答案：B

18. 氟喹诺酮类

- A: 禁用于胆道阻塞患者
- B: 禁用于 8 岁以下儿童
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：D

19. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 来曲唑
- B: 羟喜树碱
- C: 甲氨蝶呤
- D: 卡莫氟

答案：C

20. 对环氧酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

21. 氨基糖苷类作用机制

- A: 抑制细菌糖代谢
- B: 抑制细菌细胞壁合成
- C: 抑制细菌蛋白质合成
- D: 干扰细菌核酸代谢

答案：C

22. 下述保肝药中属于解毒类的是()

- A: 复方甘草酸苷
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 硫普罗宁

答案：D

23. 临床上常用于溶解耵聍的药物是

- A: 1%新霉素
- B: 4%硼酸甘油
- C: 3%过氧化氢
- D: 5%碳酸氢钠

答案：D

24. 润滑性泻药()

A: 地芬诺酯

B: 乳果糖

C: 甘油

D: 硫酸镁

答案：C

25. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

答案：B

26. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

A: 长春瑞滨

B: 甲氨蝶呤

C: 吉西他滨

D: 巯嘌呤

答案：B

27. 红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

A: 万古霉素

B: 罗红霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案: D

28. 属于解毒类保肝药的是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 异甘草酸镁

C: 双环醇

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: A

29. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

A: 替米沙坦

B: 坦洛新 (坦索罗辛)

C: 依那普利

D: 哌唑嗪

答案: A

30. 下列药物中, 不属于蒽环类抗肿瘤抗生素的是

A: 红霉素

B: 柔红霉素

C: 多柔比星

D: 表柔比星

答案: A

31. 青霉素 G

A: 对支原体有效

B: 抗菌作用强, 对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

C: 对 G⁺、G⁻ 球菌及螺旋体等有效

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 对 G⁺、G⁻ 球菌，特别是对 G⁻ 杆菌有效

答案：C

32. (2015 年真题) 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是 ()。

A: 多柔比星

B: 多西他赛

C: 伊立替康

D: 氟尿嘧啶

答案：A

33. 治疗斑疹伤寒的首选药是

A: 氯霉素

B: 四环素

C: 青霉素

D: 诺氟沙星

答案：B

34. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

A: δ 受体

B: $\mu 2$ 受体

C: $\mu 1$ 受体

D: K 受体

答案：A

35. 用于疥疮和阴虱病的药物是 ()

A: 维 A 酸

B: 硼酸

C: 林旦

D: 过氧苯甲酰

答案: C

36. 可抑制胃酸分泌，升高胃及十二指肠内 pH，防止胰酶失活的是

A: 胃蛋白酶

B: 碳酸氢钠

C: 乳酸菌素

D: 雷尼替丁

答案: D

37. 铁剂用于治疗

A: 再生障碍性贫血

B: 小细胞低血红蛋白性贫血

C: 溶血性贫血

D: 巨幼细胞贫血

答案: B

38. (2015 年真题) 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是 ()

。

A: 秋水仙碱

B: 二氟尼柳

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案: A

39. 顺铂所致的肾损害会延缓药物的排泄而导致肾毒性增加，该药物是

A: 甲氨蝶呤

- B: 丙磺舒
- C: 苯海拉明
- D: 呋塞米

答案：A

40. 叶酸可用于治疗

- A: 妊娠期巨幼细胞贫血
- B: 小细胞低色素性贫血
- C: 溶血性贫血
- D: 甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼细胞贫血

答案：A

41. 链霉素首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 伤寒、副伤寒
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 布鲁菌病

答案：C

42. 属于促性腺激素释放激素类似物的是()

- A: 米非司酮
- B: 普拉睾酮
- C: 戈那瑞林
- D: 达那唑

答案：C

43. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

- A: $\mu 2$ 受体

B: $\mu 1$ 受体

C: δ 受体

D: K 受体

答案：B

44. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 甲氨蝶呤

B: 喜树碱

C: 卡莫氟

D: 来曲唑

答案：D

45. (2017 年真题) 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D₂ 受体的促胃肠动力药是 ()

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 昂丹司琼

答案：C

46. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

A: 子宫强直性收缩

B: 维持时间短

C: 孕妇血压升高

D: 抑制胎儿呼吸

答案：A

47. 毛果芸香碱对眼的作用是

- A: 扩瞳、降眼压，调节痉挛
- B: 缩瞳、升眼压，调节痉挛
- C: 缩瞳、降眼压，调节痉挛
- D: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

答案：C

48. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 20%甘露醇
- D: 碘苷

答案：B

49. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 赛洛唑啉
- C: 羟甲唑啉
- D: 麻黄碱

答案：D

50. 患者，女，63岁，因心绞痛急诊就医，诊断为ST段抬高心肌梗死，血压175/95mmHg，心率110次/分，该患者适使用的药物是

- A: 硝普钠
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 贝那普利

答案：B

51. 维持人体正常代谢所必需的小分子有机化合物，大部分需要从食物中摄取的是

- A: 葡萄糖
- B: 维生素
- C: 脂肪乳
- D: 果糖

答案：B

52. 通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 普萘洛尔
- D: 双嘧达莫

答案：B

53. 不能减小前列腺的体积,也不能降低 PSA 水平但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是()

- A: 他达拉非
- B: 非那雄胺
- C: 西地那非
- D: 坦索罗辛

答案：D

54. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 保护胃黏膜
- B: 阻断组胺 H
- C: 中和胃酸
- D: 抑制 H

答案：B

55. 以下适应证与其他四个药物不同的是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 克霉唑
- D: 联苯苄唑

答案：A

56. 下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

- A: 硼酸
- B: 利巴韦林滴鼻液
- C: 盐酸麻黄碱滴鼻液
- D: 链霉素溶剂

答案：C

57. 属于贝丁酸类调节血脂药是（）。

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案: B

58. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢他啶
- C: 头孢唑林
- D: 头孢米诺

答案: B

59. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 5mg / kg
- B: 60mg&g
- C: 40mg / kg
- D: 15mg / kg

答案: C

60. 能抑制 T

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 甲巯咪唑
- C: 甲硫氧嘧啶
- D: 卡比马唑

答案: A

61. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 谷丙胺

D: 法莫替丁

答案: A

62. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

A: 头孢吡肟

B: 头孢拉定

C: 头孢克肟

D: 头孢克洛

答案: B

63. 下列关于睾酮替代治疗的描述，正确的是()

A: 可直接改善勃起功能障碍

B: 通过提高性欲治疗继发性勃起功能障碍

C: 不能改善性腺功能低下

D: 对年轻患者的作用较老年患者更显著

答案: B

64. 患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

A: 碳酸锂

B: 甲巯咪唑

C: 普萘洛尔

D: 丙硫氧嘧啶

答案: B

65. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

A: 西沙必利

B: 多潘立酮

C: 甲氧氯普胺

D: 莫沙必利

答案: A

66. 下列哪个药物没有散瞳作用

A: 毛果芸香碱

B: 去氧肾上腺素

C: 托吡卡胺

D: 硫酸阿托品

答案: A

67. 仅在体内有凝血作用的药物是

A: 华法林

B: 尿激酶

C: 肝素

D: 噻氯匹啶

答案: A

68. 使用铁制品煎煮酸性食物

A: 细胞缺氧、酸中毒、休克

B: 锥体外系反应

C: 过敏反应

D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案: A

69. (2015 年真题) 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是 ()。

A: 夫西地酸

- B: 磷霉素
- C: 万古霉素
- D: 莫西沙星

答案：C

70. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取
- B: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- C: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取
- D: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解

答案：D

71. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

- A: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情
- B: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用
- C: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液
- D: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

答案：A

72. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 克拉霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：D

73. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 孟鲁司特
- B: 多索茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 噻托溴铵

答案：C

74. 功能性子宫出血可选用的药物是()

- A: 司坦唑醇
- B: 米非司酮
- C: 他莫昔芬
- D: 雌二醇

答案：D

75. 治疗轻、中型糖尿病的是

- A: 胰岛素
- B: A 和 B 均无效
- C: 磺酰脲类
- D: 二甲双胍

答案：D

76. (2018 年真题) 在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是 ()

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 氟伐他汀
- C: 阿托伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：D

77. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

- A: 多柔比星
- B: 长春新碱
- C: 博来霉素
- D: 环磷酰胺

答案：D

78. 下列关于雌激素的描述，错误的是

- A: 长期使用需监测血糖
- B: 雌激素治疗可能增加乳腺癌的风险
- C: 雌激素治疗前需评估患者发生血栓的风险
- D: 雌激素治疗可能诱发阴道出血

答案：A

79. 紧急降低眼压首选的药物是()

- A: 拟 M 胆碱药
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: β 受体阻滞药
- D: 20%甘露醇

答案：D

80. 对脑血管扩张作用较强的药物是()

- A: 非洛地平
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 尼索地平

答案：C

81. 属于 I c 类抗心律失常药的是 ()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮
- D: 奎尼丁

答案: B

82. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

- A: 他莫昔芬
- B: 依普黄酮
- C: 地屈孕酮
- D: 戊酸雌二醇

答案: C

83. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应
- B: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量
- C: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平
- D: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向

答案: D

84. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障
- B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- C: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

D: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

答案: A

85. 耐酸耐酶的青霉素是

A: 青霉素 V

B: 羧苄西林

C: 氨苄西林

D: 双氯西林

答案: D

86. 成人使用阿托品最低致死量为

A: 10mg

B: 5mg

C: 50mg

D: 80mg~130mg

答案: D

87. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

C: 莫西沙星对厌氧菌有效

D: 莫西沙星对非典型病原体无效

答案: D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 下列与激素水平无关的肿瘤是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/618011072046007022>