

福建省光泽县《执业药师之西药学专业二》 资格考试必刷 200 题题库附答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 服用后可能导致口中有氨味、舌、大便变黑，牙齿变色的药物是

- A: 胶体果胶铋
- B: 雷尼替丁
- C: 兰索拉唑
- D: 硫糖铝

答案：A

2. 下列何药对心房颤动无治疗作用

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案：C

3. 强效（使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 依折麦布
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：C

4. 茶碱浓度 $42 \mu\text{g/ml}$ 时会出现

- A: 为有效的治疗浓度
- B: 呼吸、心跳停止
- C: 恶心、呕吐、失眠
- D: 心动过速、心律失常

答案：B

5. 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 伐昔洛韦
- B: 泛昔洛韦
- C: 昔多福韦
- D: 喷昔洛韦

答案：A

6. 主要经胆汁排泄(仅有 5%左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是()

- A: 格列喹酮
- B: 格列美脲
- C: 格列齐特
- D: 格列吡嗪

答案：A

7. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案：A

8. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定可用于治疗高血压危象
- B: 可乐定是中枢性降压药
- C: 可乐定可用于治疗中度高血压
- D: 可乐定可用于治疗重度高血压

答案：D

9. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 硝酸甘油
- B: 戊四醇酯
- C: 单硝酸异山梨酯
- D: 硝酸异山梨酯

答案：A

10. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 利多卡因
- C: 奎尼丁
- D: 普萘洛尔

答案：D

11. 抑制微管聚合，阻碍纺锤体的形成

- A: 他莫昔芬
- B: 长春碱
- C: 羟基树碱
- D: 紫杉醇

答案：B

12. 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

- A: 肠梗阻患者禁用
- B: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童
- C: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便
- D: 疗程不宜过长

答案：C

13. 大剂量使用维生素 K

- A: 维生素
- B: 肝素
- C: 双香豆素
- D: 氨甲苯酸

答案：B

14. 属于容积性泻药的是()

- A: 利那洛肽
- B: 番泻叶
- C: 多库酯钠
- D: 欧车前

答案：D

15. 华法林抗血栓形成的最大效应时间为

- A: 2min
- B: 6 天
- C: 5~7 天
- D: 3 天

答案：B

16. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 甲基多巴
- C: 可乐定
- D: 肾素抑制剂

答案：A

17. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

- A: 磷酸二酯酶
- B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: 碳酸酐酶

答案：C

18. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 直接补充胰岛素
- C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：C

19. 属于抗甲状腺药的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 左甲状腺素
- C: 生长抑素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：A

20. 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

- A: 布美他尼
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 呋塞米

答案：A

21. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

答案：A

22. 主要抑制排卵的短效口服避孕药

- A: 复方炔诺酮片
- B: 雌二醇
- C: 炔诺酮
- D: 雌三醇

答案：A

23. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

- A: 5-HT
- B: 每日化疗前，应用 5-HT
- C: 奥美拉唑+口服地塞米松
- D: 5-HT

答案：D

24. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 滴眼后不应压迫泪囊
- B: 可诱发闭角型青光眼
- C: 可给予拟胆碱类药物解毒
- D: 哺乳期慎用

答案：A

25. 属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

- A: 哌替啶
- B: 布洛芬
- C: 吗啡
- D: 秋水仙碱

答案：A

26. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高
- B: 抑制磷酸二酯酶
- C: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高
- D: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张

答案：C

27. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

- A: 孕妇血压升高
- B: 抑制胎儿呼吸
- C: 子宫强直性收缩
- D: 维持时间短

答案：C

28. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 美托洛尔
- D: 地尔硫

答案：B

29. 属于靶向抗肿瘤药物的是

- A: 昂丹司琼
- B: 紫杉醇
- C: 吉非替尼
- D: 多柔比星

答案：C

30. 鱼精蛋白可用于救治()。

- A: 异烟肼中毒导致的神经毒性
- B: 肝素过量导致的出血
- C: 华法林过量导致的出血
- D: 吗啡过量导致的呼吸抵制

答案：B

31. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

- A: 表皮生长因子受体
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20
- C: 人表皮生长因子受体-2

D: 血管内皮生长因子

答案: C

32. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 静脉用胰岛素

D: 二甲双胍

答案: C

33. 伊曲康唑与肝药酶的关系是

A: CYP3A4 酶的诱导剂

B: 伊曲康唑主要经 CYP2C9 酶代谢

C: CYP3A4 酶的抑制剂

D: 伊曲康唑主要经 CYP1A2 酶代谢

答案: C

34. 下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

A: 两性霉素

B: 制霉菌素

C: 伊曲康唑

D: 灰黄霉素

答案: D

35. 抗骨吸收作用由弱到强排列正确的是

A: 依替膦酸二钠

B: 阿仑膦酸钠

C: 氯屈膦酸二钠

D: 帕米膦酸二钠

答案：C

36. 镇痛药合理用药原则不包括

A: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物

B: 按时给药，而不是按需给药

C: 尽可能选择口服给药

D: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量

答案：A

37. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

A: 氨氯地平

B: 硝普钠

C: 美托洛尔

D: 贝那普利

答案：C

38. 睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

A: 口服给药

B: 透皮给药

C: 注射给药

D: 肠道外给药

答案：C

39. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 地屈孕酮
- B: 环丙孕酮
- C: 屈螺酮
- D: 甲羟孕酮

答案：A

40. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 利奈唑胺+哌替啶
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 磷霉素氨丁三醇
- D: 利奈唑胺+苯丙醇胺

答案：C

41. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是

- A: 坦洛新
- B: 十一酸睾酮
- C: 特拉唑嗪
- D: 西地那非

答案：A

42. 青光眼患者应该慎用

- A: 沙丁胺醇
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 噻托溴铵

答案：D

43. 下述关于甘油的描述，错误的是

- A: 属于渗透性泻药
- B: 妊娠期妇女慎用
- C: 属于润滑性泻药
- D: 用于便秘的治疗

答案：A

44. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

45. 晚期前列腺癌（乳腺癌、卵巢癌患者禁用）可选用的药物是

- A: 垂体后叶素
- B: 戊酸雌二醇
- C: 缩宫素
- D: 他莫昔芬

答案：B

46. 甲状腺危象宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硫脲类
- C: 硫脲类+大剂量碘
- D: 甲状腺片

答案：C

47. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 氯硝西泮
- C: 吗氯贝胺
- D: 丙戊酸钠

答案：C

48. 治疗危重深部真菌感染的唯一有效药是()

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 克林霉素

答案：C

49. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 吸入性糖皮质激素+短效 β
- B: 吸入性糖皮质激素+长效 β
- C: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- D: 长效 β

答案：B

50. 吸入给药中，较易掌握的方法是

- A: 干粉吸入方法
- B: 雾化吸入溶液
- C: 气雾剂
- D: 口服制剂

答案：A

51. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

- A: II、VII、IX、X 因子
- B: II、VII 因子
- C: II、VIII、XI、IV 因子
- D: VII、XI、VII、IX 因子

答案：A

52. (2015 年真题) 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 西格列汀

答案：D

53. 肝素的抗凝作用特点是()

- A: 体内、外均有效
- B: 作用缓慢
- C: 必须有维生素 K 辅助
- D: 仅在体内有效

答案：A

54. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 罗红霉素
- D: 红霉素

答案：B

55. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 更昔洛韦
- C: 碘苷
- D: 利巴韦林

答案：D

56. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案：B

57. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 放射性碘

答案：A

58. 作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量 2~3 倍的利尿药物是

- A: 螺内酯
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：A

59. 维生素 B12 的适应证为

- A: 拮抗华法林过量导致的出血
- B: 纤溶亢进所致的出血
- C: 拮抗肝素过量导致的出血
- D: 恶性贫血和巨幼细胞贫血

答案：D

60. 防治新生儿出血症应选用

- A: 氨甲环酸
- B: 维生素 K
- C: 垂体后叶素
- D: 维生素

答案：B

61. 仅用于肠道感染的药物是()

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺米隆

答案：C

62. 关于维生素的使用，正确的是

- A: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验
- B: 维生素 C 以空腹服用为宜
- C: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低
- D: 肌肉注射维生素 B1 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要

答案：B

63. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 葡萄糖酸钙

答案：B

64. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是()

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 维生素 K

答案：B

65. 下列哪项不属于提高镇静催眠用药安全性的特点

- A: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- B: 镇静催眠药可交替使用
- C: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- D: 服用后应避免高速高空作业

答案：A

66. 神经毒性较严重的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 卡铂
- D: 亚叶酸钙

答案：B

67. 静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 庆大霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

68. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

- A: 维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 阿达帕林

答案：B

69. (2015 年真题) 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是 ()。

- A: 阿那曲唑
- B: 炔雌醇
- C: 他莫昔芬
- D: 丙酸睾酮

答案：A

70. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ()

- A: 美司钠
- B: 氯化钾
- C: 螺内酯

D: 二甲双胍

答案：A

71. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

A: 维拉帕米

B: 硝苯地平

C: 尼群地平

D: 尼莫地平

答案：B

72. 阿司匹林的主要适应证不包括()

A: 胃溃疡

B: 不稳定型心绞痛

C: 预防血栓形成

D: 急性心肌梗死

答案：A

73. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是

A: 苯甲酸苄酯

B: 硫黄软膏

C: 林旦霜

D: 过氧苯甲酰

答案：D

74. 由我国学者发现并用于抗疟的是

A: 二氯沙奈

B: 链霉素

C: 青蒿素

D: 甲硝唑

答案: C

75. (2021 年真题) 抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是 ()

A: 尿激酶

B: 替奈普酶

C: 瑞替普酶

D: 重组链激酶

答案: D

76. 治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物 ()

A: 阿达帕林

B: 壬二酸

C: 维 A 酸

D: 异维 A 酸

答案: C

77. 氯霉素最严重的不良反应是

A: 抑制骨髓造血功能

B: 胃肠道反应

C: 二重感染

D: 肝脏损害

答案: A

78. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 肾绞痛

B: 胃溃疡

C: 骨关节炎

D: 痛风

答案：C

79. 刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素的是

A: 二甲双胍

B: 磺酰脲类

C: 胰岛素

D: A 和 B 均无效

答案：B

80. 根据时间药理学的理论，糖皮质激素隔日疗法的给药时间为()

A: 上午 7 时

B: 凌晨 4 时

C: 晚上 7 时

D: 下午 4 时

答案：A

81. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A: 卡莫氟

B: 来曲唑

C: 喜树碱

D: 甲氨蝶呤

答案：A

82. 属于抗炎类保肝药的是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 熊去氧胆酸

D: 甘草酸二铵

答案：D

83. 降低肾素活性最强的药物是

A: 可乐定

B: 卡托普利

C: 普萘洛尔

D: 硝苯地平

答案：C

84. (2017 年真题) 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是 ()

A: 华法林

B: 氨甲环酸

C: 依诺肝素

D: 达比加群酯

答案：A

85. 高效抑菌药是

A: 异烟肼

B: 磺胺嘧啶

C: 头孢菌素

D: 氯霉素

答案：B

86. 可以与青霉素 G 混合的是

A: 维生素 C

B: 葡萄糖注射液

C: 维生素 B 族

D: 生理盐水

答案：D

87. 下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

A: 泼尼松

B: 甲泼尼龙

C: 泼尼松龙

D: 地塞米松

答案：D

88. 维生素 B

A: 脚气病

B: 成人佝偻病

C: 坏血病

D: 角膜软化症

答案：A

89. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

A: 哌嗪

B: 左旋咪唑

C: 阿苯达唑

D: 甲苯咪唑

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/618020107000007024>