

2024 年江西省乐安县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题含答案【预 热题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以肠内营养乳剂（TPF-D）作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

- A: 30ml/kg
- B: 40ml/kg
- C: 10ml/kg
- D: 20ml/kg

答案：A

2. 治疗慢性失血（如内痔出血）所致的贫血应选用

- A: 谷维素
- B: 硫酸亚铁
- C: 叶酸
- D: 维生素 B

答案：B

3. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 上午 8 时左右
- B: 晚餐前
- C: 中午 12 时左右
- D: 下午 4 时左右

答案：A

4. 不属于普罗帕酮作用特点的是

- A: 属于 I c 类抗心律失常药
- B: 在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高
- C: 无肝首过效应
- D: 适用于室上性和室性心律失常

答案：C

5. 伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

- A: 瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低
- B: 心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少
- C: 心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少
- D: 显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少

答案：B

6. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测
- B: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- C: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量
- D: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药

答案：B

7. 以下哪种心律失常禁用强心苷

- A: 室上性心动过速

- B: 心房颤动
- C: 心房扑动
- D: 室性心动过速

答案：D

8. 功能性子宫出血可选用的药物是

- A: 垂体后叶素
- B: 雌二醇
- C: 缩宫素
- D: 他莫昔芬

答案：B

9. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 羟喜树碱
- B: 卡莫氟
- C: 甲氨蝶呤
- D: 来曲唑

答案：B

10. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

- A: 别嘌醇
- B: 扑热息痛
- C: 丙磺舒
- D: 塞来昔布

答案：C

11. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 利福平

- B: 四环素
- C: 环孢素
- D: 苯巴比妥

答案：C

12. 胰岛素增敏剂是

- A: 阿卡波糖
- B: 吡格列酮
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 西格列汀

答案：B

13. 氢氯噻嗪的药理作用是()

- A: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- B: 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性
- C: 抑制远曲小管 Na
- D: 与醛固酮受体结合

答案：C

14. 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是

- A: 抑制单胺氧化酶
- B: 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取
- C: 抑制神经末梢突触前膜 α
- D: 抑制 5-羟色胺再摄取

答案：D

15. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 强效利尿药

B: 碳酸酐酶抑制药

C: 保钾利尿药

D: 中效利尿药

答案：A

16. 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是

A: 急性溶血性贫血

B: 抗生素相关性腹泻

C: 红人综合征

D: 肌肉震颤

答案：B

17. 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适使用的药物是

A: 美托洛尔

B: 贝那普利

C: 氨氯地平

D: 硝普钠

答案：A

18. 普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是()

A: 茶碱缓释片

B: 氯苯那敏片

C: 对乙酰氨基酚滴剂

D: 右美沙芬片

答案：B

19. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 青霉素加速抗原抗体结合
- B: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应
- C: 青霉素本身诱导机体发生变态反应
- D: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原

答案：B

20. 氯沙坦的降压作用机制是()

- A: 阻断 AT
- B: 阻断 AT
- C: 阻断 α 受体
- D: 阻断 β 受体

答案：B

21. (2020 年真题) 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

- A: 疗程不宜过长
- B: 肠梗阻患者禁用
- C: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便
- D: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童

答案：C

22. 可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 碘及碘化物
- C: 鲨肝醇
- D: 左甲状腺素

答案：D

23. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 以原型药物经肾脏排泄
- B: 胃肠道吸收不完全
- C: 较易进入中枢神经系统，可致神经系统不良反应
- D: 中度透过血-脑屏障

答案：C

24. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚关辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

25. 阻断 H₂ 受体的是

- A: 氢氧化镁
- B: 西咪替丁
- C: 利血平
- D: 奥美拉唑

答案：B

26. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

- A: 茶碱
- B: 沙美特罗

C: 孟鲁司特

D: 噻托溴铵

答案: B

27. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

A: 吗氯贝胺

B: 氯硝西泮

C: 苯巴比妥

D: 丙戊酸钠

答案: A

28. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 噻氯匹定

B: 替格雷洛

C: 替罗非班

D: 氯吡格雷

答案: D

29. (2018 年真题) 长期大剂量使用, 会降低阿司匹林对心血管的保护作用, 应避免合用的药物是 ()

A: 布洛芬

B: 贝那普利

C: 阿托伐他汀

D: 格列齐特

答案: A

30. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 米索前列醇和四环素
- B: 哌仑西平和西咪替丁
- C: 阿莫西林和四环素
- D: 兰索拉唑和阿莫西林

答案：D

31. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 瑞格列奈
- D: 艾塞那肽

答案：A

32. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是()

- A: 苯妥英钠
- B: 奎尼丁
- C: 普罗帕酮
- D: 利多卡因

答案：B

33. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A: 乳酸中毒
- B: 尿潜血、血色素尿
- C: 低钾血症
- D: 低钠及低磷血症

答案：D

34. (2015 年真题) 易导致血糖异常的药品是 ()。

- A: 多西环素
- B: 庆大霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 加替沙星

答案：D

35. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是 ()

- A: 烟酸
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀
- D: 依折麦布

答案：C

36. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 氯化钠
- D: 硫酸镁

答案：A

37. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- B: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存
- C: 每次注射需要更换不同部位
- D: 混悬型胰岛素可以静脉注射

答案：D

38.（2021 年真题）患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（）

- A: 乳果糖
- B: 普芦卡必利
- C: 蓖麻油
- D: 硫酸镁

答案：A

39. 室性心律失常可用

- A: 地尔硫草
- B: 地高辛
- C: 美西律
- D: 普萘洛尔

答案：C

40. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

- A: 具有吸附、收敛的作用
- B: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环
- C: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- D: 属于抗动力药

答案：D

41. 硫酸亚铁临床应用

- A: 急性中性粒细胞减少症
- B: 缺铁性贫血
- C: 失去药效

D: 缺血性脑卒中

答案：B

42. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

A: 中和胃酸，升高胃内 pH

B: 阻断 H

C: 保护胃黏膜

D: 抑制 H

答案：D

43. 属于胸苷酸合成酶抑制剂

A: 放线菌素

B: 顺铂

C: 氟尿嘧啶

D: 紫杉醇

答案：C

44. 服用后可能导致口中有氨味、舌、大便变黑，牙齿变色的药物是

A: 硫糖铝

B: 兰索拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 雷尼替丁

答案：C

45. 治疗黏液性水肿的药物是

A: 普萘洛尔

B: 硫脲类

C: 甲状腺片

D: 硫脲类+大剂量碘

答案：C

46. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

A: 阿糖腺苷

B: 奥司他韦

C: 阿昔洛韦

D: 干扰素

答案：B

47. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

A: 硝普钠

B: 贝那普利

C: 美托洛尔

D: 氨氯地平

答案：C

48. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A: 提高纤维蛋白原浓度

B: 减少淋巴细胞

C: 使红细胞含量增加

D: 使血小板数量下降

答案：D

49. 丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

- A: 肝内代谢转化快
- B: 口服后吸收不完全
- C: 肾脏排泄速度快
- D: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

答案：D

50. 治疗滴虫病宜选用

- A: 吡喹酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 氯喹
- D: 甲硝唑

答案：D

51. 可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 雷尼替丁
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

52. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

- A: 婴幼儿
- B: 老年人
- C: 溃疡病患者
- D: 肝病患者

答案：A

53. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 氨氯地平
- D: 地高辛

答案：D

54. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

- A: 奈替米星
- B: 阿莫西林
- C: 庆大霉素
- D: 红霉素

答案：C

55. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是()

- A: 埃索美拉唑
- B: 兰索拉唑
- C: 泮托拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：C

56. 下列不可用于治疗前列腺增生的是

- A: 非那雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 西地那非
- D: 坦洛新

答案：C

57. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

- A: 奥美拉唑+口服地塞米松
- B: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松
- C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松
- D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

答案：C

58. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 低钾血症
- B: 低镁血症
- C: 伴有房颤的心功能不全
- D: 甲状腺功能减退症

答案：D

59. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 吗氯贝胺
- C: 度洛西汀
- D: 阿米替林

答案：C

60. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 静脉用胰岛素
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 二甲双胍

D: 胰岛素皮下注射

答案：B

61. 透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

A: 壬二酸

B: 异维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案：A

62. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

A: 奎宁

B: 乙胺嘧啶

C: 青蒿素

D: 吡喹酮

答案：C

63. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平

B: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量

C: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应

D: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向

答案：D

64. 阿司匹林的主要适应证不包括()

A: 不稳定型心绞痛

- B: 预防血栓形成
- C: 胃溃疡
- D: 急性心肌梗死

答案：C

65. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

- A: 1000U
- B: 10U
- C: 1U
- D: 100U

答案：D

66. 具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

- A: 卡托普利
- B: 阿利克伦
- C: 呋塞米
- D: 氨氯地平

答案：A

67. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 卡泊芬净
- C: 氨曲南
- D: 特比萘芬

答案：C

68. 关于中枢性镇咳药的使用，叙述错误的是

- A: 特别适用于无痰、干咳患者
- B: 中枢性镇咳药属于对症治疗药物，用药 7 日如症状未缓解，宜停药就诊
- C: 痰多黏稠患者亦可使用该类药物单药治疗
- D: 高龄患者、肝功能不全患者、肾功能不全患者宜从小剂量开始

答案：C

69. 可使磷酸化胆碱酯酶复活的药物

- A: 阿托品
- B: 毒扁豆碱
- C: 匹鲁卡品
- D: 碘解磷定

答案：D

70. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

- A: 5-HT
- B: 奥美拉唑+口服地塞米松
- C: 5-HT
- D: 每日化疗前，应用 5-HT

答案：C

71. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 过氧苯甲酰
- D: 壬二酸

答案：D

72. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 氢氧化铝
- B: 泮托拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 复方碳酸钙

答案：B

73. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

- A: 酚妥拉明
- B: 阿托品
- C: 右旋糖酐
- D: 糖皮质激素

答案：D

74. 以下关于比索洛尔说法错误的是

- A: 首关效应高、半衰期短
- B: 可阻断部分 β_1 受体
- C: 为水脂双溶性 β 受体阻断剂
- D: 口服吸收率高，中度透过血-脑屏障

答案：A

75. 硫脲类药物用于

- A: 高血压
- B: 精神病
- C: 甲亢
- D: 糖尿病

答案：C

76. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

- A: 哌唑嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 氯氟地平
- D: 依那普利

答案：A

77. 氨力农常见的不良反应是

- A: 严重低血压
- B: 色觉异常
- C: 血小板计数减少
- D: 视物模糊

答案：C

78. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: M 受体拮抗剂
- D: β 受体激动剂

答案：B

79. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

- A: 月经不规则
- B: 疗效减弱
- C: 吸收减少
- D: 肝毒性增加

答案：D

80. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

- A: 阿卡波糖
- B: 瑞格列奈
- C: 那格列奈
- D: 罗格列酮

答案：D

81. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

- A: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- B: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性
- C: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌
- D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案：D

82. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 阿托品
- B: 毛果芸香碱
- C: 噻吗洛尔
- D: 拉坦前列素

答案：B

83. 用于治疗低磷血症的药物是()

- A: 三磷酸腺苷
- B: 葡萄糖
- C: 二磷酸果糖
- D: 碳酸钙

答案：C

84. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

- A: 维生素 B6
- B: 炔雌醇
- C: 去氧孕烯
- D: 雌二醇

答案：B

85. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 精蛋白锌胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 甘精胰岛素注射液

答案：C

86. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 炔雌醇
- D: 氟他胺

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/618022064122007022>