

2024 年云南省东川区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库 A4 版可打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于嘧啶类的是

- A: 制霉菌素
- B: 卡泊芬净
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

2. （2018 年真题）患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：D

3. （2017 年真题）对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是（）

- A: 吸入性糖皮质激素+短效 β_2 受体激动剂
- B: 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- D: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

答案：C

4. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平
- B: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应
- C: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量
- D: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向

答案：D

5. 属于第四代喹诺酮类药物的是

- A: 诺氟沙星
- B: 萘啶酸
- C: 吡哌酸
- D: 莫西沙星

答案：D

6. 体内多种组织器官可发生结核分枝杆菌感染，其中以()最常见。

- A: 肠结核
- B: 肾结核
- C: 肺结核
- D: 结核性脑膜炎

答案：C

7. 属于选择性 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 昂丹司琼

D: 多潘立酮

答案: A

8. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

A: 吡喹酮

B: 酒石酸锑钾

C: 乙胺嗪

D: 左旋咪唑

答案: A

9. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

A: 腹部不适

B: 黄疸

C: 血小板减少

D: 静脉炎

答案: B

10. 哮喘急性发作首选的治疗药物是()。

A: 白三烯受体阻断剂

B: 吸入性糖皮质激素

C: 短效 β

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案: C

11. 治疗厌氧菌引起的严重感染的药物是

A: 克拉霉素

B: 红霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案：D

12. 联用治疗布氏杆菌感染的是

A: 青霉素和磺胺嘧啶

B: 链霉素和异烟肼

C: 青霉素和链霉素

D: 链霉素和磺胺嘧啶

答案：D

13. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

A: 一般剂量长期疗法

B: 小剂量替代疗法

C: 隔日一次给药法

D: 大剂量冲击疗法

答案：D

14. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

A: 肝脏损害

B: 过敏反应

C: 二重感染

D: 胃肠道反应

答案：C

15. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ()

A: 双氯芬酸

B: 秋水仙碱

C: 双醋瑞因

D: 苯溴马隆

答案：D

16. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 餐后 1 小时

B: 餐前半小时

C: 餐前即刻或餐时

D: 餐后半小时

答案：C

17. 干扰核酸生物合成的药物是()

A: 氟尿嘧啶

B: 高三尖杉酯碱

C: 顺铂

D: 多柔比星

答案：A

18. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

A: 抑制细菌细胞壁的合成

B: 影响胞浆膜的通透性

C: 影响叶酸代谢

D: 抑制蛋白质合成的全过程

答案：A

19. 用于器官移植的抗排异反应的药物是()

- A: 甲泼尼龙
- B: 硫唑嘌呤
- C: 环孢素
- D: 环磷酰胺

答案：C

20. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 地塞米松
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：C

21. 具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是()

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 克拉维酸
- D: 阿莫西林

答案：A

22. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：A

23. 可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

- A: 氯霉素
- B: 碳酸氢钠
- C: 水杨酸类
- D: 磺胺类

答案：B

24. 肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

- A: 红霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 青霉素
- D: 异烟肼

答案：D

25. (2017 年真题) 可用于治疗重度痤疮, 但妊娠期妇女避免使用的药物是 ()

- A: 克罗米通
- B: 特比萘芬
- C: 克拉霉素
- D: 异维 A 酸

答案：D

26. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体拮抗剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: β_2 受体激动剂

答案：B

27. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()。

- A: 噻吗洛尔
- B: 毛果芸香碱
- C: 乙酰唑胺
- D: 甘露醇

答案：B

28. 高血压伴变异型心绞痛宜选用

- A: 尼莫地平
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 利血平

答案：B

29. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 噻吗洛尔
- B: 地匹福林
- C: 毛果芸香碱
- D: 拉坦前列素

答案：C

30. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 宜在餐后或餐时服用
- B: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少
- C: 进食可促进铁剂的吸收

D: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平

答案: C

31. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 四氢叶酸

B: 硫酸亚铁

C: 叶酸

D: 维生素 B

答案: B

32. 头孢噻吩

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型病原体感染

C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案: A

33. 下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

A: 静脉注射

B: 肌肉注射

C: 口服给药

D: 皮下注射

答案: C

34. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 替硝唑+苯巴比妥

B: 奥硝唑+乙醇

C: 甲硝唑+乙醇

D: 替硝唑+华法林

答案: A

35. 临床上可取代林可霉素应用的是

A: 克拉霉素

B: 克林霉素

C: 罗红霉素

D: 红霉素

答案: B

36. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

A: 唑来膦酸

B: 阿仑膦酸钠

C: 依替膦酸二钠

D: 帕米膦酸二钠

答案: A

37. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

A: 女性月经不调

B: 男子乳房女性化

C: 室性心律失常

D: 锥体外系反应

答案: D

38. (2018 年真题) 具有抗炎作用, 可用于各型肝炎治疗的药物是 ()

A: 门冬氨酸钾镁

- B: 异甘草酸镁
- C: 双环醇
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：B

39. 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

- A: 头孢吡肟
- B: 拉氧头孢
- C: 氨曲南
- D: 头孢西丁

答案：C

40. 下列不属于胃肠解痉药的是

- A: 多潘立酮
- B: 山莨菪碱
- C: 阿托品
- D: 颠茄

答案：A

41. 睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

- A: 注射给药
- B: 肠道外给药
- C: 口服给药
- D: 透皮给药

答案：A

42. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

- A: 干粉吸入方法

B: 气雾剂

C: 雾化吸入溶液

D: 口服制剂

答案: D

43. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

A: 阿托伐他汀

B: 依折麦布

C: 非诺贝特

D: 阿昔莫司

答案: B

44. 以上药物镇咳作用最弱的是

A: 喷托维林

B: 右美沙芬

C: 吗啡

D: 可待因

答案: A

45. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A: 吡喹酮

B: 甲硝唑

C: 三苯双脒

D: 乙胺嘧啶

答案: B

46. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证

- A: 严重心脏病
- B: 腰椎间盘突出
- C: 骨髓功能抑制
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：B

47. 仅用于肠道感染的药物是()

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 磺胺米隆
- C: 磺胺嘧啶
- D: 柳氮磺吡啶

答案：D

48. 使用铁制品煎煮酸性食物

- A: 锥体外系反应
- B: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- C: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- D: 过敏反应

答案：C

49. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

A: 2 岁以下婴幼儿

- B: 肠梗阻患者
- C: 细菌性小肠结肠炎患者
- D: 急、慢性功能性腹泻

答案：D

50. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 需冷藏保存，携带不便
- B: 疗效不确切
- C: 不良反应较多
- D: 不适合成年人服用

答案：A

51. 属于刺激性泻药的是()

- A: 欧车前
- B: 利那洛肽
- C: 多库酯钠
- D: 番泻叶

答案：D

52. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 维生素 C
- B: 红霉素
- C: 他莫昔芬
- D: 氯丙嗪

答案：A

53. 下列不属于抗肿瘤药的是

- A: 长春新碱
- B: 氟胞嘧啶
- C: 长春碱
- D: 三尖杉酯碱

答案：B

54. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 维拉帕米
- B: 普萘洛尔
- C: 利卡多因
- D: 奎尼丁

答案：C

55. 对胰岛素产生耐受者选用

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

56. 属于长效糖皮质激素的药物是

- A: 醋酸可的松
- B: 曲安西龙
- C: 氢化可的松
- D: 地塞米松

答案：D

57. (2018 年真题) 长期大剂量使用, 会降低阿司匹林对心血管的保护作用, 应避免合用的药物是 ()

- A: 贝那普利
- B: 格列齐特
- C: 布洛芬
- D: 阿托伐他汀

答案: C

58. 下列药物属于肾素抑制剂的是 ()

- A: 硝苯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 阿利克仑
- D: 卡托普利

答案: C

59. 我国常用避孕药不包括

- A: 短效避孕药
- B: 紧急避孕药
- C: 超短效避孕药
- D: 探亲避孕药

答案: C

60. (2018 年真题) 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是 ()

- A: 肝素钠
- B: 低分子肝素
- C: 达比加群酯
- D: 华法林

答案：C

61. 12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

- A: 滴速 80~100 滴 / 分
- B: 不超过 15 滴 / 分
- C: 不超过 40 滴 / 分
- D: 滴速 20~30 滴 / 分

答案：D

62. 青霉素()

- A: 对 G
- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 对 G
- D: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

答案：C

63. 对衣原体有效的是

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 替硝唑
- D: 红霉素

答案：D

64. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 呋喃妥因
- B: 克林霉素
- C: 甲硝唑

D: 多黏菌素

答案: C

65. (2018 年真题) 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是 ()

A: 对氨基水杨酸

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: C

66. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用 ()

A: 3%酚甘油滴耳液

B: 2%过氧化氢溶液

C: 3%过氧化氢溶液

D: 2%酚甘油滴耳液

答案: D

67. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A: 吧达帕胺

B: 氨氯地平

C: 赖诺普利

D: 普萘洛尔

答案: D

68. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是 ()

A: 青霉素类

B: 氨基糖苷类

C: 四环素类

D: 氟喹诺酮类

答案：D

69. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

A: 司他夫定

B: 阿昔洛韦

C: 奥司他韦

D: 恩替卡韦

答案：D

70. (2017 年真题) 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药阿替普酶治疗时间窗是在发病后 ()

A: 12 小时内

B: 24 小时内

C: 8 小时内

D: 3 小时内

答案：D

71. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 克林霉素

D: 红霉素

答案：A

72. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 哌仑西平和西咪替丁
- B: 兰索拉唑和阿莫西林
- C: 阿莫西林和四环素
- D: 米索前列醇和四环素

答案：B

73. （2021 年真题）血浆消除半衰期相对较长（14~16min），可间隔 30min 静脉注射 2 次……药物是（）

- A: 替奈普酶
- B: 尿激酶
- C: 重组链激酶
- D: 瑞替普酶

答案：D

74. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

- A: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- B: 属于抗动力药
- C: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环
- D: 具有吸附、收敛的作用

答案：B

75. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 依诺沙星
- B: 环丙沙星
- C: 莫西沙星

D: 小檗碱

答案: D

76. 维生素 B

A: 拮抗肝素过量导致的出血

B: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血

C: 拮抗华法林过量导致的出血

D: 纤溶亢进所致的出血

答案: B

77. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的是

A: 阿奇霉素

B: 克拉霉素

C: 氟曲南

D: 红霉素

答案: D

78. (2016 年真题) 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A: 头孢氨苄

B: 青霉素 G

C: 阿莫西林

D: 左氧氟沙星

答案: D

79. 西咪替丁治疗十二指肠溃疡的机制为

A: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H1 受体，抑制胃酸分泌

B: 中和过多的胃酸

C: 阻断胃腺壁细胞上的组胺 H₂ 受体，抑制胃酸分泌

D: 形成保护膜覆盖溃疡面

答案：C

80. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

A: 阿卡波糖

B: 西格列汀

C: 罗格列酮

D: 二甲双胍

答案：B

81. 林可霉素可以作为首选药的是

A: 金葡菌致骨髓炎

B: 呼吸道感染

C: 皮肤感染

D: 胆道感染

答案：A

82. 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 人血白蛋白

C: 维生素 B₁₂

D: 重组人促红素

答案：D

83. 临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

A: 奎宁

B: 甲硝唑

C: 伯氨喹

D: 氯喹

答案: C

84. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

A: 格列齐特

B: 雷尼替丁

C: 双氯芬酸

D: 硝苯地平

答案: C

85. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 肾血管

B: 骨骼肌血管

C: 皮肤黏膜血管

D: 冠状血管

答案: C

86. 下列不属于双膦酸盐类药物的是

A: 依替膦酸二钠

B: 阿仑膦酸钠

C: 阿法骨化醇

D: 帕米膦酸二钠

答案: C

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 哌拉西林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/618043106132007022>