

2024 年辽宁省东洲区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题及参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 尼莫地平
- B: 维拉帕米
- C: 硝苯地平
- D: 氨氯地平

答案：A

2. 对视觉起作用的是

- A: 维生素 A
- B: 视黄酸
- C: 视黄醛
- D: 视黄醇

答案：C

3. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 吗氯贝胺
- C: 阿米替林
- D: 度洛西汀

答案：D

4.（2017 年真题）药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢曲松
- B: 替考拉宁
- C: 阿米卡星
- D: 头孢哌酮

答案：B

5. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

- A: 正规胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 珠蛋白锌胰岛素
- D: 格列喹酮

答案：A

6. 可导致视神经炎，治疗期间应监测眼部视力的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 利福喷丁
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

7. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

- A: 氯噻嗪
- B: 苻噻嗪

C: 氢氯噻嗪

D: 氢氟噻嗪

答案: A

8. 以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 室性心动过速

B: 室上性心动过速

C: 心房扑动

D: 心房颤动

答案: A

9. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 柔红霉素

B: 阿糖胞苷

C: 甲氨蝶呤

D: 右雷佐生月德

答案: A

10. 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

A: 多烯磷脂酰胆

B: 双环醇

C: 异甘草酸镁

D: 门冬氨酸钾镁

答案: D

11. 属于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂的是

A: 罗格列酮

- B: 瑞格列奈
- C: 艾塞那肽
- D: 阿卡波糖

答案：C

12. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 氨甲环酸
- B: 尿激酶
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K1

答案：D

13. 能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 甲苯磺丁脲
- C: 广谱抗生素
- D: 阿司匹林

答案：A

14. 下列可用于治疗哮喘的是

- A: 氯雷他定
- B: 孟鲁司特
- C: 氮革斯汀
- D: 氯苯那敏

答案：B

15. 下列药物中，不属于蒽环类抗肿瘤抗生素的是

- A: 表柔比星

B: 多柔比星

C: 柔红霉素

D: 红霉素

答案: D

16. (2018 年真题) 关于地高辛作用特点的说法, 正确的是 ()

A: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢, 以原形药物从肾脏排泄

B: 地高辛口服生物利用度小于 50%

C: 地高辛通过激动 Na^+ , K^+ -ATP 酶增强心肌收缩力

D: 地高辛消除半衰期为 12h

答案: A

17. 属于留钾利尿药的是

A: 布美他尼

B: 依普利酮

C: 依他尼酸

D: 托拉塞米

答案: B

18. 环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高, 这是因为环孢素抑制

A: UGT287

B: 血浆蛋白

C: p-糖蛋白

D: CYP3A4

答案: C

19. 属于抗雌激素类的是 ()

A: 甲羟孕酮

B: 己烯雌酚

C: 睾酮

D: 他莫昔芬

答案: D

20. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A: 环磷酰胺

B: 放线菌素 D

C: 丝裂霉素

D: 阿霉素

答案: B

21. 属于钙通道阻滞剂（第 IV 类）的抗心律失常药是

A: 美西律

B: 维拉帕米

C: 拉贝洛尔

D: 胺碘酮

答案: B

22. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 骨化三醇

B: 降钙素

C: 阿仑膦酸钠

D: 雷洛昔芬

答案: D

23. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

A: 不影响排便

- B: 口服易吸收
- C: 中和胃酸作用强而迅速
- D: 对溃疡面有保护作用

答案：C

24. 属于长效避孕药的是

- A: 壬苯醇醚
- B: 氯地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 米非司酮

答案：B

25. 既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

- A: 罗格列酮
- B: 氢氧化镁
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

26. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 阿片中毒
- B: 剧烈疼痛
- C: 惊厥
- D: 失眠

答案：A

27. 属于高致吐风险的抗肿瘤药物是（）

- A: 顺铂
- B: 氟尿嘧啶
- C: 吉非替尼
- D: 奥沙利铂

答案：A

28. 可诱发和加重哮喘的是

- A: 硝酸甘油
- B: 胍乙啶
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案：C

29. 关于口服硫酸亚铁的注意事项，不正确的是

- A: 宜在餐后或餐时服用
- B: 颗粒剂应热开水冲服
- C: 老年人可适当增加剂量
- D: 治疗剂量不得长期使用

答案：B

30. 患者首次使用西妥昔单抗,为减轻其不良反应常规预处理使用的药物是 ()

- A: 抗组胺类药物
- B: 化疗止吐类药物
- C: 质子泵抑制剂
- D: 维生素类药物

答案：A

31. 氨甲环酸的作用机制是()

- A: 刺激血小板生成
- B: 激活凝血因子
- C: 促使毛细血管收缩
- D: 对抗纤维蛋白溶解

答案：D

32. 与呋喃妥因特性不符的叙述是

- A: 口服吸收差
- B: 细菌易对其产生耐药性
- C: 主要用于泌尿系感染
- D: 有广谱抗菌活性

答案：B

33. 下列不属于雌激素作用部位的是

- A: 肾脏
- B: 输卵管
- C: 阴道
- D: 子宫

答案：A

34. 属于第二代喹诺酮类药物的是

- A: 莫西沙星
- B: 萘啶酸
- C: 诺氟沙星
- D: 吡哌酸

答案：D

35. (2017 年真题) 可用于吗啡中毒解救的药物是 ()

- A: 苯甲酸钠咖啡因
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 阿托品

答案: B

36. 若无禁忌, 冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

- A: 氯吡格雷
- B: 肝素
- C: 依诺肝素
- D: 阿司匹林

答案: D

37. 属于促凝血因子合成的药物是 ()

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 鱼精蛋白
- C: 卡巴克络
- D: 甲萘氢醌

答案: D

38. 周某, 男, 31 岁, 胃溃疡伴有慢性出血, 大便潜血 (+), 患者近日感无力、心悸, 诊断: 慢性失血性贫血。

- A: 尽量选择三价铁
- B: 选择适宜的病期、疗程和监测
- C: 对胃酸缺乏者, 宜与稀盐酸并用, 有利于铁剂的解离
- D: 注意预防铁负荷过重

答案: A

39. (2016 年真题) 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

- A: 他莫昔芬
- B: 戊酸雌二醇
- C: 依普黄酮
- D: 地屈孕酮

答案: B

40. 服用西地那非可导致()

- A: 肾功能异常
- B: 高血压
- C: 心律失常
- D: 视物模糊、复视

答案: D

41. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 英夫利昔单抗
- B: 西妥昔单抗
- C: 贝伐单抗
- D: 利妥昔单抗

答案: D

42. (2020 年真题) 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

- A: 法莫替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 雷贝拉唑

D: 雷尼替丁

答案: B

43. 治疗钩虫病宜选用

A: 甲苯咪唑

B: 吡喹酮

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案: A

44. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

A: 地屈孕酮

B: 戊酸雌二醇

C: 他莫昔芬

D: 依普黄酮

答案: A

45. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

A: 可待因

B: 布桂嗪

C: 哌替啶

D: 阿司匹林

答案: C

46. 以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

A: 在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检

B: 长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能

C: 丙酸睾酮应采用静脉注射

D: 最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物

答案: C

47. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

A: 心肌梗死

B: 高血压

C: 心律失常

D: 充血性心力衰竭

答案: C

48. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

A: 左氧氟沙星

B: 米诺环素

C: 哌拉西林

D: 甲硝唑

答案: A

49. 用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 雷洛昔分

B: 米非司酮

C: 黄体酮

D: 地塞米松

答案: A

50. 联用治疗细菌性心内膜炎的是()

A: 青霉素和磺胺嘧啶

B: 青霉素和链霉素

C: 链霉素和磺胺嘧啶

D: 链霉素和异烟肼

答案：B

51. 手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

A: 氨甲环酸

B: 硫酸亚铁

C: 鱼精蛋白

D: 维生素 K

答案：A

52. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的药物是()

A: 红霉素

B: 异烟肼

C: 阿莫西林

D: 氧氟沙星

答案：D

53. 能选择性地兴奋子宫平滑肌，使其产生节律性收缩，并软化和扩张子宫颈，促使宫口开全和胎儿娩出，临床用于中期引产、足月妊娠引产及治疗性流产的药物是

A: 普拉睾酮

B: 缩宫素

C: 麦角新碱

D: 地诺前列酮

答案：D

54. (2019 年真题) 患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿 (+++)，适宜该患者使用的降压药物是 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 依那普利
- C: 硝苯地平
- D: 甲基多巴

答案：B

55. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖 ()

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 格列本脲
- D: 二甲双胍

答案：B

56. 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 奥美拉唑
- C: 复方碳酸钙
- D: 替普瑞酮

答案：B

57. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 噻吗洛尔
- B: 复方托吡卡胺
- C: 毛果芸香碱
- D: 溴莫尼定

答案：B

58. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

- A: 西地那非
- B: 他达拉非
- C: 坦洛新
- D: 度他雄胺

答案：C

59. (2016 年真题) 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是

- A: 利福平
- B: 舒巴坦
- C: 磷霉素
- D: 替考拉宁

答案：B

60. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是

- A: 氨甲苯酸
- B: 硫酸鱼精蛋白
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 K1

答案：D

61. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

- A: 氯吡格雷
- B: 氨甲环酸
- C: 噻氯匹定
- D: 双嘧达莫

答案：B

62. 扁平疣可选用

A: 阿达帕林

B: 酮康唑

C: 维 A 酸

D: 林旦霜

答案：C

63. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 不会导致锥体外系反应

B: 不会导致催乳素增多

C: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常

D: 不会促进乙酰胆碱的释放

答案：D

64. 司坦唑醇的禁忌证不包括

A: 男性乳腺癌

B: 肾炎

C: 严重心功能不全

D: 前列腺增生

答案：C

65. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

- A: 红霉素
- B: 庆大霉素
- C: 咪康唑
- D: 阿昔洛韦

答案：C

66. 绒促性素属于

- A: 短效口服避孕药
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 雌激素类
- D: 促性腺激素

答案：D

67. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 克拉霉素
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 硝苯地平缓释片
- D: 埃索美拉唑钠

答案：D

68. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

- A: 环磷酰胺
- B: 阿霉素
- C: 丝裂霉素
- D: 放线菌素 D

答案：D

69. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

- A: 叶酸+维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 亚叶酸钙

答案：D

70. 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是()

- A: 沙美特罗
- B: 茶碱
- C: 噻托溴铵
- D: 孟鲁司特

答案：C

71. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 泼尼松
- B: 卡莫司汀
- C: 多西他赛
- D: 表柔比星

答案：B

72. 四环素联用抗凝药需要

- A: 口服吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 调整抗凝血药的剂量
- D: 增加麦角中毒的风险

答案：C

73. 氯吡格雷临床应用

- A: 缺血性脑卒中
- B: 急性中性粒细胞减少症
- C: 缺铁性贫血
- D: 失去药效

答案：A

74. 单纯疱疹病毒感染的首选药是

- A: 碘苷
- B: 金刚烷胺
- C: 干扰素
- D: 阿昔洛韦

答案：D

75. 雌激素的适应证是

- A: 消耗性疾病
- B: 先兆性流产
- C: 功能性子宫出血
- D: 痛经

答案：C

76. 高浓度溶液对皮肤和黏膜产生刺激性灼伤，形成一疼痛“白痴”

- A: 过氧化氢
- B: 羟甲唑啉
- C: 克罗米通
- D: 硼酸

答案：A

77. 属于第一代喹诺酮类药物的是

- A: 萘啶酸
- B: 诺氟沙星
- C: 莫西沙星
- D: 吡哌酸

答案：A

78. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 碳酸锂
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 卡比马唑
- D: 甲巯咪唑

答案：D

79. 可拮抗阿托品所致的心动过速的是

- A: 地高辛
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫卓
- D: 美西律

答案：C

80. (2018 年真题) 不能减小前列腺的体积, 也不能降低 PSA 水平, 但可松弛前列腺平滑肌, 缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是 ()

- A: 非那雄胺
- B: 坦索罗辛
- C: 他达拉非
- D: 西地那非

答案: B

81. 三甲沙林属于

- A: 肾上腺皮质激素类
- B: 重金属元素及其化合物
- C: 补骨脂素及其衍生物
- D: 其他光敏剂

答案: C

82. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者, 在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd” 静脉滴注, 出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗, 适宜的方案是 ()

- A: 泼尼松片 50mgqd
- B: 泼尼松片 20mgqd
- C: 地塞米松片 10mgqd
- D: 泼尼松片 30mgqd

答案: A

83. 多巴胺受体阻断物的代表药物为 ()

- A: 托烷司琼
- B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 格雷司琼

答案: B

84. 关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

A: 是长效类口服避孕药的组成成分

B: 是天然孕激素

C: 是短效类口服避孕药的组成成分

D: 具有雄激素作用

答案: B

85. 关于帕罗西汀的描述，错误的是

A: 停药时直接停药

B: 停药时应缓慢减量至停药

C: 本品为选择性 5-HT 再摄取抑制剂

D: 用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等

答案: A

86. 使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是()

A: 肌酐清除率低于 50% 的患者

B: 肌酐清除率低于 30% 的患者

C: 肌酐清除率低于 40% 的患者

D: 肌酐清除率低于 60% 的患者

答案: A

87. 小剂量就有抗焦虑作用的药物是

A: 吗啡

B: 苯巴比妥

C: 苯妥英钠

D: 地西泮

答案: D

88. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 双环醇

C: 还原型谷胱甘肽

D: 异甘草酸镁

答案: B

89. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

A: 复方碘口服液

B: 甲状腺片

C: 甲巯咪唑片

D: 卡比马唑片

答案: C

90. 巨幼细胞贫血应首选

A: 维生素 B12

B: 叶酸+维生素 B12

C: 亚叶酸钙

D: 维生素 B6

答案: B

91. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 塞来昔布

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/618127115116007022>