

2024 湖北省新洲区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库加答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

- A: 对耐药金葡萄菌有效
- B: 耐酸、耐酶
- C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- D: 口服吸收差，生物利用度小

答案：C

2. （2020 年真题）适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者，但不宜长期使用，用药 7 日症状未缓解应停药的恶性祛痰药物是

- A: 溴己新
- B: 氨溴索
- C: 氯化铵
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

3. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 那格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：B

4. 下列对红霉素的说法错误的是()

- A: 作用机制是抑制蛋白质合成
- B: 是治疗军团病的首选药
- C: 对革兰阳性菌作用强大
- D: 容易透过血脑屏障

答案：D

5. (2019 年真题) 关于外用糖皮质激素类药物的说法，错误的是 ()

- A: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药
- B: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- C: 外用糖皮质激素可增加感染风险
- D: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案：A

6. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- B: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期
- C: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度
- D: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

答案：A

7. (2017 年真题) 属于抗雄性激素的肿瘤药是 ()

- A: 阿那曲唑
- B: 炔雌醇
- C: 氟他胺
- D: 他莫昔芬

答案：C

8. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

- A: 多西环素
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：B

9. 不属于血管紧张素转换酶抑制剂(ACE I)类药物作用特点是()

- A: ACEI 可引起反射性心率加快
- B: ACEI 对肾脏有保护作用
- C: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者
- D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

答案：A

10. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 精氨酸

答案：D

11. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

- A: 阿糖胞苷
- B: 多柔比星
- C: 甲氨蝶呤
- D: 环磷酰胺

答案：B

12. (2020 年真题) 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 更昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 金刚烷胺

答案: C

13. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

- A: 磷霉素氨丁三醇
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 利奈唑胺+哌替啶
- D: 利奈唑胺+苯丙醇胺

答案: B

14. 绒促性素属于

- A: 雌激素类
- B: 促性腺激素
- C: 短效口服避孕药
- D: 促性腺激素释放激素类似物

答案: B

15. 下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

- A: 制霉菌素
- B: 两性霉素
- C: 伊曲康唑
- D: 灰黄霉素

答案: D

16. 治疗细菌性结膜炎宜选用

- A: 左氧氟沙星滴眼液
- B: 毛果芸香碱滴眼液
- C: 碘苷滴眼液
- D: 复方托吡卡胺滴眼液

答案：A

17. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

- A: 肼屈嗪
- B: 卡托普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 拉贝洛尔

答案：B

18. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

- A: 异甘草酸镁
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 双环醇
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：D

19. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的 ()

- A: 大剂量抑制卵巢排卵
- B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备
- C: 促进女性性器官的发育成熟
- D: 抑制子宫平滑肌的收缩

答案：C

20. 早产儿、新生儿出血宜选用()

- A: 尿激酶
- B: 叶酸
- C: 肝素
- D: 维生素 K

答案：D

21. 无抗结核作用的是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 红霉素
- D: 异烟肼

答案：C

22. 螺内酯临床常用于

- A: 脑水肿
- B: 急性肾功能衰竭
- C: 尿崩症
- D: 醛固酮升高引起的水肿

答案：D

23. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: >5ng/ml
- B: >50ng/ml
- C: >2ng/ml
- D: >20ng/ml

答案：C

24. 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是

- A: 贝那普利
- B: 硝普钠
- C: 美托洛尔
- D: 氨氯地平

答案：A

25. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

- A: 2g
- B: 3g
- C: 4g
- D: 1g

答案：C

26. 主要不良反应为踝部关节水肿的药物是()

- A: 硝酸甘油
- B: 哌唑嗪
- C: 依那普利
- D: 氨氯地平

答案：D

27. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 不孕症
- B: 贫血
- C: 脚气病
- D: 脂溢性皮炎

答案：C

28. 属于 5a 还原酶抑制剂的是

- A: 他达拉非
- B: 度他雄胺
- C: 西地那非
- D: 坦洛新

答案：B

29. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

- A: II、VII、IX、X 因子
- B: VII、XI、VII、IX 因子
- C: II、VII 因子
- D: II、VIII、XI、IV 因子

答案：A

30. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

- A: 苯溴马隆
- B: 亚叶酸钙
- C: 丙磺舒
- D: 别嘌醇

答案：B

31. 患者，男，22 岁，诊断为风湿热，可选用

- A: 苄星青霉素
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 双氯西林

答案：A

32. ACEI 与()联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: 留钾利尿剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 人促红素

答案：D

33. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

- A: 别嘌醇
- B: 舒林酸
- C: 布洛芬
- D: 秋水仙碱

答案：A

34. 若无禁忌,冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

- A: 肝素
- B: 依诺肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：D

35. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 E
- B: 维生素 B
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B

答案：C

36. 连续使用应间隔 4h 以上

A: 羟甲唑啉

B: 酚甘油滴耳液

C: 麻黄碱

D: 赛洛唑啉

答案：A

37. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

A: 吸氧，给予普萘洛尔

B: 给予糖皮质激素

C: 减少药物剂量

D: 给予肾上腺素

答案：D

38. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

A: 阿司匹林

B: 头孢类抗生素

C: 噻嗪类利尿剂

D: 抗凝药

答案：D

39. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

A: 螺内酯

B: 氨苯蝶啶

C: 阿米洛利

D: 氢氯噻嗪

答案: A

40. 使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是

A: 替罗非班

B: 双嘧达莫

C: 阿司匹林

D: 替格瑞洛

答案: B

41. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

A: 药物剂量过大

B: 给药方式错误

C: 使用药物缺乏针对性

D: 未做皮肤过敏试验

答案: D

42. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入(PCI)治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 双氯芬酸

B: 奥美拉唑

C: 华法林

D: 氯吡格雷

答案: D

43. 肾功能不全者不需要调整剂量的药物是

- A: 红霉素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素
- D: 罗红霉素

答案：A

44. 分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

- A: 碘化钾
- B: 氨溴索
- C: 表面活性剂
- D: 氯化铵

答案：B

45. 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：A

46. 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防过敏反应
- B: 预防粒细胞缺乏
- C: 预防癌症复发

D: 预防出血过多

答案：B

47. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

A: 卡巴洛克

B: 氨甲苯酸

C: 氨基己酸

D: 酚磺乙胺

答案：D

48. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

A: 高钾血症

B: 低氯碱血症

C: 低血糖

D: 血小板增多

答案：A

49. 患者女，7 岁，体重 23kg，查血清钠浓度为 152mmol / L，诊断为高渗性失水。相关资料：氯化钠注射液用于高渗性失水：所需补液总量 (L) = [血钠浓度 (mmol / L) - 142] / 血钠浓度 (mmol / L) × 0.6 × 体重 (kg)，第 1 日补给半量，余量在以后 2~3 日内补给，并根据心、肺、。肾功能酌情调节。

A: 450ml

B: 350ml

C: 150ml

D: 250ml

答案：A

50. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

- A: 卡维地洛
- B: 氢氯噻嗪
- C: 米力农
- D: 氯沙坦

答案：B

51. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化镁

答案：B

52. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响叶酸代谢
- B: 抑制蛋白质合成的全过程
- C: 抑制细菌细胞壁的合成
- D: 影响胞浆膜的通透性

答案：C

53. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

- A: 干粉吸入方法
- B: 雾化吸入溶液
- C: 口服制剂
- D: 气雾剂

答案：C

54. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 引起电解质紊乱的概率增加
- B: 低氯性碱中毒机会增加
- C: 利尿作用减弱
- D: 耳毒性增加

答案：D

55. 肾毒性大的是

- A: 庆大霉素
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢噻肟
- D: 阿莫西林

答案：A

56. 可使血小板内环磷腺苷(cAMP)浓度增高而产生抗血小板作用的药品是()。

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 替罗非班
- D: 氯吡格雷

答案：B

57. (2021 年真题) 适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是 ()。

- A: 坦洛新
- B: 托特罗定
- C: 度他雄胺
- D: 托拉塞米

答案：B

58.（2016 年真题）对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 罗非昔布
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

59.（2017 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰胺类抗癫药的是（）

- A: 苯巴比妥
- B: 卡马西平
- C: 加巴喷丁
- D: 苯妥英钠

答案：D

60. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

- A: 拉米夫定
- B: 奥司他韦
- C: 吡喹酮
- D: 乙胺嘧啶

答案：B

61. 降低肾素活性最强的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 可乐定
- C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案: D

62. 主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A: 炔诺酮

B: 庚酸炔诺酮

C: 丙酸睾丸素

D: 苯丙酸诺龙

答案: B

63. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

A: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

C: 依诺沙星可抑制茶碱代谢

D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

答案: D

64. (2017 年真题) 属于中枢和外周多巴胺 D2 受体阻断剂, 具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是 ()

A: 多潘立酮

B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 莫沙必利

答案: B

65. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者, 宜使用的药物是

A: 葡醛内酯

- B: 多烯磷脂酸胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

66. 关于第一、二、三、四代头孢菌素类抗菌药物药理作用的叙述，错误的是

- A: 第一代头孢菌素对青霉素酶稳定，但可被革兰阴性菌产生的 β -内酰胺酶所破坏
- B: 第四代头孢菌素对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌显示广谱抗菌活性
- C: 第二代头孢菌素对铜绿假单胞菌无效，对多种 β -内酰胺酶较稳定
- D: 第三代头孢菌素对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，但对 β -内酰胺酶不稳定

答案：D

67. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 酚苄明
- B: 特拉唑嗪
- C: 坦洛新
- D: 乙酰唑胺

答案：C

68. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀

D: 烟酸

答案: B

69. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: 远曲小管近端

C: 磷酸二酯酶

D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案: A

70. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

A: 吸收减少

B: 肝毒性增加

C: 月经不规则

D: 疗效减弱

答案: B

71. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

A: 特比萘芬

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 卡泊芬净

D: 氟曲南

答案: D

72. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

A: 雷尼替丁

B: 尼扎替丁

C: 奥美拉唑

D: 西咪替丁

答案: C

73. 格列本脲的作用特点是

A: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

C: 抑制胰高血糖素的分泌

D: 增强胰岛素的作用

答案: A

74. 关于法莫替丁用药注意事项的说法,错误的是

A: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

B: 与西咪替丁相比,对性激素的影响较轻

C: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性,从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

D: 以原形从肾脏排泄,肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

答案: C

75. 静脉溶栓首选的药物是

A: 阿替普酶

B: 重组人促红素

C: 维生素 K

D: 达比加群酯

答案: A

76. 抗酸作用较弱而慢,但持久,对溃疡面有保护作用

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化铝

C: 碳酸钙

D: 氢氧化镁

答案：A

77. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂ 受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂ 受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

A: 劳拉西泮

B: 氯丙嗪

C: 甲氧氯普胺

D: 帕洛诺司琼

答案：C

78. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

A: 泼尼松龙

B: 泼尼松

C: 可的松

D: 氟替卡松

答案：A

79. 关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 可单独服用或与他汀类联合应用

B: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次

C: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

D: 需空腹服用

答案：D

80. (2021 年真题) 可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是 ()

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 赛洛多辛
- D: 特拉唑嗪

答案: B

81. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

- A: 异甘草酸镁
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 双环醇

答案: D

82. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿糖胞苷
- C: 顺铂
- D: 环磷酰胺

答案: A

83. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

- A: 胆绞痛及肾绞痛
- B: 急性锐痛
- C: 癌性剧痛
- D: 神经压迫性疼痛

答案: D

84. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

- A: 阿托品
- B: 阿利吉仑
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 胺碘酮

答案：A

85. 属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 胃蛋白酶
- C: 胶体果胶铋
- D: 莫沙必利

答案：C

86. 属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

- A: 氯硝西泮
- B: 加巴喷丁
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯巴比妥

答案：C

87. 下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

- A: 抑制 Na
- B: 延长 APD 和 ERP
- C: 减慢 0 相去极化速度
- D: 降低膜反应性

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/625220221114012033>