

N3护士外科复习题与答案

1、下列哪项不是胆总管结石合并化脓性胆管炎时的并发症

- A、肝脓肿
- B、感染性休克
- C、急性胰腺炎
- D、门静脉高压症
- E、胆道出血

答案：D

2、在恶性肿瘤的淋巴道转移中，下列最多见的是

- A、穿过或绕过淋巴结的“跳跃式”转移
- B、经皮肤真皮层淋巴管转移
- C、在毛细淋巴管内形成癌栓
- D、经皮肤淋巴管转移
- E、区域淋巴结转移

答案：E

3、关于胃十二指肠溃疡急性穿孔的叙述中，下列哪一项不正确

- A、常发生于幽门附近的胃和十二指肠前壁
- B、突发的上腹部剧痛
- C、恶心、呕吐
- D、有明显腹膜刺激征
- E、均可出现膈下游离气体

答案：E

4、破伤风患者出现苦笑，易发生痉挛的肌肉是

- A、四肢肌
- B、面肌
- C、颈项肌
- D、腹肌
- E、背阔肌

答案：B

5、我国门静脉高压症常见的病因是

- A、血吸虫病
- B、门脉性肝硬变
- C、肝炎后肝硬变
- D、胆汁性肝硬变
- E、门静脉血栓形成

答案：C

6、关于门静脉高压症分流术后护理错误的是

- A、早期起床活动
- B、低蛋白饮食
- C、预防感染
- D、忌食过烫食物
- E、术后卧床 1 周

答案：A

7、低渗性脱水可出现以下临床表现，但应除外

- A、视力模糊
- B、恶心呕吐
- C、手足麻木
- D、明显口渴
- E、脉压变小

答案：D

8、进行液体疗法时，如果首日计划输液总量为 4000ml，第一个 8 小时的输液量是

- A、500ml
- B、1000ml
- C、1500ml
- D、2000ml
- E、2500ml

答案：D

9、世界卫生组织推荐的癌痛治疗方案以外，还有哪种治疗方法最有效

- A、心理治疗
- B、康复治疗
- C、神经阻滞
- D、饮食疗法
- E、针灸

答案：C

10、患者清晨卧床时测得脉搏 120 次/分，血压 126/70mmHg 其 BMR 为

- A、0.15
- B、0.25
- C、0.35
- D、0.55

E、0.65

答案：E

11、股疝经股环、股管突出于

A、腹股沟韧带上方

B、股骨小转子附近

C、股部卵圆窝

D、股三角内

E、股静脉外侧

答案：C

12、下列关于颈椎病的描述错误的是

A、为老年人的常见病

B、颈型最常见

C、宜睡低枕和硬板床

D、少低头、少伏案工作

E、首选手术治疗

答案：E

13、外科感染下列哪项局部处理不正确

A、局部制动

B、局部热敷

C、患肢抬高

D、脓肿切开时切口选择在脓肿的上部

E、局部严禁按摩

答案：D

14、头面部烧伤应特别警惕是否伴有

A、眼部烧伤

B、口腔烧伤

C、鼻部烧伤

D、呼吸道烧伤

E、消化道烧伤

答案：D

15、胸部损伤后，胸膜腔内积血不凝固的原因是

A、肺、心、膈肌运动有去纤维蛋白作用

B、胸膜腔内渗出液稀释

C、凝血酶原被破坏

D、3种凝血因子缺乏

E、失血过多引起

答案：A

16、急性化脓性阑尾炎病理改变特点不包括下列哪一项

A、黏膜糜烂

B、管壁有积脓

C、阑尾有穿孔

D、管腔内有积脓

E、阑尾表面有脓苔

答案：C

17、下列可用于长春新碱解毒的是

A、硫代硫酸钠

B、枸橼酸钠

C、碳酸氢钠

D、肝素钠

E、亚硝酸钠

答案：C

18、引起急性肾功能衰竭少尿期主要的死亡原因是

A、水中毒、高钾血症

B、氮质血症

C、低钠血症

D、低钾血症

E、酸中毒

答案：A

19、血栓性外痔常采用的治疗方法是

A、手术剥除血栓，结扎血管

B、胶圈套扎

C、硬化剂注射疗法

D、单纯结扎疗法

E、枯痔疗法

答案：A

20、诊断脓胸最可靠的依据是

A、胸部正位片

B、CT扫描

C、胸腔穿刺

D、B超检查

E、血常规检查

答案：C

21、有关急性胆囊炎的叙述下列哪项是不正确

A、发病与胆汁淤滞和细菌感染相关

B、夜间发病多见

C、油腻饮食易发病

D、致病菌为革兰氏阴性杆菌

E、常表现为夏柯综合征

答案：E

22、低钾血症最早出现的症状是

A、肌无力

B、代谢性碱中毒

C、恶心、呕吐、腹胀

D、心电图改变

E、心律失常

答案：A

23、对于长期肠外营养支持的患者不适合的静脉是

A、颈内静脉

B、颈外静脉

C、大隐静脉

D、股静脉

E、锁骨下静脉

答案：C

24、关于 K^+ 的功能，下列正确的是

A、低血钾使心肌应激性升高

B、维持细胞外液的渗透压

C、维持细胞内液的容量

D、分解代谢增强时， K^+ 进入细胞

E、血钾浓度过高增强神经肌肉的兴奋性

答案：C

25、乳癌根治术造成患侧上肢活动受限的原因是

A、腋窝瘢痕牵拉

B、胸壁瘢痕牵拉

C、腋窝和胸壁瘢痕牵拉

D、术中损伤了神经

E、术后神经受压

答案：C

26、闭合性气胸患者，肺萎缩程度小于_____时不必处理

A、0.3

B、0.4

C、0.45

D、0.5

E、0.6

答案：A

27、患者，65岁。吸烟史30年，诊断为“晚期肺癌”。近日呼吸困难，疼痛加剧，护士指导其减轻疼痛，其中不妥的护理措施是

A、放松疗法

B、局部冷湿敷

C、遵医嘱使用哌替啶

D、给安慰剂

E、听轻音乐

答案：D

28、膀胱原位癌的病变

A、限于黏膜层

B、限于固有层

C、达到膀胱浅肌层

D、达到膀胱深肌层

E、侵犯膀胱外

答案：A

29、体格检查时发现胸骨左缘第2肋间听到响亮粗糙的连续性机器样杂音，常提示

A、主动脉缩窄

B、肺动脉口狭窄

C、房间隔缺损

D、室间隔缺损

E、动脉导管未闭

答案：E

30、为明确肾结核的病变范围及程度，最佳的检查方法是

A、摄尿路平片

B、排泄性尿路造影

C、逆行性尿路造影

D、B超诊断

E、膀胱镜检查

答案：B

31、洗手过程中手触及未消毒物品应

A、重新洗手

B、延长浸泡时间

C、更改浸泡用药液

D、多戴一副手套

E、继续原有洗手步骤

答案：A

32、下列哪项可引起低渗性脱水

A、长期胃肠减压

B、弥漫性腹膜炎

C、大量出汗

D、肠痿

E、烧伤

答案：A

33、腰麻后最常见的并发症是

A、全脊髓麻醉

B、血压下降

C、马尾神经损伤

D、头痛

E、尿潴留

答案：D

34、休克患者微循环衰竭期的典型表现是

A、肢端青紫

B、皮肤苍白

C、血压下降

D、脉搏细速

E、皮肤出现瘀点瘀斑

答案：E

35、关于骨牵引护理，描述不正确的是

A、床尾或床头抬高 15～30cm

B、牵引针不可左右移动

- C、去除牵引针孔处的分泌物
- D、患者可自由改变体位
- E、牵引重量不可随意增减

答案：D

36、穿手术衣双手插入手术衣袖时，双臂应

- A、上举
- B、下垂
- C、平伸
- D、外展
- E、环抱

答案：C

37、不舒适中最严重的表现形式是

- A、精神不振，乏力
- B、头晕、眼花
- C、恶心呕吐
- D、失眠
- E、疼痛

答案：E

38、下列哪项不是腹膜炎术后半卧位的目的

- A、有利于脓液局限于盆腔
- B、有利于改善呼吸和循环
- C、有利于恢复肠蠕动
- D、减轻中毒症状
- E、防止膈下感染

答案：C

39、结肠癌 Dukes 分期中 B 期指

- A、癌穿透肠壁，无淋巴结转移
- B、有淋巴结转移，仅局限于结肠旁淋巴结
- C、有淋巴结转移，至系膜和系膜根部淋巴结
- D、癌累及肠壁肌层
- E、有其他脏器转移

答案：A

40、患者，男性，40 岁。胃不适，嗳气，消化不良 3 个月，经检查确诊为早期胃癌，首选的治疗方案是

- A、根治术

- B、姑息手术
- C、根治术加化疗
- D、化疗
- E、放疗

答案：C

41、酸中毒 pH 低于

- A、7.15
- B、7.35
- C、7.55
- D、7.25
- E、7.45

答案：B

42、外伤后，可出现腕下垂畸形的骨折部位是

- A、桡骨中、下 1/3 交界处
- B、肱骨中、下 1/3 交界处
- C、尺骨中、下 1/3 交界处
- D、腕关节
- E、肘关节

答案：B

43、普查原发性肝癌最简单有效的方法是

- A、B超检查
- B、MRI检查
- C、AFP测定
- D、CT检查
- E、肝血管造影术

答案：C

44、破伤风患者致死与下列哪项有关

- A、心脏衰竭
- B、呼吸困难、窒息
- C、脱水
- D、酸中毒
- E、肺炎、肺不张

答案：B

45、患者，男性，反复发生尿频、尿急、尿痛，伴镜下全血尿，经抗感染治疗效果不佳首先考虑是

- 、泌尿系结核
- B、前列腺肥大
- C、泌尿系结石
- D、泌尿系肿瘤
- E、急性膀胱炎

答案：A

46、女性，65岁，近半年来反复出现头痛，头晕，今晨在突然转头时感眩晕耳鸣，恶心呕吐，摔倒在地，2分钟后缓解，既往曾类似发作2次，X线片示颈5~6椎体后缘骨质增生，椎间孔明显缩小，最可能的诊断是

- A、神经根型颈椎病
- B、脊髓型颈椎病
- C、椎动脉型颈椎病
- D、交感神经型颈椎病
- E、癫痫发作

答案：C

47、关于胃大部切除术术前饮食指导中，错误的是

- A、少量多餐
- B、低蛋白
- C、高热量
- D、高维生素
- E、易消化、无刺激性

答案：B

48、急性弥漫性腹膜炎大量毒素吸收可导致

- A、肠粘连
- B、呼吸困难
- C、感染性休克
- D、代谢性碱中毒
- E、低钾血症

答案：C

49、急性梗阻性化脓性胆管炎的病程特点是

- A、起病缓，发展快，病情重
- B、起病缓，发展慢，病情重
- C、起病急，发展快，病情重
- D、起病急，发展快，病情轻
- E、起病急，发展慢，病情重

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626002032050011020>